

性活动致腹主动脉瘤破裂出血死亡法医学鉴定 1 例

石青¹, 王茜¹, 赵枢泉¹, 尹敏¹, 杨怡², 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 武汉市公安局汉阳区分局, 湖北 武汉 430030)

【关键词】法医病理学; 性活动; 猝死; 腹主动脉瘤; 主动脉夹层

【中图分类号】D918.93

【文献标识码】C

【文章编号】1001-5728(2022)04-0411-02

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2022.04.023

性行为及相关性活动是成年人生活的重要组成部分, 通常危险性较低, 但在特殊体位及患有自身疾病的中老年人中可发生性活动相关的死亡^[1,2], 本文报道一例性活动致腹主动脉瘤破裂出血死亡的法医学鉴定。

1 案例资料

1.1 简要案情

某男, 72 岁。某日 20 时前往一休闲场所, 后被一失足女带到后面的按摩间。据其口供: 某男坐上床后, 在性“前戏”时出现腰疼症状, 遂给其腰部按摩, 随即出现胸部不舒服, 头上冒汗, 呕吐, 手脚冰凉及浑身发热等症状, 后另一男子将某男送往医院, 途中下车并将其平放于路边, 拨打 120 到场后, 已无生命体征。

1.2 法医学检验

解剖检验: 腹膜后腹主动脉周围软组织见一 27.0 cm×18.0 cm 大小血肿 (图 1a), 重 1 600 g。沿血流方向剪开主动脉, 主动脉内膜见大量钙化的粥样斑块 (图 1b), 以腹主动脉为重。腹主动脉近髂动脉分叉处膨隆, 形成 7.5 cm×5.0 cm 的主动脉瘤, 其上端距主动脉根部 45.0 cm (距髂总动脉分支口 10.0 cm), 下端位于髂总动脉分岔处, 主动脉瘤瘤腔内见一 7.0 cm×4.2 cm 附壁血栓形成, 具有明显分层结构, 其表面为胶冻样物质, 呈乳白色, 血栓基底部粘附于主动脉内膜, 呈灰棕色。腹主动脉

部分血管撕裂, 管壁连续性中断, 主动脉瘤腔内膜见长 9.0 cm 的横向破裂口, 背侧外膜见长 3.0 cm 横向破裂口, 周围大量凝血块形成。其余器官呈贫血状。

病理学检验: 主动脉各段内膜大片状粥样斑块形成, 内见粥样坏死物质、胆固醇结晶、钙化及少量单核、淋巴细胞浸润, 部分粥样斑块内出血, 外膜偶见炎症反应带形成 (图 1c)。腹主动脉瘤破口处全层增厚、连续性中断, 内膜粥样坏死灶可见大量钙盐沉积, 斑块表面破溃见以纤维蛋白及红细胞为主的混合血栓形成, 血栓基底部机化, 可见大量成纤维细胞增生; 中膜各层弹力膜排列紊乱, 部分结构消失, 弹力膜间可见出血, 部分平滑肌嗜酸性增强呈凝固性坏死。其余各器官血管空虚, 呈缺血性改变。

死亡原因: 主动脉粥样硬化继发腹主动脉瘤形成并破裂致急性大失血, 最终因急性循环功能衰竭而死亡。

2 讨论

国外相关研究将性活动相关死亡定义为在性活动之前、之中或之后立即发生的自然死亡。在一项涉及 38 000 例的大规模尸检研究显示, 仅有 99 例与性活动相关。该研究显示, 性活动相关的死亡大多归因于自身潜在疾病, 如心脏和脑部疾病, 尤以冠状动脉粥样硬化性心脏病, 心肌梗死和蛛网膜下腔出血最为常见, 主动脉相关疾病的报道较少, 但也有动脉夹层疾病致死的报道^[1-3]。

性活动是一种轻度到中度强度的活动^[4], 对机体造成中等程度的压力^[2], 一般对机体危害性较小, 但患有严重器质性疾病患者, 因其自身体力活动受限, 轻微体力活动可能加重其自身疾病从而引发其猝死^[1]。因老年男性相较同龄女性在性活动中具有更高的活跃程度^[5,6], 老年夫妻之间的性活动无法

【基金项目】“十三五”国家重点研发计划资助项目 (2018YFC0807203)。

【作者简介】石青, 男, 主要从事法医病理学鉴定工作; E-mail: 806496165@qq.com。

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究; E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn。




图1 本案附图

a: 腹主动脉瘤及腹膜后大血肿; b: 剪开示主动脉瘤腔内部及内膜粥样硬化; c: 腹主动脉瘤破裂, 外膜周围血肿, 中膜及内膜结构坏死, 瘤腔内血栓形成 (HE×80)。

满足身心需求, 导致寻求嫖娼及其他形式的性活动几率大大增加。老年男性体质较差、自身基础性疾病及器官组织退行性改变较多, 且一般在性活动中占据主导地位^[3], 故在性活动相关死亡案例中, 以老年男性较为多见。

研究显示, 与婚外性伴侣或者妓女发生性行为, 尤其是在陌生的环境里, 道德上的羞耻感可以带来更大的心理刺激, 进而导致心率和血压急剧升高^[1,3]。动脉瘤病变部位血管内膜及中膜各弹力层及平滑肌纤维通常会发生变性、坏死, 血管壁异常变薄^[7]。血压及心率骤然升高引起的血流动力学改变^[1], 给主动脉管壁造成无法承受的冲击压力, 引起动脉瘤破裂^[8]。本案中, 被鉴定人系老年男性, 主动脉粥样硬化病变明显, 腹主动脉瘤病变显著, 证实其存在严重的基础疾病, 性活动可能给其带来较为明显的刺激, 使其动脉血管压力骤升, 从而导致动脉瘤破裂死亡。

国内法医学鉴定中性活动相关猝死报道较少, 但国外大规模尸检研究显示其发生率为 0.26%, 国内报道较少的原因可能是传统文化所致。在法医学鉴定中, 此类案件较为罕见, 且相关研究鲜有报道, 因此在遇到可疑性活动死亡案件时, 要注重案情调查及现场物证搜查, 尤其婚外情性活动中, 性对象通常会回避现场或对现场进行伪装^[9], 因此对勘验工作带来一定的难度。如案发现场位于存在“黄色交易”的场所, 尸体呈裸体或衣冠不整, 龟头粘附分泌物, 现场发现避孕套、精斑及带有精液的擦拭物, 应考虑死者生前存在性活动, 并对尸体进行解剖检查。

性活动中存在另一类形式较为特殊的死亡方式——性窒息, 性窒息指的是性活动者采取一定方式使自身缺氧, 达到刺激性欲, 增强快感的目的, 所以此种案件常见于意外。常见的性窒息死亡机制

与缢死、勒死基本相同, 在以往的案例中, 不乏存在他杀机械性窒息伪装成性窒息意外死亡, 或将性窒息案件误判为他杀或自杀性质的案件, 所以在遇到可疑的性自杀案件时, 应该深入调查, 了解死者生前是否存在特殊癖好, 仔细勘查现场, 进行全面系统的尸体解剖, 综合判断死亡方式及案件性质。

参考文献

- [1] Lee S, Chae J, Cho Y. Causes of sudden death related to sexual activity: results of a medicolegal postmortem study from 2001 to 2005[J]. J Korean Med Sci, 2006, 21: 995-999.
- [2] Lange L, Zedler B, Verhoff M A, et al. Love death-A retrospective and prospective follow-up mortality study over 45 years[J]. J Sex Med, 2017, 14: 1226-1231.
- [3] Parzeller M, Bux R, Raschka C, et al. Sudden cardiovascular death associated with sexual activity—a forensic autopsy study (1972-2004)[J]. Forensic Sci Med Pathol, 2006, 2: 109-114.
- [4] Bohlen J G, Held J P, Sanderson M O. Heart rate, ratepressure product, and oxygen uptake during four sexual activities[J]. Arch Intern Med, 1984, 144(9): 1745-1748.
- [5] Yang S, Yan E. Demographic and psychosocial correlates of sexual activity in older Chinese people[J]. J Clin Nurs, 2016, 25(5/6): 672-681.
- [6] Beckman N, Waern M, Gustafson D, et al. Secular trends in self reported sexual activity and satisfaction in Swedish 70year olds: cross sectional survey of four populations, 1971-2001[J]. BMJ, 2008, 337: a279.
- [7] Sakalihasan N, Limet R, Defawe O D. Abdominal aortic aneurysm[J]. Lancet, 1993, 365(9470): 1577-1589.
- [8] 权卓, 苏柯. 腹主动脉瘤破裂死亡 1 例分析 [J]. 中国当代医药, 2016, 23(9): 164-166.
- [9] 骆世勋, 宋书功. 性法医学 [M]. 北京: 世界图书出版公司, 1996: 415-418.

(收稿日期: 2021-10-27)