

冠状动脉刺切创致迟发性心包填塞死亡 1 例

晏建存¹, 王敬槐¹, 邢景军², 杨 怡², 段祎杰², 张 慧², 周亦武²

(1. 信阳市光山县公安局, 河南 光山 465400; 2. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030)

【关键词】法医病理学; 左前降支; 冠状动脉刺切创; 迟发性心包填塞; 死因分析

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2014)03-0281-01

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2014.03.033

1 案例资料

1.1 简要案情

某男, 17 岁。被人用刀捅伤左胸部, 急诊入院。查体: 神志清, 体温 37.2℃, 脉搏 86 次/min, 呼吸 21 次/min, 血压 16.6/7.5 kPa (124/68 mmHg); 左乳下 3.0 cm 处见一 2.5 cm 长斜行伤口, 胸廓、胸部呼吸运动正常, 无胸膜摩擦感及皮下捻发感; 双肺呼吸音低并可闻及啰音; 心尖搏动位置正常, 心音正常, 无心包摩擦音。CT 示双肺挫伤并胸腔积液。入院后给予清创缝合、左侧胸腔闭式引流、输血等对症治疗。患者一直清醒, 未诉特殊不适。入院第 8 天突发昏迷, 呼吸心跳骤停, 抢救无效死亡。

1.2 法医学检验

尸体距左乳下 3.0 cm、正中线上 13.5 cm 处皮肤有 2.5 cm 长的由左外下方向右内上方斜行缝合创口, 其左外下方创角锐、右内上方创角略钝, 创壁光滑, 创道贯穿胸壁进入左侧胸腔。左侧胸腔有 60 mL 积血, 左侧心包表面触及 11.0 cm × 6.0 cm 包块, 未见创口, 其切面大片状出血及结缔组织增生; 与左侧胸壁创口对应处心包内壁有长 2.2 cm 斜行创口, 心包腔内有积血 350 mL 及凝血块 220 g, 后者局部附条索状的灰白色组织。镜下见心包创口机化肉芽组织形成, 心包凝血块可见机化血栓及较多新生毛细血管、成纤维细胞及新生间皮细胞。心重 340 g, 其前室间沟中下段、距左冠状动脉分叉口 6.0 cm 有长 1.9 cm、深 0.3 cm 的已愈合创口, 与冠状动脉左前降支斜行交叉 (图 1); 其表面见一微小破口, 与左前降支相通 (图 2)。镜下见左前降支前壁破裂, 破裂动脉壁延伸至心外膜表面下的机化血栓形成囊状结构样假性动脉瘤 (图 3), 破口处动

脉平滑肌断裂, 部分胶原纤维及弹性纤维增生 (图 4); 后壁完整, 破口对应处深层心肌未见损伤。心传导系统未见异常。左肺上叶下缘见 3.0 cm × 2.0 cm 刺创口伴出血, 其创道周围片状出血, 局部胸膜增厚伴纤维素渗出。余器官未见特殊病变。

2 讨论

胸部刺创导致冠状动脉破裂引起迟发性心包填塞国内外相关报道较少^[1-3]。本例尸体心包囊内侧刺创口外膜已经纤维机化愈合, 左前降支损伤处平滑肌断裂、胶原纤维及弹性纤维增生并机化血栓性假性动脉瘤形成, 心包内凝血块机化血栓形成, 均说明损伤后已经历一段时间, 与受伤经过相符。本文作者认为: 本例左前降支刺切创浅表, 为非完全性断裂, 伤后由于神经反射引起冠状动脉痉挛或损伤血管平滑肌收缩使血管破口封闭, 并在破口处形成假性动脉瘤继而暂时止血或间断出血。同时, 由于心包破裂, 冠状动脉损伤初期的出血部分溢出心包外, 而未发生急性心包填塞, 随着心包破口机化愈合, 出血被局限在心包内且逐渐机化形成假性动脉瘤, 由于瘤体破裂及 (或) 血栓脱落引起大量出血而致严重心包填塞, 最终因急性循环功能衰竭而死亡。

(本文图 1~4 见彩插 II)

参 考 文 献

- [1] Kang N, Hsee L, Rizoli S, et al. Penetrating cardiac injury: overcoming the limits set by nature [J]. Injury, 2009, 40 (9): 919-927.
- [2] 蔡庆勇, 梁贵友, 牛义民, 等. 胸外伤 121 例手术治疗体会 [J]. 临床误诊误治, 2006, 19 (10): 30-31.
- [3] Bozinovski J, Wang S, Nakai S. Delayed cardiac tamponade after coronary artery laceration [J]. Ann Thorac Surg, 2002, 73 (4): 1314-1315.

(收稿日期: 2013-05-30)

【作者简介】晏建存, 男, 法医师, 主要从事法医病理学和法医临床学检案工作。Tel: 13837677880; E-mail: jiancun@126.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

胶带缠绕口鼻部自杀
死亡 1 例

(正文见 284 页)



图 1 多层胶带缠绕口鼻部

口服硫酸吗啡及
汽车防冻液中中毒死亡 1 例

(正文见 287 页)



图 1 死者胃粘膜被染成绿色且广泛出血

冠状动脉刺切创致迟发性心包填塞死亡 1 例

(正文见 281 页)




图 1 心前室间沟浅表刺切创 图 2 LAD 假性动脉瘤横切面(箭头) 图 3 LAD 前壁破裂(箭头)形成假性动脉瘤 Masson × 10 图 4 LAD 破口处胶原纤维及弹性纤维增生(箭头) Masson × 40

颈部刀刺伤后颈内动脉血栓形成致脑梗塞死亡 1 例

(正文见 293 页)



图 1 左面部下颌角已缝合皮肤裂伤 图 2 颈内动脉血栓 图 3 颅内动脉血栓