作已知三條中綫的三角形

Created by Mr. Francis Hung　　　　　　　　Last updated: 2017-11-04

已給三角形的三條中綫，用尺規作該三角形。

Given the lengths of 3 sides of the medians of the triangle, to construct the triangle.



為了作該三角形，我們首先證明三條中綫共點(concurrent)，瞭解其原理。

假設其中兩條中綫 BQ 和 CR 相交於 G (圖 1)。

連接 AG 並延長至 D，使得 $AG = GD$。

假設 AGD 交 BC 於 P。連接 BD、CD。

過 Q 作 QL 平行於 DA，交 BD 的延長綫於 L (圖 2)。

由中點定理得知 $GQ = \frac{1}{2}DC$，$GQ \,//\, DC$，及 $GR = \frac{1}{2}DB$，$GR \,//\, DB$。



圖 1

$\because GQ \,//\, DC$ 及 $GR \,//\, DB$

$\therefore BDCG$ 為一平行四邊形　　(平行四邊形的定義)

$BP = PC$　　(平行四邊形對角綫)

因此，AGP 為ΔABC 的中綫。三條中綫共點。

更進一步，$GQ = \frac{1}{2}DC = \frac{1}{2}BG$　　(平行四邊形對邊)

$GR = \frac{1}{2}DB = \frac{1}{2}CG$　　(平行四邊形對邊)

$\therefore BG : GQ = CG : GR = 2 : 1$

同理，易證 $AG : GP = 2 : 1$

每條中綫將其餘兩條分成 $2 : 1$。

另外，ΔBQL 的邊長分別為 3 條中綫的長度。



圖 2

作圖方法如下(圖 3 及圖 4)：

假設三條中綫長度為 p、q 及 r。

(1)　作ΔBQL，長度為 $QL = p$、$BQ = q$ 及 $LB = r$。

(2)　利用垂直平分綫找出 QL 的中點 E，連接 BE。

(3)　利用截綫定理，在 BE 上找出 P，使得 $BP = 2PE$。(圖 3)

(4)　在 BE 延長綫上找出 C，使得 $PE = EC$。

(5)　連接 CQ 並延長至 A，使得 $CQ = QA$。

(6)　連接 AB。(圖 4)



圖 3

作圖完畢，證明如下：

$BQ = q$ 為ΔABC 的中綫。　　($\because AQ = QC$)

E 為 CP 的中點，及 Q 為 AC 的中點。

$AP = 2QE = QL$　　(中點定理)

$AP = p$ 為ΔABC 的中綫。　　($\because BP = PC$)

設 R 為 AB 的中點。

$BR = \frac{1}{2}AB = PQ$ 及 $PQ \,//\, BR$　　(中點定理)

$\because PE = EC$ 及 $QE = EL$　　(由作圖所得)

$PQCL$ 為一平行四邊形　　(對角綫互相平分)

$CL = QP$ 及 $CL \,//\, QP$　　(平行四邊形對邊)

$\therefore BR = CL$ 及 $BR \,//\, CL$

$BRCL$ 為一平行四邊形　　(對邊平行且相等)

$\therefore CR = LB = r$　　(平行四邊形對邊)

$CR = r$ 為ΔABC 的中綫。　　($\because AR = RB$)

證明完畢。



圖 4