

1. 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 + a$ 의 최댓값이 10일 때, 실수 a 의 값은?

[2.8점]

- ① -12 ② -11 ③ -10
④ -9 ⑤ -8

2. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x+1)f(x) = \int_{-1}^x \{2f(t) + 4\}dt$ 를 만족할 때, $f(-1)$ 의 값은?

[2.9점]

- ① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

3. 이차함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \frac{3}{4}x^2 - x + \left\{ \int_1^2 f(t)dt \right\}^2$ 일 때, 정적분 $\int_1^2 f(x)dx$ 의 값은?

[2.9점]

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$


4. 두 함수 $f(x) = 5x^3 - 10x^2 + k$, $g(x) = 5x^2 + 2$ 가 $0 < x < 3$ 에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 를 만족시키도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

[3.0점]

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

5. 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. $f(0)=1$, $f(2)=-1$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[3.3점]



[보 기]

- ㄱ. $f(x)$ 는 원점을 지난다.
 ㄴ. $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극소이다.
 ㄷ. 방정식 $f(x)=0$ 는 서로 다른 두 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P, Q의 시간 t ($t \geq 0$)에서의 속도가 각각

$$v_1(t)=2t^2-4t, \quad v_2(t)=t^2-2t$$

이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 만나는 순간까지 두 점 P, Q의 이동거리의 합은?

[3.4점]

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

7. 이차함수 $f(x)$ 가 $\int_{-3}^3 f(x)dx - 3 = \int_0^3 f(x)dx = \int_{-3}^0 f(x)dx$ 를 만족시키고 $f(1) = 3$ 일 때, $f(4)$ 의 값은?

[3.4점]

- ① -8 ② -9 ③ -10
④ -11 ⑤ -12

8. 최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$f'(x) = 0$ 이 서로 다른 세 실근 α, β, γ 를 갖고, $f(\alpha)f(\beta)f(\gamma) < 0$ 이다. (단, $\alpha < \beta < \gamma$)

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[3.4점]


[보 기]

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x = \alpha$ 에서 극댓값을 갖는다.
ㄴ. 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
ㄷ. $f(\alpha) > 0$ 이면 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 모두 β 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 삼차함수 $f(x) = ax^3 - 3x^2 + 3$ ($a > 0$)이 있다. 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 접하고 x 축과 평행한 두 직선 l, m 이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 각각 A, B, C, D라 할 때, 사각형 ACDB는 마름모이다. 이때, $f(3a)$ 의 값은?

[3.5점]



- ① 54 ② 55 ③ 56
④ 57 ⑤ 58

10. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 -2 인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(\alpha) = g(\alpha)$ 이고, $f'(\alpha) = g'(\alpha) = 8$ 인 실수 α 가 존재한다.
(나) $f'(\beta) = g'(\beta) = -8$ 인 실수 β 가 존재한다.

$g(\beta+1) - f(\beta+1)$ 의 값은?

[3.6점]

- ① 25 ② 26 ③ 27

④ 28

⑤ 29

11. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0) = 0, f'(0) = 0, f'(3) = 36$

(나) 어떤 양수 k 에 대하여 두 열린 구간 $(-\infty, 0), (0, k)$ 에서 $f'(x) < 0$

옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[3.8점]

[보 기]

ㄱ. 방정식 $f(x) = 0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.

ㄴ. $f(x)$ 는 열린구간 $(2, 3)$ 에서 증가한다.

ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq -\frac{16}{3}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족한다.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

(나) 모든 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} f(x)g(x)dx = 0$

$[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $g(h) = \int_{-1}^h f(x)dx$ 의 최댓값 M , 최솟값 m 에 대하여 $\frac{M}{m}$ 의 값은?

[4.0점]

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{3}{4}$
 ④ $-\frac{5}{4}$ ⑤ $-\frac{3}{2}$

13. $f(-1) = 0$ 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 구간 $[-1, \infty)$ 에서 정의된 함수 $g(x) = \left| \int_{-1}^x f(t)dt \right|$ 가 다음 조건을 만족한다.

- (가) 함수 $g(x)$ 는 $x = 5$ 에서 극솟값을 갖는다.
 (나) 방정식 $g(x) = 32$ 는 두 실근을 갖는다.

이때, $|f(4)|$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
 ④ 15 ⑤ 16

14. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < 0) \\ f(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = -3$ 에서 극값을 가질 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

[4.3점]

- ① 26 ② 27 ③ 28
 ④ 29 ⑤ 30

15. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(f(x^2+1)+x) = x \int_{-2}^x f(t)dt - x^3 + x^2 + 13$ 를 만족할 때, $f(2)$ 의

값은?

[4.4점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

16. 최고차항의 계수가 3인 이차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ 가 있다. 실수 a 에 대하여 $h(a)$ 를 함수 $|g(x) - g(a)|$ 가 미분가능하지 않은 x 의 개수라 할 때, 함수 $h(a)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$\lim_{a \rightarrow n^+} h(a) = \lim_{a \rightarrow n^-} h(a) = 3, \quad h(n) = 1 \quad (n = 1, -1)$$

이때, $g(2)$ 의 값은?

[4.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

17. 이차함수 $g(x) = x^2 - 6x + 10$ 에 대하여 최고차항의 계수가 -1 인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최솟값은 5이다.
(나) 방정식 $(g \circ f)(x) = 5$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(다) 방정식 $(g \circ f)(x) = 10$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.
(라) 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖도록 하는 모든 실수 x 의 합은 6이다.

이때, $|f(4)|$ 의 값은?

[5.4점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

18. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $g(x)$ 가

$$g(x) = \begin{cases} \int_0^x f(t)dt & (x \geq 0) \\ -\int_3^x f(t)dt & (x < 0) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[5.8점]

[보 기]

ㄱ. $g(3) = 0$

ㄴ. $\frac{f(5)}{f(-1)} = -5$

ㄷ. 방정식 $f(x) + 3x = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1일 때, $x \geq 0$ 에서 $g(x) \geq -\frac{3}{2}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ \neg, \supset

⑤ \neg, \supset, \supseteq

19. 다음 조건을 만족시키며 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$ 인 모든 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 가능한 모든 $f(3)$ 의 값의
합은?

[6.0점]

(가) $f(0)=0, f'(0) \neq 1$

(나) 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=kx$ 가 접하는 실수 k 는 -1 과 1 뿐이다.

(다) 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 4개의 실근을 갖는다.

① 63

② 66


③ 69

④ 72

⑤ 75

20. 반지름의 길이가 10인 부채꼴 모양의 종이로 다음 그림과 같은 원뿔 모양의 그릇을 만들려고 한다. 그릇의 부피가 최대일 때, 그릇의 높이를 풀이 과정과 함께 구하시오.

[5.0점]



21. 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|2x^3 - 9x^2 + 11| = n$ 의 서로 다른 실근의 개수를 a_n 이라고 할 때,
 $\sum_{n=1}^{25} a_n$ 의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

[6.0점]

22. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = \int_{-1}^x \{f(t) + f'(t)\} dt$ 라 하자. 세 함수 $f(x)$, $f'(x)$, $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.


- (가) 곡선 $y = g'(x)$ 와 $y = f'(x)$ 는 원점에서 서로 접한다.
(나) 함수 $g(x)$ 의 극솟값은 -4 이다.
(다) $g(0) > 0$

이때, $g(x)$ 의 식을 풀이 과정과 함께 구하시오.

[6.0점]

23. 함수 $f(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$ 와 열린 구간 $(-2, 0)$ 에 속하는 실수 t 에 대하여 두 점 $A(-2, 0)$, $B(t, f(t))$ 를 지나는 직선과 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 영역의 넓이를 $S(t)$ 라 하자. 함수 $S(t)$ 가 극값을 갖도록 하는 t 의 값을 풀이 과정과 함께 구하시오.

[8.0점]



1. [정답] ㉓

닫힌 구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 + a$ 의 최댓값이 10이므로 $y = f(x)$ 를 미분하여 $f'(x) = 0$ 이 되는 점을 찾아보면

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 + 6x \\ &= 3x(x+2) \end{aligned}$$

$f'(x) = 0$ 이 되는 x 는 $x = -2, 0$ 이므로

$$f(-1) = -1 + 3 + a = a + 2$$

$$f(0) = a$$

$$f(2) = 8 + 12 + a = a + 20 \text{이므로}$$

최댓값은 $a + 20 = 10$ 임을 알 수 있다.

$$\therefore a = -10$$

2. [정답] ㉑

다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x+1)f(x) = \int_{-1}^x \{2f(t) + 4\}dt$ 를 만족하며, 이 다항함수는 $x = -1$ 에서

연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\int_{-1}^x \{2f(t) + 4\}dt}{x+1} = f(-1)$$

$$\Rightarrow 2f(-1) + 4 = f(-1)$$

$$\Leftrightarrow f(-1) = -4$$

3. [정답] ㉓

이차함수 $f(x)$ 에서 $\int_1^2 f(t)dt = A$ 라 하면

$$f(x) = \frac{3}{4}x^2 - x + A^2 \text{이며}$$

$$A = \int_1^2 \left(\frac{3}{4}x^2 - x + A^2 \right) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + A^2x \right]_1^2$$

$$= \frac{7}{4} - \frac{3}{2} + A^2$$

$$\Leftrightarrow A^2 - A + \frac{1}{4} = 0$$

$$\therefore A = \frac{1}{2}$$

4. [정답] ㉕

$0 < x < 3$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 를 증명하기 위하여 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하자.

$$\begin{aligned} h(x) &= 5x^3 - 10x^2 + k - 5x^2 - 2 \\ &= 5x^3 - 15x^2 + k - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h'(x) &= 15x^2 - 30x \\ &= 15x(x-2) \end{aligned}$$

$x = 2$ 에서 극소이므로 주어진 부등식을 증명하려면 $h(2) \geq 0$ 임을 증명하면 된다.

$$h(2) = 40 - 60 + k - 2 \geq 0$$

$$\Rightarrow k \geq 22$$

따라서 k 의 최솟값은 22

5. [정답] ㉔

ㄱ. $f(0) = 1$ 이므로 $f(x)$ 는 원점을 지나지 않는다. [거짓]

ㄴ. $f'(x) = 0$ 이고 $f'(x)$ 의 부호가 $-$ 에서 $+$ 으로 바뀌므로 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 극소이다. [참]

ㄷ. $y = f(x)$ 의 그래프의 극댓값이 1, 극솟값이 -1 이므로 서로 다른 세 실근을 갖는다. [거짓]

6. [정답] ㉔

$$\text{점 P의 위치 } S_P(t) = \frac{2}{3}t^3 - 2t^2$$

$$\text{점 Q의 위치 } S_Q(t) = \frac{1}{3}t^3 - t^2$$

두 점이 만나는 순간 시각 t 를 구해보면

$$\frac{2}{3}t^3 - 2t^2 = \frac{1}{3}t^3 - t^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3}t^3 - t^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3}t^2(t-3) = 0$$

$$\therefore t = 3 \quad (\because t > 0)$$

이동 거리의 합은

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \{ |v_1(t)| + |v_2(t)| \} dt \\ &= 3 \left\{ \int_0^2 (-t^2 + 2t) dt + \int_2^3 (t^2 - 2t) dt \right\} \\ &= 3 \left\{ \left[-\frac{1}{3}t^3 + t^2 \right]_0^2 + \left[\frac{1}{3}t^3 - t^2 \right]_2^3 \right\} \\ &= 3 \left\{ \left(-\frac{8}{3} \right) + 4 + \frac{19}{3} - 5 \right\} = 3 \left\{ \frac{11}{3} - 1 \right\} \\ &= 8 \end{aligned}$$

7. [정답] ㉔

$$\int_{-3}^3 f(x) dx - 3 = \int_0^3 f(x) dx = \int_{-3}^0 f(x) dx = A \text{라 하면 } \int_{-3}^3 f(x) dx = \int_{-3}^0 f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx \text{ 이므로}$$

$$\Rightarrow A+3=A+A$$

$$\therefore A=3$$

$$f(x)=ax^2+bx+c \text{ 라 하면 } \int_{-3}^0 f(x)dx=3 \text{ 에서 } \left[\frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + cx \right]_{-3}^0 = 3$$

$$\Leftrightarrow 9a - \frac{9}{2}b + 3c = 3 \quad \dots \textcircled{\text{㉠}}$$

$$\int_0^3 f(x)dx=3 \text{ 에서 } \left[\frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + cx \right]_0^3 = 3$$

$$\Leftrightarrow 9a + \frac{9}{2}b + 3c = 3 \quad \dots \textcircled{\text{㉡}}$$

$$\textcircled{\text{㉠}}, \textcircled{\text{㉡}} \text{ 에서 } b=0, 3a+c=1 \quad \dots \textcircled{\text{㉢}}$$

$$f(1)=3 \text{ 이므로 } a+c=3 \quad \dots \textcircled{\text{㉣}}$$


$$\textcircled{\text{㉢}}, \textcircled{\text{㉣}} \text{ 에서 } a=-1, c=4$$

$$f(4)=16a+4b+c=(-16)+4=-12$$


8. [정답] ㉤

주어진 조건을 만족하는 함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같은 형태를 생각할 수 있다.

㉠



㉡



ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x=\alpha$ 에서 극솟값을 갖는다. [거짓]

ㄴ. $y=f(x)$ 는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나므로 서로 다른 두 실근을 갖는다. [참]

ㄷ. ㉠ 그래프의 경우이며 이때 두 근은 모두 β 보다 크다. [참]

9. [정답] ㉣

$$ax^3-3x^2+3=3$$

$$\Leftrightarrow ax^2\left(x-\frac{3}{a}\right)=0$$

B의 좌표는 $\left(\frac{3}{a}, 3\right)$

\overline{AB} 의 길이는 $\frac{3}{a}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3ax^2 - 6x \\ &= 3ax\left(x - \frac{2}{a}\right) \text{이므로 D점의 } x \text{좌표는 } \frac{2}{a} \text{이다.} \end{aligned}$$

$$f\left(\frac{2}{a}\right) = \frac{8}{a^2} - \frac{12}{a^2} + 3 = \frac{-4}{a^2} + 3$$

D점의 좌표는 $\left(\frac{2}{a}, -\frac{4}{a^2} + 3\right)$

그런데 ACDB는 마름모이므로 \overline{DB} 의 길이는 $\frac{3}{a}$ 이다.

$$\frac{3}{a} = \sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^2 + \left(-\frac{4}{a^2}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{9}{a^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{16}{a^4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{8}{a^2} = \frac{16}{a^4}$$

$$\Leftrightarrow 8a^2 = 16$$

$$\therefore a = \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} f(3a) &= 27a^4 - 27a^2 + 3 \\ &= 27 \cdot 4 - 27 \cdot 2 + 3 = 57 \end{aligned}$$

10. [정답] ①

$f(\alpha) = g(\alpha)$, $f'(\alpha) = g'(\alpha)$ 이므로 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 는 $x = \alpha$ 에서 접한다.

$h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면

$h(x) = (x - \alpha)^2 \cdot (x - p)$ 의 형태로 나타낼 수 있으며

$$\begin{aligned} h'(x) &= 2(x - \alpha)(x - p) + (x - \alpha)^2 \\ &= (x - \alpha)(3x - 2p - \alpha) \text{에서} \end{aligned}$$

$$h'(\beta) = f'(\beta) - g'(\beta) = 0 \text{이므로 } 3\beta - 2p - \alpha = 0$$

$$p = \frac{3\beta - \alpha}{2}$$

$$h(x) = (x - \alpha)^2 \left(x - \frac{3\beta - \alpha}{2}\right)$$

한편 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 -2 인 이차함수이므로 $g(x) = -2x^2 + ax + b$ 라 하면

$$g'(x) = -4x + a$$

$$g'(\alpha) = -4\alpha + a = 8$$

$$g'(\beta) = -4\beta + a = -8 \text{이므로 두 식을 연립하면}$$

$$-4(\alpha - \beta) = 16$$


$$\therefore \alpha - \beta = -4$$

$$g(\beta + 1) - f(\beta + 1) = -h(\beta + 1)$$

$$\begin{aligned}
&= -(\beta+1-\alpha)^2 \left(\beta+1 - \frac{3\beta-\alpha}{2} \right) \\
&= -(\beta-\alpha+1)^2 \left(\frac{\alpha-\beta}{2} + 1 \right) \\
&= -(5)^2(-2+1) = 25
\end{aligned}$$

11. [정답] ⑤

조건 (가), (나)를 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=f'(x)$ 의 그래프는 각각 아래 그림과 같다.



ㄱ. $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. [거짓]

ㄴ. $f(x)=x^3(x-a)=x^4-ax^3$ 이라 하자.

$$f'(x)=4x^3-3ax^2 \text{ 이며 } f'(3)=108-27a=36 \text{ 이므로 } 27a=72$$

$$\therefore a = \frac{8}{3}$$

$$f'(x)=4x^3-8x^2=4x^2(x-2) \text{ 이므로 } f'(x) \text{는 } (2, 3) \text{에서 } f'(x) > 0 \text{ 이므로 증가한다. [참]}$$

ㄷ. 극솟값 $f(2)=8 \cdot (2-a)=8 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{16}{3}$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq -\frac{16}{3}$ 이다. [참]

12. [정답] ④

모든 실수 a 에 대하여 $\int_{-a}^a f(x)dx=0$ 이므로 $f(x)$ 는 기함수이며 $f(x)=x^3+px$ 라 할 수 있다.

모든 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} f(x)g(x)dx=0$ 이므로 $g(x)=cx+d$ 라 하면

$$\int_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} (x^3+px)(cx+d)dx=0$$

$$\Leftrightarrow \int_{-\sqrt{5}}^{\sqrt{5}} (cx^4+dx^3+pcx^2+pd)dx=0$$

$$\Leftrightarrow \int_0^{\sqrt{5}} (cx^4+pcx^2)dx=0$$

$$\Leftrightarrow c \cdot \left[\frac{1}{5}x^5 + \frac{p}{3}x^3 \right]_0^{\sqrt{5}} = 0$$

$$\Leftrightarrow c \left(5\sqrt{5} + \frac{5}{3}\sqrt{5} \cdot p \right) = 0$$

$$\text{주어진 식은 } c \text{에 대한 항등식이므로 } 5\sqrt{5} + \frac{5}{3}\sqrt{5} \cdot p = 0$$

$$\Rightarrow p = -3$$

$$\therefore f(x) = x^3 - 3x$$

$$[-2, 2] \text{에서 정의된 } g(h) = \int_{-1}^h f(x)dx \text{에서 } g'(h) = f(h) = h^3 - 3h$$

$$= h(h^2 - 3)$$

$$= h(h + \sqrt{3})(h - \sqrt{3}) \text{이고}$$

$$h = 0, \pm \sqrt{3} \text{에서 극값을 가진다.}$$

$$g(h) = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 \right]_{-1}^h$$

$$= \frac{1}{4}h^4 - \frac{3}{2}h^2 - \frac{1}{4} + \frac{3}{2}$$

$$= \frac{1}{4}h^4 - \frac{3}{2}h^2 + \frac{5}{4}$$

$$g(-2) = \frac{1}{4} \cdot 16 - \frac{3}{2} \cdot 4 + \frac{5}{4} = -\frac{3}{4}$$

$$g(-\sqrt{3}) = \frac{1}{4} \cdot 9 - \frac{3}{2} \cdot 3 + \frac{5}{4} = -1$$

$$g(0) = \frac{5}{4}$$

$$\text{따라서 최댓값은 } \frac{5}{4}, \text{ 최솟값은 } -1$$

$$\frac{M}{m} = -\frac{5}{4}$$

13. [정답] ④

$$f(-1) = 0 \text{인 이차함수 } f(x) \text{에서 } [-1, \infty) \text{에서 정의된 } g(x) = \left| \int_{-1}^x f(t)dt \right| \text{가 } x=5 \text{에서 극솟값을 가지려면}$$

$$f(x) = 0 \text{은 } -1 \text{보다 큰 해 } a \text{를 가져야 한다. 그런데 } x=5 \text{에서 극소이므로}$$

$$\int_{-1}^5 \{p(x+1)(x-a)\}dx = 0 \text{이어야 하며}$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^5 \{x^2 + (1-a)x - a\}dx = 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\frac{1}{3}x^3 + (1-a)\frac{x^2}{2} - ax \right]_{-1}^5 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \cdot 126 + \frac{(1-a)}{2} \cdot 24 - 6a = 0$$


$$\Leftrightarrow 42 + 12 = 18a$$

$$\therefore a=3$$

$$h(x) = \int_{-1}^x f(t)dt \text{ 라 하면}$$

$h'(x) = f(x) = p(x+1)(x-3)$ 이므로 $x=-1, 3$ 에서 $h(x)$ 는 극값을 가지며 $h(-1)=0, h'(-1)=0$ 이므로 $h(x)$ 는 $x=-1$ 에서 접한다.

$g(x) = |h(x)|$ 이므로 $y=g(x)$ 의 그래프를 그려보면



위 그래프와 같으며 $g(x)=32$ 는 두 실근을 가지므로 $y=g(x)$ 의 그래프는 $(3, 32)$ 를 지나야 한다.

$$\left| \int_{-1}^3 p(x+1)(x-3)dx \right| = 32$$

$$\Leftrightarrow |p| \cdot \frac{1}{6} \cdot 4^3 = 32$$

$$\Leftrightarrow |p| = 3$$

$$|f(4)| = |p \cdot 5 \cdot 1| = |p| \cdot 5 = 15$$

14. [정답] ①

$g(x)$ 가 실수 전체에서 미분 가능하므로 $x=0$ 에서 연속이고 미분 가능하다.

i) $x=0$ 에서 연속이므로 $-f(0) = f(0)$

$$\therefore f(0) = 0$$

ii) $x=0$ 에서 미분 가능하므로 $-f'(0) = f'(0)$

$$\therefore f'(0) = 0$$

$f(x) = x^2(x-a)$ 에서 $f'(-3) = 0$ 이므로 $f'(x) = 2x(x-a) + x^2$

$$f'(-3) = -6 \cdot (-3-a) + 9 = 0$$

$$\Rightarrow 18 + 6a + 9 = 0$$

$$\therefore a = -\frac{9}{2}$$

$$f(x) = x^2 \left(x + \frac{9}{2} \right)$$

$$f(2) = 4 \left(2 + \frac{9}{2} \right) = 26$$

15. [정답] ④

다항함수 $f(x)$ 의 차수를 n ($n \geq 2$)차라 가정하자.

$f(x) = ax^n$ 으로 가정하고 좌변과 우변의 차수를 비교하면

좌변의 최고차항은 $a^{n+1} \cdot x^{2n^2}$ 이며 이때 차수는 $2n^2$

우변의 최고차항은 $\frac{a}{n+1} \cdot x^{n+2}$ 이므로 이때 차수는 $n+2$

두 차수가 같을 때 n 의 값을 구하면

$$2n^2 = n+2$$

$$\Rightarrow 2n^2 - n - 2 = 0$$

$n = \frac{1 \pm \sqrt{1+16}}{4}$ 이므로 n 은 자연수인 조건에 맞지 않는다. 즉, 다항함수의 차수가 1차 혹은 상수함수인 경우를

생각해 보면

i) $f(x) = ax + b$ 인 경우

$$\begin{aligned}\text{좌변} &= f(f(x^2+1)+x) = f(ax^2+a+b+x) \\ &= f(ax^2+x+a+b) \\ &= a^2x^2+ax+a^2+ab+b \dots \textcircled{\text{A}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{우변} &= x \int_{-2}^x f(t)dt - x^3 + x^2 + 13 \\ &= x \cdot \left[\frac{1}{2}at^2 + bt \right]_{-2}^x - x^3 + x^2 + 13 \\ &= x \left\{ \frac{1}{2}ax^2 + bx - 2a + 2b \right\} - x^3 + x^2 + 13 \\ &= \left(\frac{1}{2}a - 1 \right)x^3 + (b+1)x^2 + (2b-2a)x + 13 \dots \textcircled{\text{B}}\end{aligned}$$

Ⓐ, Ⓑ 식이 같아야 하므로 $a=2, b=3$ 이다.

$$f(x) = 2x+3 \text{ 이므로 } f(2) = 7$$

ii) $f(x) = C$ 인 경우

$$\text{좌변} = C \dots \textcircled{\text{C}}$$

$$\begin{aligned}\text{우변} &= x \cdot [C]_{-2}^x - x^3 + x^2 + 13 \\ &= x(Cx+2C) - x^3 + x^2 + 13 \\ &= -x^3 + (C+1)x^2 + 2Cx + 13 \dots \textcircled{\text{D}}\end{aligned}$$

이므로 Ⓒ, Ⓓ 두 식은 항상 같을 수 없다.

16. [정답] ㉔

$f(x)$ 가 최고차항의 계수가 3인 이차함수이므로 $g(x) = \int_0^x f(t)dt$ 는 $g(0) = 0$ 이고 최고차항의 계수가 1인

삼차함수이다.

$|g(x)-g(a)|$ 가 $a=1, -1$ 일 때 미분가능하지 않은 x 가 1개이므로 $y=g(x)$ 는 $x=1, -1$ 에서 극값을 가짐을 알 수 있다.

$$\begin{aligned}g'(x) &= 3(x-1)(x+1) \\ &= 3x^2 - 3\end{aligned}$$

$$g(x) = x^3 - 3x$$

$$g(2) = 8 - 6 = 2$$

17. [정답] ㉓

(가) $g(x) = (x-3)^2 + 1$ 이고, $(g \circ f)(x)$ 의 최솟값이 5이므로 $f(x) \leq 1$ 임을 알 수 있다.

(나) $(g \circ f)(x) = 5$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2개이므로 $y = f(x)$ 의 최댓값 1을 갖는 x 의 값은 두 개다. 즉, $f(x)$ 의 두 극댓값이 같음을 알 수 있다.

(다) $g(f(x)) = 10$ 의 서로 다른 실근의 개수, 즉 $f(x) = 0$ 이 되는 x 의 개수가 3개이므로 $y = f(x)$ 의 극솟값은 0임을 알 수 있다.

(라) $f'(x) = 0$ 의 세 근을 α , $\frac{\alpha+\beta}{2}$, β 라 하면 $\alpha + \frac{\alpha+\beta}{2} + \beta = 6$ 이므로 $\alpha + \beta = 4$ 임을 알 수 있다.

$$f(\alpha) = f(\beta) = 1, f'(\alpha) = f'(\beta) = 0 \text{이므로}$$

$$f(x) = -(x-\alpha)^2(x-\beta)^2 + 1$$

$$f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = 0 \text{이므로}$$

$$f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = -\left(\frac{\beta}{2} - \frac{\alpha}{2}\right)^2 \left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2}\right)^2 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\beta-\alpha}{2}\right)^4 = 1$$

$$\therefore \beta - \alpha = 2$$

$$\alpha + \beta = 4, \beta - \alpha = 2 \text{에서 } \beta = 3, \alpha = 1$$

$$\therefore f(x) = -(x-1)^2(x-3)^2 + 1$$

$$f(4) = -3^2 \cdot 1^1 + 1 = -8$$

$$|f(4)| = 8$$

18. [정답] ㉒

$g(x)$ 가 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수이므로

$$g'(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq 0) \\ -f(x) & (x < 0) \end{cases} \text{에서 } g'(x) \text{가 } x=0 \text{에서 미분가능하고 연속이어야 한다.}$$

즉, $f(0) = -f(0) = g'(0)$ 이므로 $g'(0) = 0$ 이다.

$$g(x) = \int_0^x f(t)dt \quad (x \geq 0) \text{에서 } g(0) = 0 \text{이며}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\int_3^0 f(t)dt = 0 \text{이므로 } \int_0^3 f(t)dt = 0 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } g(3) = \int_0^3 f(t)dt = 0 \text{이다.}$$

$$\therefore g(x) = A \cdot x^2(x-3) \quad (A > 0)$$

$$\neg. g(3) = 0 \text{ [참]}$$

$$\sqcup. g(x) = Ax^3 - 3Ax^2, g'(x) = 3Ax^2 - 6Ax \text{에서}$$


$$f(5) = g'(5) = 3A \cdot 25 - 6A \cdot 5 = 45A$$

$$f(-1) = -g'(-1) = -3A - 6A = -9A$$

$$\frac{f(5)}{f(-1)} = \frac{45A}{-9A} = -5 \text{ [참]}$$

$$\sqsubset. g'(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq 0) \\ -f(x) & (x < 0) \end{cases} \text{이므로 } f(x) = \begin{cases} g'(x) & (x \geq 0) \\ -g'(x) & (x < 0) \end{cases} \text{이다.}$$

$g'(x) = 3Ax^2 - 6Ax$ ($A > 0$)이며 $f(x) = \begin{cases} 3Ax(x-2) & (x \geq 0) \\ -3Ax(x-2) & (x < 0) \end{cases}$ 이므로 그래프를 그려보면



위 그림과 같고

$f(x) + 3x = 0$, 즉 $f(x) = -3x$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1개려면 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \geq -3$ 이어야

하므로

$$\Rightarrow -6A \geq -3$$

$$\therefore A \leq \frac{1}{2}$$

$x \geq 0$ 에서 $g(x)$ 의 최솟값은 $g(2)$ 이며 $g(2) = -4A \geq -2$ 이다. [거짓]

19. [정답] ㉟

$f(0) = 0$, $f'(0) \neq 1$ 이고 $y = f(x)$ 와 $y = kx$ 가 접하는 실수 k 가 -1 , 1 두 개 뿐이므로 $f'(0) = -1$ 이 되어야 한다.

$f(0) = 0$, $f'(0) = -1$ 이므로 $f(x) = \frac{1}{2}x^2(x-p)^2 - x$ 이거나 $f(x) = \frac{1}{2}x^3 \cdot (x-q) - x$ 형태를 가져야 한다.

i) $f(x) = \frac{1}{2}x^2(x-p)^2 - x$ 인 경우

$f(x) = x$ 가 중근을 가져야 하므로 $f(x) - x = \frac{1}{2}x^2(x-p)^2 - 2x$

$$= \frac{1}{2}x\{x(x-p) - 4\}$$

여기서 $x(x-p)^2 - 4 = 0$ 이 중근을 가지려면 $g(x) = x(x-p)^2 - 4$ 라 했을 때 극댓값 혹은 극솟값이 0이 되어야 한다.

$$\begin{aligned} g'(x) &= (x-p)^2 + 2x(x-p) \\ &= (x-p)\{3x-p\} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } g\left(\frac{p}{3}\right) = 0 \text{이며 } \left(\frac{p}{3}\right)\left(\frac{4}{9} \cdot p^2\right) = 4$$

$$\therefore p = 3$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2(x-3)^2 - x \text{ 이므로 } f(3) = -3$$

ii) $f(x) = \frac{1}{2}x^3(x-q) - x$ 인 경우

$f(x) = x$ 가 중근을 가져야 하며

$$f(x) - x = \frac{1}{2}x^3(x - q) - 2x$$

$$= \frac{1}{2}x\{x^2(x - q) - 4\}$$

여기서 $h(x) = x^2(x - q) - 4$ 라 했을 때 $h(x)$ 의 극댓값 혹은 극솟값이 0이 되어야 하므로

$$h'(x) = 2x(x - q) + x^2$$

$$= x\{2x - 2q + x\}$$

$$\text{즉, } h\left(\frac{2q}{3}\right) = 0 \text{이며 } \frac{4}{9}q^2 \cdot \left(-\frac{q}{3}\right) = 4$$

$$\therefore q = -3$$

$$f(x) = \frac{1}{2}x^3(x + 3) - x \text{ 이므로}$$

$$f(3) = \frac{1}{2} \cdot 27 \cdot 6 - 3$$

$$= 81 - 3 = 78$$

$$\text{i) + ii) } = (-3) + 78 = 75$$

20. [정답] 풀이 참조

그릇의 밑면의 반지름의 길이를 r , 높이를 h 라고 하면 $r^2 + h^2 = 100$, $r^2 = -h^2 + 100$ 이다.

그릇의 부피를 $V(h)$ 라고 하면

$$V(h) = \frac{1}{3}\pi r^2 h = -\frac{1}{3}\pi h^3 + \frac{100}{3}\pi h$$

$$V'(h) = -\pi h^2 + \frac{100}{3}\pi$$

$$= -\pi \left(h + \sqrt{\frac{100}{3}} \right) \left(h - \sqrt{\frac{100}{3}} \right)$$

$h > 0$ 일 때, $V'(h) = 0$ 에서

$$h = \sqrt{\frac{100}{3}}$$

따라서 $V(h)$ 는 $h = \sqrt{\frac{100}{3}}$ 에서 최대이므로 그릇의 부피가 최대일 때, 그릇의 높이는

$$\sqrt{\frac{100}{3}} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \text{ 이다.}$$

21. [정답] 풀이 참조

$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 11$ 로 놓으면

$$f'(x) = 6x^2 - 18x = 6x(x - 3)$$

$f'(x) = 0$ 에서

$$x = 0 \text{ 또는 } x = 3$$

$$\text{i) } n = 1, 2, 3, \dots, 10 \text{일 때 } a_n = 6$$

$$\text{ii) } n = 11 \text{일 때 } a_n = 5$$

$$\text{iii) } n = 12, 13, 14, 15 \text{일 때 } a_n = 4$$

iv) $n = 16$ 일 때 $a_n = 3$

v) $n = 17, 18, 19, \dots, 25$ 일 때 $a_n = 2$

$$\therefore \sum_{n=1}^{25} a_n = 6 \times 10 + 5 + 4 \times 4 + 3 + 2 \times 9 = 102$$

22. [정답] 풀이 참조

$g'(x) = f(x) + f'(x)$ 이며 $g'(x) - f'(x) = kx^2 = f(x)$ (k 는 실수)

$f'(x) = 2kx$ 이므로 $g'(x) = f(x) + f'(x) = kx(x+2)$ 이다.

$g(x) = \int g'(x)dx$ 이므로 $g(x) = \frac{k}{3}x^3 + kx^2 + c$ (c 는 적분상수)이다.

또한, $g(-1) = 0$ 이므로 $g(-1) = \frac{2}{3}k + c = 0$ 이다.

i) $k > 0$ 인 경우

$g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극솟값을 가지므로 $g(0) = c = -4$ 이다. $g(0) > 0$ 이어야 하므로 이는 모순이다.

ii) $k < 0$ 인 경우

$g(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극솟값을 가지므로 $g(-2) = \frac{4k}{3} + c = -4$ 이다.

따라서 $k = -6, c = 4$ 이다.

그러므로 $g(x) = -2x^3 - 6x^2 + 4$ 이다.

23. [정답] 풀이 참조

직선 $h(x) = (t^2 - 1)(x + 2)$

$A(-2, 0), B(t, f(t)), C(-t, f(-t))$

$$S(t) = \int_{-2}^t \{f(x) - h(x)\}dx + \int_t^{-t} \{h(x) - f(x)\}dx$$

$$\begin{aligned} &= \int_{-2}^t f(x)dx - (t^2 - 1) \int_{-2}^t (x + 2)dx \\ &\quad + (t^2 - 1) \int_t^{-t} (x + 2)dx - \int_t^{-t} (2x^2 - 2)dx \end{aligned}$$

$$S'(t) = f(t) - 2t \int_{-2}^t (x + 2)dx - f(t)$$

$$\begin{aligned} &\quad - 4(t^2 - 1) - 8t^2 + 4(t^2 - 1) \\ &= -t(t^2 + 12t + 4) \end{aligned}$$

열린 구간 $(-2, 0)$ 에 속하는 t 는

$$t = -6 + 4\sqrt{2}$$