

Типы уравнений

Бирюк Илья Александрович

7 октября 2024 г.

Содержание

1	Проверка	3
2	Просто решение уравнения с нулём на конце	3
3	Проверить является ли эти ϕ базисом	3
4	Метод вариации произвольных постоянных (Правило Лагранжа)	4
5	Правило Коши	5

1 Проверка

Дано: $x = f(t)$ Пример: $x = t/2$
 $D^2x + 2Dx + 1 = 3t, D^2x = x''$

1. Задаём I , по x . Так как в примере t сверху, то $I = (-\infty, +\infty)$
2. Подставляем x в уравнение. $0 + 1 + 1 = 3$

2 Просто решение уравнения с нулём на конце

Дано: $D^4x - 7D^3x + 17D^2x - 17Dx + 6 = 0$

1. Перепишем $D^n x = \lambda^n$
 $\lambda^4 - 7\lambda^3 + 17\lambda^2 - 17\lambda + 6 = 0$
2. Находим корни(решаем)
 - (a) $\lambda_1 = 1, k = 2, k$ — Степень корня
 - (b) $\lambda_2 = 2, k = 1$
 - (c) $\lambda_3 = 3, k = 1$
3. Перепишем уравнение в L_n виде
 $(D - 1D^0)^2(D - 2D^0)(D - 3D^0)x = 0$
4. Записываем x_i
 $x_1 = (C_0 + C_1t)e^{1t}$
 $x_2 = C_2e^{2t}$
 $x_3 = C_3e^{3t}$
5. Суммируем x_i

3 Проверить является ли эти ϕ базисом

1. Строим вронскиан ($w(t)$)

$$\begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 & \cdots & \varphi_N \\ D\varphi_1 & D\varphi_2 & \cdots & D\varphi_N \\ D^2\varphi_1 & D^2\varphi_2 & \cdots & D^2\varphi_N \\ D^3\varphi_1 & D^3\varphi_2 & \cdots & D^3\varphi_N \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix}$$

2. Проверяем его на базис, беря любое удобное t (обычно равное 0)

4 Метод вариации произвольных постоянных (Правило Лагранжа)

Дано: $D^2x - 2Dx + x = e^t/(t^2 + 1)$

1. Решаем λ

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_1 = 1, k = 2$$

2. Выводим X_{oo}

$$X_{oo} = (C_0 + C_1 t)e^t$$

$$\text{Идеал: } X_{oo} = \sum_{i=1}^n (C_0 + C_1 t + \dots + C_{k_i-1} t^{k_i-1}) e^{\lambda_i t}$$

3. Составляем систему уравнений

Идеал:

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_0 Du_0 + \dots + \psi_{n-1} Du_{n-1} = 0, \\ D\psi_0 Du_0 + \dots + D\psi_{n-1} Du_{n-1} = 0, \\ \dots \\ D^{n-2}\psi_0 Du_0 + \dots + D^{n-2}\psi_{n-1} Du_{n-1} = 0, \\ D^{n-1}\psi_0 Du_0 + \dots + D^{n-1}\psi_{n-1} Du_{n-1} = f. \end{array} \right.$$

Для того чтобы получить какие-либо ψ Надо взять X_{oo} и подставить некоторые, базисные C

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi_0 = [C_0 = 1, C_1 = 0] = (1 + 0 * t)e^t = e^t \\ \psi_1 = [C_0 = 0, C_1 = 1] = (0 + 1 * t)e^t = te^t \end{array} \right.$$

4. Решаем систему

$$\left\{ \begin{array}{l} e^t Du_0 + te^t Du_1 = 0, \\ e^t Du_0 + (e^t + te^t) Du_1 = \frac{e^t}{t^2 + 1}, \end{array} \right.$$

5. Подставляем

$$x_{\text{чн}}(t) = \sum_{k=0}^{n-1} u_k(t) \psi_k(t)$$

6. Складываем $x = x_{oo} + x_{\text{чн}}$

5 Правило Коши

Дано:

$$D^2x + 2Dx + x = e^{2t}$$

$$x|_{t=1} = 1, Dx|_{t=1} = 5$$

1. Решаем λ

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$(\lambda + 1)^2 = 0$$

$$\lambda = -1, k = 2$$

2. Выводим X_{oo}

$$X_{oo} = (C_0 + C_1 t)e^{-t}$$

$$D_t X_{oo} = C_1 e^{-t} - (C_0 + C_1 t)e^{-t}$$

3. Решаем систему

$$\begin{cases} X_{oo}(1) = 1 \\ DX_{oo}(1) = 5 \end{cases}$$
$$\begin{cases} \frac{(C_0 + C_1)}{e} = 1 \\ \frac{C_0}{e} = 5 \end{cases}$$
$$\begin{cases} C_1 = -6e \\ C_0 = 5e \end{cases}$$

4. Находим φ

Идеал:

$$\varphi(t) = (-5e + 6et)e^{-t}$$

5. Решаем $x_{\text{чн}} = \int_0^t (-5e + 6e(t - \tau))e^{-(t-\tau)} d\tau$

6. $x = x_{oo} + x_{\text{чн}}$