工作紙四：抗生素與細菌生長

姓名：_____　班別：_____　學號：_____

課題需知

・抗生素可抑制生長或殺死某些細菌，主要用於**細菌感染**，不能治療病毒感染。MRSA 是耐甲氧西林金黃葡萄球菌，不代表對所有抗生素皆有抗性。

・抗生素由紙碟**向外擴散**，濃度通常隨距離下降；足以**抑制細菌生長**的範圍形成**清晰區**。沒有可見生長不代表所有細菌已死亡。

・量度通過圓心的**總直徑**，包括 6 mm 紙碟；無紙碟外清晰區時選「沒有」並記 0 mm。三塊獨立平板分別量度，平均值＝三次讀數之和÷3。

・群體原有**抗性差異**；抗性者較容易**存活、繁殖**並**遺傳抗性特徵**。比例可能上升，藥物效果可能下降；不是細菌主動產生所需抗性或患者本人變得抗藥。



部分 1｜研究情境與公平比較

醫院確認患者的傷口感染由 MRSA 引起。比較樣本 X、Y、Z 與不含抗生素的相同載體對照 C。

在指定的模擬條件下，X、Y、Z 對這些 MRSA 的可見生長有甚麼影響？

1.1 辨認實驗變量

每列剔選所有適用因素。

獨立變量（主動改變的因素）	因變量（觀察/量度的結果）	控制變量（保持相同的因素）
☐ 紙碟大小	☐ 紙碟大小	☐ 紙碟大小
☐ 紙碟所含樣本	☐ 紙碟所含樣本	☐ 紙碟所含樣本
☐ 瓊脂板的成份	☐ 瓊脂板的成份	☐ 瓊脂板的成份
☐ 是否有可見清晰區及其總直徑	☐ 是否有可見清晰區及其總直徑	☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
☐ 使用的細菌種類	☐ 使用的細菌種類	☐ 使用的細菌種類
☐ 初始細菌分布	☐ 初始細菌分布	☐ 初始細菌分布
☐ 各樣本預設製備條件	☐ 各樣本預設製備條件	☐ 各樣本預設製備條件

1.2 此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

☐ 各瓊脂板的初始細菌分布平均。

☐ 器材不會帶入額外污染。

☐ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。

☐ 若紙碟附近沒有菌落形成，這代表該位置的所有細菌已死亡。

1.3 若想知道抗生素是否影響細菌生長，你會如何設計對照組？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

1.4 測試樣本其有 4 種：X、Y、Z 及對照組。你認為每種樣本共需測試多少次？（包含第一次）

（1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20）


為甚麼你會這樣安排？

部分 2｜實驗結果、量度、計算與分析


2.1 量度並記錄清晰區的總直徑（mm）

三塊獨立瓊脂板｜共同模擬條件：30°C、24 小時｜紙碟直徑 6 mm


瓊脂板 1



瓊脂板 2



瓊脂板 3



紙碟外有可見清晰區？ 清晰區的總直徑 (mm)

	1 有/沒有	2 有/沒有	3 有/沒有	1 mm	2 mm	3 mm
X	☐有 ☐沒有	☐有 ☐沒有	☐有 ☐沒有			
Y	☐有 ☐沒有	☐有 ☐沒有	☐有 ☐沒有			
Z	☐有 ☐沒有	☐有 ☐沒有	☐有 ☐沒有			
C	☐有 ☐沒有	☐有 ☐沒有	☐有 ☐沒有			

2.2 總直徑的平均值計算

X 的平均值(mm)	Y 的平均值(mm)	Z 的平均值(mm)	C（對照）的平均值(mm)

2.3 清晰區的出現代表甚麼？

☐ A. 區內所有細菌都已死亡。

☐ B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。

☐ C. 區內細菌對所有抗生素都有抗藥性。

☐ D. 樣本已消滅瓊脂板上的病毒。

2.4 清晰區的直徑大小代表甚麼？

☐ A. 瓊脂板上剩餘細菌的確實數目。

☐ B. 該抗生素治療患者的效能；直徑最大就是最佳治療。

☐ C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。

☐ D. 患者應使用的抗生素劑量。

2.5 試根據實驗結果作出結論：

在本次模擬條件下，（X / Y / Z / X、Y / X、Z / Y、Z / X、Y、Z / 沒有樣本）能有效抑制 MRSA 的生長。

以本次清晰區的平均總直徑比較，它們的抑制效能為：

只排列有可見清晰區的樣本。

(X / Y / Z / C) ＞ (X / Y / Z / C) ＞ (X / Y / Z / C / 不適用) ＞ (X / Y / Z / C / 不適用)

2.6 為何需要重複進行實驗？

☐ A. 為了確保每一次實驗都能得到百分之百完全相同、毫無落差的絕對數值。
☐ B. 為了延長實驗時間，以便讓科學家在撰寫報告時有更多的文字可以描述。
☐ C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。
☐ D. 為了透過反覆操作，促使實驗中的生物樣本在短時間內加速突變出全新性狀。

2.7 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？

☐ A. 刪去不符合原始假說的數據，令結果一致。
☐ B. 只保留最大的讀數，因為它最能反映抑制效能。
☐ C. 直接計算平均值，因為平均值能消除所有操作問題。
☐ D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。

2.8 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？

☐ A. 確保所有紙碟周圍的清晰區直徑相同。
☐ B. 指出最適合患者使用的抗生素。
☐ C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。
☐ D. 增加 X、Y、Z 紙碟所含的樣本量，以增加實驗結果的準確性。

部分 3｜整合解釋

從你的實驗結果中，選出一個能抑制細菌生長的抗生素樣本，引用讀數支持你的判斷。假如這群細菌原本已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用該抗生素後，它的效果可能如何改變？請運用「課題需知」，解釋細菌的存活、繁殖及抗性特徵的遺傳如何造成這個變化。