
工作紙四：抗生素與細菌生長

姓名：_____　班別：_____　學號：_____


課題需知



（大量細菌在瓊脂表面繁殖後形成的可見群體，並非一個細菌。）

- 抗生素可抑制生長或殺死某些細菌，主要用於**細菌感染**，不能治療病毒感染。
- 細菌個體對抗生素存在抗性差異；抗生素使不具抗生素抗性的細菌較難存活，**具抗生素抗性的則較容易存活、繁殖並遺傳抗藥性特徵**。當後者比例增加，原有抗生素的效果可能下降。
- **過度或不當使用抗生素**會增加選擇壓力，**促進抗藥細菌生存與繁殖**，使感染可能更難治療。

A. 實驗原理：抗生素樣本的擴散與清晰區的形成



① 紙碟承載抗生素

② 抗生素向瓊脂擴散

③ 抗生素抑制細菌生長 並形成清晰區

- 抗生素由紙碟**向外擴散**，濃度隨距離下降；足以**抑制細菌生長**的範圍形成**清晰區**。

（沒有可見生長不代表所有細菌已死亡。）

部分 1｜研究情境與公平比較

一名患者的傷口感染在接受初步抗生素治療後，仍未明顯改善。醫院化驗確認，引起感染的是耐甲氧西林金黃葡萄球菌，簡稱 MRSA。你將化身「疾病對抗組」的抗生素研究員，在虛擬實驗室比較三種樣本 X、Y、Z 對這些細菌生長的影響。

在指定的模擬條件下，X、Y、Z 對這些 MRSA 的可見生長有甚麼影響？

1.1 辨認實驗變量

獨立變量（主動改變的因素）	因變量（觀察/量度的結果）	控制變量（保持相同的因素）
☐ 紙碟大小 ☐ 紙碟所含樣本 ☐ 瓊脂板的成份 ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑 ☐ 使用的細菌種類 ☐ 初始細菌分布 ☐ 各樣本預設製備條件	☐ 紙碟大小 ☐ 紙碟所含樣本 ☐ 瓊脂板的成份 ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑 ☐ 使用的細菌種類 ☐ 初始細菌分布 ☐ 各樣本預設製備條件	☐ 紙碟大小 ☐ 紙碟所含樣本 ☐ 瓊脂板的成份 ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑 ☐ 使用的細菌種類 ☐ 初始細菌分布 ☐ 各樣本預設製備條件

1.2 此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

☐ 各瓊脂板的初始細菌分布平均。

☐ 器材不會帶入額外污染。

☐ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。

☐ 若紙碟附近沒有菌落形成，這代表該位置的所有細菌已死亡。

1.3 若想知道抗生素是否影響細菌生長，你會如何設計對照組？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

1.4 測試樣本共有 4 種：抗生素 X、Y、Z 及對照組。你認為每種樣本共需測試多少次？為什麼？


部分 2｜實驗結果、量度、計算與分析

2.1 量度並記錄清晰區的總直徑（mm）


三塊獨立瓊脂板｜共同模擬條件：30°C、24 小時｜紙碟直徑 6 mm

請用直尺通過圓心量度總直徑（包括紙碟）；無紙碟外清晰區時記錄為 0 mm。量度容差：±1 mm。


瓊脂板 1



瓊脂板 2



瓊脂板 3



		樣本 X	樣本 Y	樣本 Z	樣本 C
瓊脂板 1	清晰區存在	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	總直徑 (mm)				
瓊脂板 2	清晰區存在	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	總直徑 (mm)				
瓊脂板 3	清晰區存在	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	總直徑 (mm)				

2.2 總直徑的平均值計算

X 的平均值(mm)	Y 的平均值(mm)	Z 的平均值(mm)	C（對照）的平均值(mm)

2.3 清晰區的出現代表甚麼？

☐ A. 區內所有細菌都已死亡。

☐ B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。

☐ C. 區內細菌對所有抗生素都有抗藥性。

☐ D. 樣本已消滅瓊脂板上的病毒。

2.4 清晰區的直徑大小代表甚麼？

☐ A. 瓊脂板上剩餘細菌的確實數目。

☐ B. 該抗生素治療患者的效能；直徑最大就是最佳治療。

☐ C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。

☐ D. 患者應使用的抗生素劑量。

2.5 試根據實驗結果作出結論：

在本次模擬條件下，（☐ X　☐ Y　☐ Z　☐ C　☐ 沒有樣本）能有效抑制 MRSA 的生長。

以本次清晰區的平均總直徑比較，它們的抑制效能為：只排列有可見清晰區的樣本。以「／」刪去不適用位置。

_____ > _____ > _____ > _____

2.6 為何需要重複進行實驗？

☐ A. 為了確保每一次實驗都能得到百分之百完全相同、毫無落差的絕對數值。
☐ B. 為了延長實驗時間，以便讓科學家在撰寫報告時有更多的文字可以描述。
☐ C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。
☐ D. 為了透過反覆操作，促使實驗中的生物樣本在短時間內加速突變出全新性狀。

2.7 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？

☐ A. 刪去不符合原始假說的數據，令結果一致。
☐ B. 只保留最大的讀數，因為它最能反映抑制效能。
☐ C. 直接計算平均值，因為平均值能消除所有操作問題。
☐ D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。

2.8 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？

☐ A. 確保所有紙碟周圍的清晰區直徑相同。
☐ B. 指出最適合患者使用的抗生素。
☐ C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。
☐ D. 增加 X、Y、Z 紙碟所含的樣本量，以增加實驗結果的準確性。

部分 3｜整合解釋

從你的實驗結果中，選出一個能抑制細菌生長的抗生素樣本，引用讀數支持你的判斷。假如這群細菌原本已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用該抗生素後，它的效果可能如何改變？請運用「課題需知」，解釋細菌的存活、繁殖及抗性特徵的遺傳如何造成這個變化。