工作紙一：脂質消化的概念與應用


姓名：_____　班別：_____　學號：_____

請先閱讀「課題需知」，再運用概念分析各組結果。

課題需知


01　膽汁：乳化脂質

本教學模型設定消化液 X 是**膽汁**。**膽汁**由肝臟製造，儲存於膽囊，不含消化酶。它把大油滴**乳化**成**小油滴**，增加同量脂質的**總表面積**，有助**脂肪酶**作用。這屬**物理消化**，脂質分子的結構沒有改變。



02　胰液中的脂肪酶：催化化學消化

本教學模型設定消化液 Y 是**胰液**，含有**脂肪酶**。**脂肪酶**負責催化脂質的**化學消化**；本課以完全水解的簡化模型，表示**甘油三酯**分解為**甘油**與**脂肪酸**，以助吸收。**脂肪酶**是**蛋白質**，高溫可使其**變性**，失去功能。



情境：脂質需要消化，才能被吸收。加入消化液 X 或消化液 Y 後會怎樣？



部分 1｜研究情境與公平比較

研究員在相同油水混合物分別加入 2 mL X 或 2 mL Y；在 37°C 同樣搖勻，比較一小時後的外觀。

1. 辨識實驗變量：每列可選多於一項。

IV（主動改變的因素）；DV（量度或觀察的結果）；CV（保持不變的因素）

獨立變量	油和水總體積 ／ 反應溫度 ／ 反應時間 ／ 加液總量 ／ 搖勻方式 ／ 混合物外觀 ／ **消化液組合**
因變量	油和水總體積 ／ 反應溫度 ／ 反應時間 ／ 加液總量 ／ 搖勻方式 ／ **混合物外觀** ／ 消化液組合
控制變量	**油和水總體積 ／ 反應溫度 ／ 反應時間 ／ 加液總量 ／ 搖勻方式** ／ 混合物外觀 ／ 消化液組合

2. 選出公平比較所需的前提（可多選）

（假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。）

☑ **各裝置在相同反應時間後觀察。**


☑ **各裝置起始油水量及加入液體的總量相同。**

☑ **各裝置使用相同搖勻方式。**

☐ X 組可加入較多總液量，以便與 Y 組比較。

部分 1｜運用概念分析 X、Y 的個別作用

兩組均為加入消化液並搖勻後一小時的模擬結果。

X 組	Y 組
加入 2 mL X	加入 2 mL Y
	
混濁乳狀液	油層變薄，仍有分層

運用乳化與表面積概念，分析 X 如何幫助 Y。

研究員重新準備兩支試管，先加 X 或等量水並搖勻，再加入相同量的 Y；兩組的預處理時間相同。

部分 2｜延伸一：X 如何幫助 Y？

以下為加入 Y 後一小時的模擬結果。

先加 X，再加 Y	先加水，再加 Y
X 1 mL → Y 1 mL	水 1 mL → Y 1 mL
	
混濁程度減低 沒有明顯油層	油層變薄 仍有油水分層

3. X 如何有助其後 Y 的作用？

X 先把大油滴分散成小油滴，令同量脂質的總表面積：

☑ **增加**

☐ 減少

部分 2｜延伸一：接續分析

4. 外觀能告訴我們甚麼？

☑ 外觀可提供消化液作用的線索，但不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸。

☐ 只要油層消失，就已完全證明脂質分解成甘油和脂肪酸。

部分 3｜延伸二：煮沸的影響

研究員以延伸一的未煮沸 X 後加 Y 組為比較基準。每次只煮沸一種液體，冷卻至 37°C，按相同次序各加 1 mL X、Y；觀察一小時後結果。

煮沸 X＋未煮沸 Y


冷卻後使用



混濁減低，無明顯油層

未煮沸 X＋煮沸 Y

冷卻後使用



混濁乳狀液

5. 煮沸後失去作用的消化液

☐ 消化液 X

☑ 消化液 Y

整合解釋

6. 綜合實驗結果與課題需知，解釋膽汁與胰液中的脂肪酶如何共同幫助脂質消化，以及煮沸如何影響它們的作用。

膽汁不含消化酶，透過物理消化把大油滴乳化成小油滴，脂質分子沒有改變。小油滴使同量脂質的總表面積增加，讓脂肪酶接觸更多脂質。胰液中的脂肪酶催化脂質的化學消化，按本課完全水解簡化模型，將脂質分解為甘油與脂肪酸。脂肪酶是蛋白質，煮沸使其變性，失去催化功能，冷卻後也不能恢復原來的作用；本模型中的膽汁則在煮沸後仍保留乳化作用。