

“信東”喜達隆注射劑(西華美達諾)

Cetazone Injection (Cefmetazole)

本劑係由屬Cephameycin類抗生素Cefmetazole Sodium所製成的注射用製劑。
Cefmetazole Sodium是在Cephem結構之7 α 位接有Methoxy基的新形化合物，具有對 β -lactamase 強抵抗性，其所具殺菌作用與Cephalosporin類抗生素比較，特別是對革蘭氏陰性桿菌(大腸菌、肺炎桿菌、Indole陽性及陰性變形菌)，厭氧桿菌屬呈現強抗菌力。本劑投與後，在體液、臟器內移行良好，在體內不被代謝，幾乎以原體由尿中排泄。

【成分】

主成分：Each vial contains：

Cefmetazole Sodium 250mg、500mg、1g、2g (力價)


賦形劑：無。

本劑用注射用蒸餾水溶解時之pH值與滲透壓比如下：

1 Vial 中含量	溶解液加入量	pH	滲透壓比 (與生理食鹽液對比)
250mg(力價)	2.5mL	4.2~6.2	約1
500mg(力價)	5mL		
1 g(力價)	10mL		
2 g(力價)	(點滴用)20mL		

【性狀】

Cefmetazole Sodium性狀



Cefmetazole Sodium為白色～淡黃色粉末或塊狀，無味或有極微特殊味道，易溶於水，Methanol，Acetone，微溶於Ethanol，Isopropanol，不溶於Chloroform，Ethylacetate及Benzene。

【作用】

1. 抗菌作用：

- (1) Cefmetazole Sodium因對 β -lactamase抵抗性高，故對不論是否產生 β -lactamase之感受性細菌均具有同樣之抗菌力。
- (2) 本劑對大腸菌、肺炎桿菌、Indole陰性變形菌之抗菌力效果良好，對一般Cephalosporins類及Penicillins類無感受性之Indole陽性變形菌亦具有抗菌力。又對厭氧性桿菌屬亦具抗菌力。
- (3) 凡對本劑有感受性的大腸菌、肺炎桿菌、變形菌(Indole陽性及陰性)厭氧桿菌屬等引起的下列感染症均有效：敗血症、支氣管炎、支氣管擴張症之感染、肺炎、慢性呼吸器疾患之二次感染、肺化膿症(肺膿瘍)、膿胸、膽管炎、膽囊炎、腹膜炎、腎盂腎炎、膀胱炎、子宮內感染。

2. 吸收、代謝、排泄：

- (1) 血中濃度、臟器內濃度 健康成人靜脈內注射本劑一次1g(力價)時，其血中濃度隨個人而異，10分鐘後可達平均188 μ g/mL，6小時後平均1.9 μ g/mL。如以點滴靜注本劑1g(力價)經1小時，在點滴終點時測試最高值可達平均76.2 μ g/mL，6小時後平均2.7 μ g/mL(半衰期約1小時左右)。又本劑向膽汁中排泄和向子宮內移行均比Cephazolin良好。
- (2) 尿中排泄 靜脈內注射本劑由於在尿中排泄良好，在體內不被代謝，以具有抗菌活性之原體由尿中排泄，6小時後在尿中之回收率高達85~90%。

3. 毒性：

急性毒性LD₅₀值(mg/kg)

動物種類 投與路徑	Mouse		Rat
	雄	雌	雄、雌
靜脈內	9,333	8,690	5,000 以上
腹腔內	10,233	10,352	7,500 以上
皮下	12,190	12,480	12,500 以上

喜達隆注射劑-3版 仿單 尺寸：13x22cm (反面)_1040810

◎ 亞急性、慢性毒性

(Rat 250, 500, 1000, 2000 mg/kg 5週靜脈內)

(Rat 125, 250, 500, 1000 mg/kg 26週腹腔內)

上列任何途徑投與，除了在高用量群裡發現軟便，全投與群裡盲腸膨滿和腹腔內投與之後全群腸間膜遭致輕度的異物反應外，本劑大致在一般症狀，血液學檢查、臨床化學檢查上均未曾發生任何特別異樣現象。

◎ 畸胎性試驗

(Rat 500, 1000, 2000 mg/kg/day妊娠第7日～11日間靜脈內)

與對照組比較下，經本劑投與後母體、胚胎、胎兒、新生兒均未曾發生任何假想的異常症候。

【適應症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染。

【用法・用量】

通常成人1日量1～2g(力價)，分成2次，施行靜脈內注射或點滴靜注。小孩一日量25～100mg(力價)/kg，分成2～4次，施行靜脈內注射或點滴靜注。然而，對於難治性或重症感染症應依症狀增量至成人一日量4g(力價)，小孩一日量150mg(力價)/kg，均分成2～4次投與。

靜脈內注射時，本劑每1g(力價)，可用注射用蒸餾水或生理食鹽液或葡萄糖注射液10mL溶解之，然後緩慢注射。另外，本劑亦可加入輸注液內以行點滴靜注。

當點滴靜注使用100mL大瓶輸注液溶解時，請勿使用注射用蒸餾水(恐影響溶液等張比)。

【使用上之注意】

1. 為預測休克等反應，需充分的問診，並宜於使用前施行皮膚試驗。
2. 曾對Cephem類(Cephalosporins類及Cephame類)藥劑有過敏性之患者，請勿投與。
3. 曾對Penicillins類藥劑有過敏性之患者，須慎重投與。
4. 本人、血親、兄弟有支氣喘息、發疹、蕁麻疹等過敏性體質之患者，須慎重投與。
5. 有高度腎障害患者須慎重投與。
6. 使用本劑治療之患者，除Tes-Tape反應外，用Benedict氏或Fehling氏試液或Clinitest時，可能發生尿糖假陽性反應，用Jaff反應檢查Creatinine時可能發生高Creatinine值。某些患者在治療時，對Coomb氏試驗呈陽性反應。
7. 動物試驗(老鼠)，本劑與Furosemide等利尿劑併用有腎障害增強的報告。
8. 由於靜脈內大量投與可能招致血管痛的關係，除要注意注射液的調整，注射部位及注射方法外，注射速度儘可能減慢較為適宜。
9. 本劑溶解後儘可能快速使用，必要時可室溫保存並於24小時內使用。
10. 本藥限由醫師使用。

【副作用】

1. 休克：罕有休克症狀發生，須詳細的觀察，有不快感、口內異常感、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、發汗等症狀出現時，停止投與。
2. 過敏症：發疹、蕁麻疹、紅斑、搔癢、發汗等過敏症狀發生時，停止投與，實施適當的處置。
3. 腎臟：罕有BUN上昇。
4. 肝臟：罕有S-GOT，S-GPT，Alkaliphosphatase上昇之現象發生。
5. 血液：罕有嗜酸性血球增多、白血球減少，紅血球減少之現象發生。
6. 胃腸：有時噁心、嘔吐、下痢等現象發生。
7. 菌交代現象：罕有Candida症發生。
8. 其它：罕有頭痛現象發生。

【貯藏】

室溫保存。

【包裝】

250mg、500mg、1g、2g 玻璃小瓶裝，100 支以下盒裝。

衛署藥製字第 035182 號 G-2929



信東生技股份有限公司 觀音廠
桃園市觀音區樹林里國建一路1號

54031459③