

# ভিক্যাপ®

সফট জিলাটিন ক্যাপসুল

মেট্রোনিডাজল বিপি, নিওমাইসিন সালফেট বিপি, পলিমিক্সিন বি সালফেট ইউএসপি, নিস্টাটিন বিপি

#### উপাদান

প্রতিটি ভিক্যাপ® ভ্যাজাইনাল সফট জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে মেট্রোনিডাজল বিপি ২০০ মি.গ্রা. নিওমাইসিন সালফেট বিপি ৩৫,০০০ আইইউ, পলিমিক্সিন বি সালফেট বিপি ৩৫,০০০ আইইউ, নিস্টাটিন বিপি ১,০০,০০০ আইইউ।

#### ফার্মাকোলজি

মেট্রোনিডাজল একটি নাইট্রোইমিডাজল যা বিভিন্ন ধরনের অ্যানেরোবিক ব্যাকটেরিয়া এবং প্রোটোজার বিরুদ্ধে কার্যকর। নিস্টাটিন একটি পলিন এন্টিবায়োটিক ও ছত্রাকনাশক। নিওমাইসিন একটি অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়ানাশক, যা গ্রামপজিটিভ ও গ্রামনেগেটিভ জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর। পলিমিক্সিন সিউডোমোনা জ অ্যারোজিনাস সহ অন্যান্য গ্রামনেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর।

#### নির্দেশনা

ভ্যাজাইনাল ট্রাকোমোনিয়াসিস, লিওকোরিয়া, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রদাহে নির্দেশিত।

#### ব্যবহার বিধি ও মাত্রা

রাতে ঘুমোনের সময় একটি করে ভ্যাজাইনাল সাপোজিটরী ১২ দিন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

#### অনুপযোগিতা

মেট্রোনিডাজল, নিওমাইসিন সালফেট, পলিমিক্সিন বি সালফেট এবং নিস্টাটিন এর প্রতি সংবেদনশীলতা আছে এমন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অনুচিত।

#### পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

কদাচিৎ চামড়ায় লাল দাগ, চুলকানি দেখা দিতে পারে।

#### গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

#### সতর্কতা

কিডনীর জটিলতা আছে এমন ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

#### সংরক্ষণ

আলো ও অর্দ্রতা থেকে দূরে রাখুন। ২৫°সে. তাপমাত্রার নীচে সংরক্ষণ করুন।

#### সরবরাহ

ভিক্যাপ®: প্রতি বাক্সে আছে ৬টি সফট জিলাটিন ক্যাপসুল ব্লিষ্টার প্যাকে।

® ট্রেডমার্ক  
প্রস্তুতকারক  
 **রেনাটা লিমিটেড**  
মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ

# VCAP®

Soft gelatin Capsule

**Metronidazole BP, Neomycin Sulphate BP, Polymyxin B Sulphate USP, Nystatin BP**

#### COMPOSITION

Each Vcap® vaginal Soft gelatin capsule contains Metronidazole BP 200mg, Neomycin Sulphate BP 35,000 IU, Polymyxin B Sulphate BP 35,000 IU, Nystatin BP 1,00,000 IU.

#### PHARMACOLOGY

Metronidazole, a nitroimidazole, is active against various anerobic bacteria and protozoa. Nystatin is a polyene antibiotic with antifungal activity. Neomycin is an aminoglycoside. It is bactericidal and active against some gram-positive and gram-negative organisms. Polymyxin is active against gram-negative organisms including *Pseudomonas aeruginosa*.

#### INDICATION

Vaginal trichomoniasis, vaginal leucorrhoeas, mixed vaginal infections (Fungal or Bacterial).

#### DOSAGE & ADMINISTRATION

One suppository in vagina at bedtime for 12 days, or as directed by the physician.

#### CONTRAINDICATIONS

Contraindicated to the patients who are hypersensitive to Metronidazole, Neomycin Sulphate, Polymyxin B Sulphate and Nystatin.

#### SIDE EFFECT

Skin rash, urticaria may occur rarely.

#### USE IN PREGNANCY AND LACTATION

Caution should be practiced in pregnancy and lactation.

#### PRECAUTION


Caution should be taken in case of renal impairment.

#### STORAGE

Store below 25° C temperature, protected from light & moisture.

#### HOW SUPPLIED

**Vcap®:** Each box contains 6 Soft gelatin capsules in blister pack.

® Trade Mark  
Manufactured by  
 **Renata Limited**  
Mirpur, Dhaka, Bangladesh