

До повторного прийому алерголога

Лада, 33 роки · До прийому 14.09.2026 · Мої нотатки станом на 13.09

Коротко: чому звертаємося знову

Після прийому 09.09 у Лади 10.09 знову був напад із набряком язика й горла, вона застосувала ЕріПен. **10.09 до нападу вона нічого не їла.** Між нападами залишаються набряки, повертаються плями й свербіж, вона дуже мало їсть і часто відчувається виснаженою. Хочемо зрозуміти, як діяти далі та чи потрібна госпіталізація.

З дитинства в Лади сезонні нежить, слюзотеча й чхання, з 2021 року вони стали сильнішими. З 2022 року повторюються напади анафілаксії з набряком язика/горла й утрудненим диханням. Спочатку ми пов'язували напади з манго. Потім кілька нападів сталися після звичних для неї продуктів, а 10.09 - взагалі без їжі того дня. Раніше зв'язок із їжею здавався зрозумілішим, тепер ми не знаємо, у чому він полягає. У серпні-вересні 2026 вони почастишали: 06.08, 26.08, 28.08, 07.09 та 10.09.

Що сталося після останнього прийому

10.09. Зранку почувалася не дуже добре. Дорогою до своєї квартири, у таксі з відкритими вікнами, стало гірше, з'являлися червоні плями й дрібні цятки. Пізніше швидко набрякли язик і горло. Ввела ЕріПен, викликала швидку; після ін'єкцій суттєво краще не стало. Після виписки в іншій клініці зробили крапельницю, від якої стало значно краще. Її склад я не знаю. **Того дня до нападу вона нічого не їла.**

11.09. Плями й погане самопочуття повернулися. У тій самій клініці не змогли встановити венозний доступ. У мене вдома з'їла близько 100 г вареного м'яса й кілька ложок вареної картоплі. Потім виник **дуже сильний біль у животі: вона лежала в ліжку, згорнувшись і підтягнувши коліна до живота, іноді плакала від болю.** Сказала, що трохи набрякли язик і горло. Я був поруч до ранку, вона зрештою заснула.

12.09. Стало краще: біль у животі зменшився, плями й цятки майже зникли. Набряки тіла, можливо, посилилися. З'їла три яйця за два прийоми; після їжі були біль і нудота, але біль був слабшим, ніж напередодні. Майже весь день спала, особливо після їжі.

13.09. Зранку почувалася краще й вийшла на прогулянку. Після повернення з'їла одне яйце; ми помітили повернення плям і цятки, і вона перестала їсти. Посилюлися біль у животі, втома й сонливість. Після цього заснула.

Інші ліки та добавки

Також використовує назальний спрей Ріалтріс та очні краплі Опатанол, Максидекс і Окомістин. Приймає Флебодіа 600 мг по 1 таблетці, протизаплідні таблетки Жастінда, після COVID - омега-3 та цинк. Іноді приймає Декатилен: горло болить понад місяць, вона припускає зв'язок з алергією.

Тразодон (Триттіко) 50 мг увечері призначили під час госпіталізації 29.08, коли вона хворіла на COVID; приймала лише 4 дні й припинила. Гідазепам 20 мг - лише кілька разів. Парацетамол - тільки під час COVID. Ібупрофен від невралгії - один раз за порадою лікарів швидкої.

Лікування та інші важливі обставини

Як вона фактично приймала ліки

Після прийому 09.09 вона лише один день пробувала нову схему й відчула, що їй недостатньо. Цього тижня приймала ліки нерегулярно, змінювала прийом залежно від самопочуття. Різні лікарі давали різні рекомендації, і стало складно дотримуватися однієї схеми.

Фактично дексаметазон був у таблетках по 0,5 мг: 12.09 - 3 таблетки за день (1,5 мг); 11.09 - 5 таблеток (2,5 мг); перед цим - приблизно 4 таблетки (2 мг). Супрастин припинила через сильну втому й сонливість. Раніше їй радили дексаметазон 1 мг 2-4 рази на день і Супрастин 25 мг двічі на день, але це не той режим, якого вона весь час дотримувалася.

У довідці лікарні від 10.09 записані самостійне введення адреналіну, дексаметазону і Супрастину. Після цього була окрема крапельниця в іншій клініці.

Що ще я помічаю

У мене вдома в центрі міста, де менше рослинності, свербіж та інші подібні симптоми часто слабші. Коли вона повертається до свого району, їй нерідко гірше. Вона пов'язує це з пилком. Раніше персики, кисломолочний сир і тунець їла без проблем; тепер нам важко зрозуміти зв'язок погіршень із їжею.

Приблизно місяць **вона їсть дуже мало**, раніше це були кілька ложок кисломолочного сиру й слива кілька разів на день, останнім часом ще менше. Моя приблизна оцінка останніх тижнів - близько 150-200 ккал на день. Їсти заважають відсутність апетиту, нудота, біль і страх нового нападу.

Її зріст 170 см. Зараз вага приблизно 62-63 кг, 11.09 була 61 кг. Сильно набряклі обличчя, руки й ноги; це помічають навіть люди під час відеодзвінків. Я припускаю, що швидкий приріст ваги пов'язаний із набряками.

З серпня є постійні біль у животі, здуття й нудота, чергуються діарея та відсутність випорожнень. У березні була кишкова непрохідність без операції; у 2024-2026 - кілька гінекологічних операцій, навесні з кровотечами та спайками з кишківником.

COVID почався приблизно 26.08.2026: близько 7-8 днів високої температури, на початку вересня - коротке покращення. Останній місяць був особливо важким: повторні напади, звернення по невідкладну допомогу, біль у животі та дуже мало їжі.

Обстеження

29.08 триптаза була 11,6 мкг/л (референс <11); кров узяли приблизно через 5-6 годин після початку нападу. Інші заплановані аналізи раніше не вдалося здати через нові погіршення.

Які аналізи хочемо зробити зараз

ALEX 3. В експертному роз'ясненні Американської академії алергології (AAAAI) зазначено, що аналіз крові на специфічні IgE можна робити в будь-який час після анафілаксії. Ситуація складна: напади повторюються, Лада майже не їсть. Тому ми хотіли б зробити ALEX 3 зараз, а за потреби повторити пізніше, зокрема якщо результат не пояснить реакцій.

Комплексна діагностика САН: С4, концентрація та активність інгібітора С1-естерази. Також хочемо зробити цей комплекс через повторні набряки й напади болю в животі, щоб перевірити інший можливий механізм набряку.

Що хочемо вирішити на прийомі

Як контролювати щоденні алергічні симптоми та зрозуміти й контролювати повторні напади анафілаксії?

Що й коли обстежити, як безпечно відновити харчування та чи потрібне лікування в стаціонарі?