

Перелік аналізів

Лада · До візиту 14.09.2026 · Назви з каталогу «Добробут / Добролаб»

Кров: загальні та біохімічні дослідження

Загальний розгорнутий аналіз крові

Калій

Натрій

Хлориди

Бікарбонати (HCO_3^-)

Фосфор неорганічний

Магній

Глюкоза крові

Кальцій

Кальцій іонізований

Креатинін крові

Сечовина

Альбумін

Загальний білок

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

Лужна фосфатаза

Білірубін загальний

Феритин

Насиченість трансферина залізом

С-реактивний білок (кількісний)

Сеча

Аналіз сечі загальний

Співвідношення альбумін/креатинін (САК) сечі

Алергологічні та імунологічні дослідження

Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX 3 (Заг. IgE + специфічний IgE до 300 (299+CCD) алергенів)

Триптаза

Комплексна діагностика САН (фактор комплементу C4, інгібітор C1-естерази конц. та акт.)

Навіщо хочемо зробити ці аналізи

Лада · Короткі пояснення до переліку

Алергія та повторні набряки

Мультикомпонентна алергодіагностика ALEX 3 (Заг. IgE + специфічний IgE до 300 (299+CCD) алергенів)

Для пошуку можливих алергенів і зіставлення результатів із нападами.

Триптаза

Для порівняння з результатом 11,6 мкг/л від 29.08. Якщо гострі симптоми тривають або минуло менше 24 годин після їх завершення, для базового рівня потрібен буде повторний зразок.

Комплексна діагностика САН (фактор комплементу C4, інгібітор C1-естерази конц. та акт.)

Через повторні набряки та напади болю в животі хочемо перевірити інший можливий механізм набряку.

Харчування та електроліти

Калій; Натрій; Хлориди; Бікарбонати (HCO₃-)

Через тривале дуже обмежене харчування, набряки та слабкість. Калій 29.08 був 5,87 ммоль/л - потрібен свіжий результат.

Фосфор неорганічний; Магній

Потрібні для оцінки стану після тривалого недоїдання та контролю під час збільшення кількості їжі.

Глюкоза крові

Через дуже мале споживання їжі, виражену сонливість і прийом дексаметазону.

Кальцій; Кальцій іонізований

Повторна перевірка кальцію: 29.08 іонізований кальцій був 1,000 ммоль/л. Загальний кальцій оцінюють разом з альбуміном.

Набряки: нирки, білок і печінка

Креатинін крові; Сечовина

Перевірка роботи нирок на тлі набряків і змін харчування та пиття.

Альбумін; Загальний білок

Для з'ясування причин виражених набряків.

Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Білірубін загальний

Перевірка печінкових показників на тлі набряків, болю в животі та прийому ліків.

Аналіз сечі загальний; Співвідношення альбумін/креатинін (САК) сечі

Перевірка змін у сечі та втрати альбуміну через нирки як однієї з можливих причин набряків. САК вимірює альбумін, а не весь білок сечі.

Кров та запаси заліза

Загальний розгорнутий аналіз крові

Хочу повторно перевірити гемоглобін та інші показники крові: 29.08 гемоглобін був 111 г/л, MCV 78,8 фл; раніше були значні кровотечі.

Феритин; Насиченість трансферина залізом; С-реактивний білок (кількісний)

Перевірка запасів і доступності заліза після кровотеч та обмеженого харчування. С-реактивний білок допоможе оцінити запалення й тлумачити феритин.

Назви аналізів є посиланнями на сторінки dobrobut.com (перевірено 13.09.2026). Обґрунтування: NICE CG32; Merck: набряки; BSG: анемія; AAAAI/ACAAI: анафілаксія; WAO: ангіонабряк.