

Ліки Лади

Щоденний розклад • Початок 14 вересня 2026 року

Розклад для спрощеної схеми. Час можна змістити під сон і прийоми їжі, зберігаючи інтервали. Приклад: сніданок о 09:00, вечір о 19:00.

14 вересня: Медрол 16 мг уже прийнято о 13:00; омепразол теж уже прийнято. Не повторювати ранкові дози сьогодні. Таблиця нижче показує звичайний повний день.

Коли	Що і скільки
08:00 За 1 годину до їжі	Ніксар 10 мг - 1 таблетка. З водою. Їжа та соки: не раніше ніж через 1 годину після таблетки; якщо вже поїла - зачекати 2 години до прийому.
08:30 За 30 хв до сніданку	Омепразол / Оmez 20 мг - 1 капсула.
09:00 Після сніданку	Медрол 16 мг. Серетид Евохалер 25/125 мкг - «1 доза». Кількість натискань уточнити; після прийому прополоскати рот і виплюнути воду. Ріалтріс - «1 доза». Кількість розпилень у кожен ніздрю уточнити. Опатанол 1 мг/мл - по 1 краплі в кожне уражене око.
17:00	Опатанол - по 1 краплі в кожне уражене око; приблизно через 8 годин після ранкового прийому.
19:00 Після вечір	Медрол 8 мг. Разом із ранковими 16 мг це 24 мг на добу.
21:00 Не раніше ніж через 2 години після їжі	Ніксар 10 мг - 1 таблетка. Потім 1 годину без їжі та соків. Серетид і Ріалтріс - повторити призначені дози. Після Серетиду прополоскати рот.

У цій спрощеній схемі не приймаємо: Домрид SR, Гленцет Едванс і фамотидин / Квамател. Для шлунка залишено омепразол. Дексаметазон не додаємо до Медролу.

Не надолжувати пропуски подвійними дозами. Позначати прийом одразу після нього. Не відмовлятися від їжі заради часу Ніксару - краще змістити таблетку.

Строки та важливі примітки

Усі курси відраховано від **14.09.2026**. Останній зазначений день входить у курс. Після завершення курсу прибрати відповідний рядок зі щоденного розкладу, враховуючи винятки нижче.

Препарат	Початок	Тривалість і останній день
Медрол	14.09.2026	7 днів: 20.09.2026 До цієї дати потрібен план завершення.
Омепразол / Омес	14.09.2026	14 днів: 27.09.2026
Ніксар	14.09.2026	30 днів: 13.10.2026
Ріалтріс	14.09.2026	30 днів: 13.10.2026
Опатанол	14.09.2026	30 днів: 13.10.2026
Серетид Евохалер	14.09.2026	90 днів: 12.12.2026 Подальше лікування астми визначити до завершення.

Що найважливіше

ЕпіПен має бути доступний завжди. Мати при собі 2 справні автоін'єктори по 0,3 мг. Це засіб для анафілаксії, не щоденна доза. Якщо тяжкі прояви зберігаються після першого введення, повторна доза через 5 хвилин; не чекати надруковані у призначенні 30 хвилин.

Серетид приймати регулярно для контролю астми. Він не є інгалятором швидкої допомоги. **Ніксар** залишено для щоденних алергічних симптомів; Ріалтріс та Опатанол - для носа й очей.

Два уточнення щодо доз

Серетид і Ріалтріс: у призначенні написано «1 доза двічі на день», але не визначено кількість натискань та розпилень у кожну ніздрю. Ці числа потрібно уточнити перед використанням таблиці як точного дозатора. Не збільшувати дозу за здогадкою.

Медрол: 20 вересня - кінець записаного 7-денного курсу, а не автоматична вказівка різко припинити стероїд. Через попередній дексаметазон до цієї дати потрібна конкретна схема: припинення чи зниження. Самостійно не збільшувати дозу і не продовжувати курс.

Аналіз на *Helicobacter pylori*

Омепразол може зробити аналіз калу хибнонегативним. Якщо остання доза буде **27.09**, три повні тижні без нього завершаться **18.10**; практична дата здачі - з **19.10.2026** за умови виконання правил лабораторії. Недавні антибіотики або препарати вісмуту можуть змінити дату. Цей інтервал відповідає трьом тижням у направленні.

Ця пам'ятка стосується перелічених ліків. Вона не змінює окрему схему Жастінди чи інших постійних препаратів.