

Ліки Лади та щоденний розклад

14 вересня 2026 року • Пам'ятка для щоденного користування

Найважливіше: мати при собі ЕпіПен і регулярно приймати Серетид. Медрол приймати за узгодженою схемою без самовільних змін. Квамател і Домрид потребують уточнення перед включенням у розклад.

Приклад дня

Час можна змістити під сон та їжу. Приклад: сніданок о 09:00, вечеря о 19:00. Це розклад повного дня; сьогодні не надолужувати вже пропущені прийоми подвійними дозами.

Коли	Що приймати
08:00 • за годину до сніданку	Ніксар 10 мг — 1 таблетка. 3 водою, без їжі та соків. Якщо вже поїла — зачекати 2 години.
08:30 • лише після вирішення питання аналізу	Омез 20 мг — 1 капсула за 30 хв до сніданку. Спочатку узгодити послідовність з аналізом калу на H. pylori (стор. 2).
09:00 • після сніданку	Медрол 16 мг — 1 таблетка по 16 мг. Серетид 25/125 мкг — призначена доза; кількість вдихів уточнити. Після — прополоскати рот і виплюнути воду. Ріалтріс — призначена доза; кількість розпилень у кожну ніздрю уточнити. Опатанол 1 мг/мл — по 1 краплі в уражене око / обидва уражені ока.
17:00	Опатанол — повторити по 1 краплі в уражене око / очі; приблизно 8 годин після ранкового прийому.
19:00 • після вечері	Медрол 8 мг — ½ таблетки по 16 мг. Гленцет Едванс — 1 таблетка ввечері; їжа не має значення.
21:00 • не раніше ніж через 2 години після їжі	Ніксар 10 мг — 1 таблетка; після не їсти та не пити соки 1 годину. Серетид і Ріалтріс — повторити призначені дози. Після Серетиду прополоскати рот.

Квамател: лише ОДНА з двох схем після уточнення. **Домрид SR:** поки не включати в автоматичний щоденний прийом; див. стор. 2.

ЕпіПен 0,3 мг — для анафілаксії, не за годинником. Мати доступні 2 автоін'єктори. Надруковане очікування 30 хв до повторної дози неправильне: якщо тяжкі прояви зберігаються, повторна доза через 5 хв.

Позначати кожний прийом одразу в телефоні або на папері. Якщо прийом пропущений — не подвоювати; звірити правило для конкретного препарату. Не урізати харчування заради розкладу Ніксару: зміщувати його час.

Уточнення та строки лікування

Що не можна просто скласти разом

Квамател = фамотидин. Алерголог: 20 мг двічі на день, інтервал 12 годин, 14–20 вересня. Гастроентеролог: 40 мг перед сном, 14–27 вересня. Кожна схема дає 40 мг на добу. Не додавати одну до іншої. Потрібно визначити одну схему та дату завершення.

Домрид SR = домперидон 30 мг. На папері: 1 таблетка за 15 хв до їжі раз на добу, 18 вересня – 15 жовтня. До початку потрібен перегляд 28-денного курсу: українська інструкція обмежує його одним тижнем. Через тривале недоїдання варто спочатку перевірити ЕКГ, калій і магній та сумісність ліків. Таблетку SR не ділити й не подрібнювати.

Омес = омепразол. Може зробити аналіз калу на *H. pylori* хибнонегативним. Якщо зразок ще не здано, спочатку визначити дату аналізу й чи був недавній прийом ІПП, антибіотиків або вісмуту. Не вважати аналіз достовірним лише тому, що пропущено одну дозу. У направленні вказано 3 тижні без ІПП; звичайний мінімум — 2 тижні, але діють умови конкретної лабораторії.

Що уточнити в короткій відповіді від клініки

Серетид: «1 доза» — скільки саме натискань? Ріалтріс: скільки розпилень у КОЖНУ ніздрю? Самостійно не збільшувати за загальною інструкцією. Серетид не є інгалятором швидкої допомоги; потрібно знати окремий призначений засіб для раптових симптомів астми.

Медрол замінює дексаметазон. Не приймати обидва як паралельні щоденні схеми. Не застосовувати нечітко записане «можливе збільшення» без конкретної вказівки. До 20 вересня потрібен план завершення з урахуванням усіх попередніх стероїдів; самостійно не обирати ні різку відміну, ні продовження.

Пріоритети та строки з призначень

Ліки	Роль та записаний строк
Серетид	Основний щоденний контроль астми • до 07.12; дозу у вдихах уточнити.
Медрол	Короткий курс, важлива точність схеми • 14–20.09; далі окремий план.
Ніксар	Свербіж / алергічні симптоми • 14.09–13.10; не збільшувати самостійно.
Гленцет Едванс	Додатковий засіб • до 08.10. Містить левоцетиризин 5 мг + монтелукаст 10 мг; разом із Ніксаром це два пероральні H1-антигістамінні. Переглянути потребу, особливо при сонливості.
Ріалтріс / Опатанол	Для носа / очей • до 08.10 / до 12.10. Нижчий пріоритет для запобігання тяжким наслідкам, але можуть суттєво полегшувати самопочуття.
Омес	Для кислотозалежних симптомів • курс 14 днів, на папері 14–27.09; початок узгодити з аналізом.

Нижчий пріоритет не означає наказ скасувати препарат. Дати з паперів не підтверджують фактичного початку; пропущені дні не компенсувати самостійним подовженням. Ця пам'ятка охоплює сьогоднішні призначення; Жастінда та інші попередні ліки потребують окремого звірення.