

До прийому гастроентеролога

Лада, 33 роки · До прийому 14.09.2026 · Мої нотатки станом на 13.09

Коротко: що найбільше турбує

Я звертаюся через те, що Лада **майже не їсть**: немає апетиту, після невеликих порцій болить живіт і нудить. Одночасно повторюються напади анафілаксії: частина виникала після їжі, але точний зв'язок нам незрозумілий. Між нападами зберігаються виражені набряки тіла. За останні три дні після їжі щоразу виникав або посилювався **сильний біль у животі**. Хочемо розібратися з болем і харчуванням та зрозуміти, чи потрібна госпіталізація.

Приблизно місяць **вона їсть дуже мало**, раніше це були кілька ложок кисломолочного сиру й слива кілька разів на день, останнім часом ще менше. Моя приблизна оцінка останніх тижнів - близько 150-200 ккал на день. Їсти заважають відсутність апетиту, нудота, біль і страх нового нападу.

Її зріст 170 см. Зараз вага приблизно 62-63 кг, 11.09 була 61 кг. Сильно набряклі обличчя, руки й ноги; це помічають навіть люди під час відеодзвінків. Я припускаю, що швидкий приріст ваги пов'язаний із набряками.

Проблеми з животом раніше

Лада пригадує, що приблизно в 11 років їй говорили про виразку, гастрит або гастродуоденіт. Упродовж життя під час стресу міг приблизно на тиждень зникати апетит і боліти живіт. Приблизно до 22 років важила близько 50 кг, іноді набирала вагу. Відсутність апетиту ще до їжі вона приблизно відносить до минулої зими.

У березні 2026 вона була в лікарні з кишковою непрохідністю: робили багато рентгенівських знімків та інші обстеження, обійшлося без операції. Після цього певний час теж було важко їсти. Вона пам'ятає довічні обмеження в їжі, зокрема щодо макаронів і каш.

Операції, які можуть бути важливими

У 2024-2026 роках перенесла кілька операцій через повторні кісти яєчників. У квітні 2026 були розрив яєчника, сильна кровотеча й видалення частини правого яєчника. У травні - ще одна складна операція, спайки з кишківником, маткою та сечовим міхуром, реанімація й подальше видалення частини правого яєчника через некроз. Приблизно в середині-другій половині серпня 2026, за тиждень до початку COVID 26.08, був ще один розрив кісти; за тиждень стало легше.

Як змінилися симптоми останнім часом

З серпня вона описує постійний біль у животі, здуття, щоденну нудоту, чергування діареї та відсутності випорожнень. Після сильних нападів живіт іноді болить і пече кілька днів, настільки, що заважає спати. Протягом 11-13.09 після їжі щоразу виникав або посилювався **сильний біль у животі**. Вона **їсть дуже мало** й часто не відчуває бажання починати їсти.

COVID почався приблизно 26.08.2026: близько 7-8 днів високої температури, на початку вересня - коротке покращення. Останній місяць був особливо важким: повторні напади, звернення по невідкладну допомогу, біль у животі та дуже мало їжі.

Інші ліки та добавки

Також використовує назальний спрей Ріалтріс та очні краплі Опатанол, Максидекс і Окомістин. Приймає Флебодіа 600 мг по 1 таблетці, протизаплідні таблетки Жастінда, після COVID - омега-3 та цинк. Іноді приймає Декатилен: горло болить понад місяць, вона припускає зв'язок з алергією.

Тразодон (Триттіко) 50 мг увечері призначили під час госпіталізації 29.08, коли вона хворіла на COVID; приймала лише 4 дні й припинила. Гідазепам 20 мг - лише кілька разів. Парацетамол - тільки під час COVID. Ібупрофен від невралгії - один раз за порадою лікарів швидко.

Останні дні, ліки та обстеження

Їжа й самопочуття 10-13 вересня

10.09. Був напад із набряком язика й горла, ЕріПеп, швидка та лікарня; пізніше стало краще після крапельниці в іншій клініці. До нападу того дня не їла.

11.09. Плями й погане самопочуття повернулися. У тій самій клініці не змогли встановити венозний доступ. У мене вдома з'їла близько 100 г вареного м'яса й кілька ложок вареної картоплі. Потім виник **дуже сильний біль у животі: вона лежала в ліжку, згорнувшись і підтягнувши коліна до живота, іноді плакала від болю.** Сказала, що трохи набрякли язик і горло. Я був поруч до ранку, вона зрештою заснула.

12.09. Стало краще: біль у животі зменшився, плями й цятки майже зникли. Набряки тіла, можливо, посилилися. З'їла три яйця за два прийоми; після їжі були біль і нудота, але біль був слабшим, ніж напередодні. Майже весь день спала, особливо після їжі.

13.09. Зранку почувалася краще й вийшла на прогулянку. Після повернення з'їла одне яйце; ми помітили повернення плям і цятки, і вона перестала їсти. Посилилися біль у животі, втома й сонливість. Після цього заснула.

Ліки останнього тижня

Після прийому 09.09 вона лише один день пробувала нову схему й відчула, що її недостатньо. Цього тижня приймала ліки нерегулярно, змінювала прийом залежно від самопочуття. Різні лікарі давали різні рекомендації, і стало складно дотримуватися однієї схеми.

Фактично дексаметазон був у таблетках по 0,5 мг: 12.09 - 3 таблетки за день (1,5 мг); 11.09 - 5 таблеток (2,5 мг); перед цим - приблизно 4 таблетки (2 мг). Супрастин припинила через сильну втому й сонливість. Раніше їй радили дексаметазон 1 мг 2-4 рази на день і Супрастин 25 мг двічі на день, але це не той режим, якого вона весь час дотримувалася.

Попередні аналізи

В аналізах 29.08: гемоглобін 111 г/л, MCV 78,8 фл. У венозній крові калій 5,87 ммоль/л, іонізований кальцій 1,000 ммоль/л.

29.08 триптаза була 11,6 мкг/л (референс <11); кров узяли приблизно через 5-6 годин після початку нападу. Інші заплановані аналізи раніше не вдалося здати через нові погіршення.

Що хочемо вирішити на прийомі

Протягом 11-13.09 після їжі щоразу виникав або посилювався біль у животі, іноді дуже сильний. **Ми не знаємо, що робити з харчуванням:** що їй можна їсти; чи безпечно збільшувати кількість їжі; як швидко це робити; які аналізи потрібні перед цим. Як полегшити біль і нудоту, щоб вона могла їсти, і чи потрібен для цього стаціонар?