

До прийому терапевта

Лада, 33 роки · До прийому 14.09.2026 · Мої нотатки станом на 13.09

Коротко: потрібен погляд на всю ситуацію

Я прошу допомогти оцінити стан Лади загалом і вирішити, чи потрібна госпіталізація. Одночасно є повторні напади анафілаксії з набряком язика/горла, дуже обмежене харчування, біль у животі, наростання набряків і сильна сонливість. Після допомоги в різних закладах стає краще на певний час, але погіршення повертаються.

Приблизно місяць **вона їсть дуже мало**, раніше це були кілька ложок кисломолочного сиру й слива кілька разів на день, останнім часом ще менше. Моя приблизна оцінка останніх тижнів - близько 150-200 ккал на день. Їсти заважають відсутність апетиту, нудота, біль і страх нового нападу.

Її зріст 170 см. Зараз вага приблизно 62-63 кг, 11.09 була 61 кг. Сильно набряклі обличчя, руки й ноги; це помічають навіть люди під час відеодзвінків. Я припускаю, що швидкий приріст ваги пов'язаний із набряками.

COVID почався приблизно 26.08.2026: близько 7-8 днів високої температури, на початку вересня - коротке покращення. Останній місяць був особливо важким: повторні напади, звернення по невідкладну допомогу, біль у животі та дуже мало їжі.

Важлива попередня історія

З дитинства в Лади сезонні нежить, сльозотеча й чхання, з 2021 року вони стали сильнішими. З 2022 року повторюються напади анафілаксії з набряком язика/горла й утрудненим диханням. Спочатку ми пов'язували напади з манго. Потім кілька нападів сталися після звичних для неї продуктів, а 10.09 - взагалі без їжі того дня. Раніше зв'язок із їжею здавався зрозумілішим, тепер ми не знаємо, у чому він полягає. У серпні-вересні 2026 вони почастішали: 06.08, 26.08, 28.08, 07.09 та 10.09.

У березні 2026 була госпіталізація з кишковою непрохідністю, робили численні рентгенівські знімки; одужала без операції. З дитинства бувають біль у животі та втрата апетиту під час стресу. З серпня - постійні біль, здуття й нудота, чергування діареї та відсутності випорожнень.

У 2024-2026 роках перенесла кілька операцій через повторні кісти яєчників. У квітні 2026 були розрив яєчника, сильна кровотеча й видалення частини правого яєчника. У травні - ще одна складна операція, спайки з кишківником, маткою та сечовим міхуром, реанімація й подальше видалення частини правого яєчника через некроз. Приблизно в середині-другій половині серпня 2026, за тиждень до початку COVID 26.08, був ще один розрив кісти; за тиждень стало легше.

Інші ліки та добавки

Також використовує назальний спрей Ріалтріс та очні краплі Опатанол, Максидекс і Окомістин.

Приймає Флебодія 600 мг по 1 таблетці, протизаплідні таблетки Жастінда, після COVID - омега-3 та цинк. Іноді приймає Декатилен: горло болить понад місяць, вона припускає зв'язок з алергією.

Тразодон (Триттіко) 50 мг увечері призначили під час госпіталізації 29.08, коли вона хворіла на COVID; приймала лише 4 дні й припинила. Гідазепам 20 мг - лише кілька разів. Парацетамол - тільки під час COVID. Ібупрофен від невралгії - один раз за порадою лікарів швидкої.

Останні дні та фактичне лікування

Що відбувалося 10-13 вересня

10.09. Зранку почувалася не дуже добре. Дорогою до своєї квартири, у таксі з відкритими вікнами, стало гірше, з'являлися червоні плями й дрібні цятки. Пізніше швидко набрякли язик і горло. Ввела ЕріРеп, викликала швидку; після ін'єкцій суттєво краще не стало. Після виписки в іншій клініці зробили крапельницю, від якої стало значно краще. Її склад я не знаю. **Того дня до нападу вона нічого не їла.**

11.09. Плями й погане самопочуття повернулися. У тій самій клініці не змогли встановити венозний доступ. У мене вдома з'їла близько 100 г вареного м'яса й кілька ложок вареної картоплі. Потім виник **дуже сильний біль у животі: вона лежала в ліжку, згорнувшись і підтягнувши коліна до живота, іноді плакала від болю.** Сказала, що трохи набрякли язик і горло. Я був поруч до ранку, вона зрештою заснула.

12.09. Стало краще: біль у животі зменшився, плями й цятки майже зникли. Набряки тіла, можливо, посилилися. З'їла три яйця за два прийоми; після їжі були біль і нудота, але біль був слабшим, ніж напередодні. Майже весь день спала, особливо після їжі.

13.09. Зранку почувалася краще й вийшла на прогулянку. Після повернення з'їла одне яйце; ми помітили повернення плям і цятки, і вона перестала їсти. Посилювалися біль у животі, втома й сонливість. Після цього заснула.

Ліки

Після прийому 09.09 вона лише один день пробувала нову схему й відчувала, що її недостатньо. Цього тижня приймала ліки нерегулярно, змінювала прийом залежно від самопочуття. Різні лікарі давали різні рекомендації, і стало складно дотримуватися однієї схеми.

Фактично дексаметазон був у таблетках по 0,5 мг: 12.09 - 3 таблетки за день (1,5 мг); 11.09 - 5 таблеток (2,5 мг); перед цим - приблизно 4 таблетки (2 мг). Супрастин припинила через сильну втому й сонливість. Раніше їй радили дексаметазон 1 мг 2-4 рази на день і Супрастин 25 мг двічі на день, але це не той режим, якого вона весь час дотримувалася.

Попередні аналізи

В аналізах 29.08: гемоглобін 111 г/л, MCV 78,8 фл. У венозній крові калій 5,87 ммоль/л, іонізований кальцій 1,000 ммоль/л. 29.08 триптаза була 11,6 мкг/л (референс <11); кров узяли приблизно через 5-6 годин після початку нападу. Інші заплановані аналізи раніше не вдалося здати через нові погіршення.

Що хочемо вирішити сьогодні

Протягом 11-13.09 після їжі щоразу виникав або посилювався біль у животі, іноді дуже сильний. **Ми не знаємо, що робити з харчуванням:** що їй можна їсти; чи безпечно збільшувати кількість їжі; як швидко це робити; які аналізи потрібні перед цим. Як полегшити біль і нудоту, щоб вона могла їсти, і чи потрібен для цього стаціонар?

Як контролювати щоденні алергічні симптоми та зрозуміти й контролювати повторні напади анафілаксії?