

Ліки Лади

Щоденний розклад • Початок 14 вересня 2026 року

Розклад для спрощеної схеми. Час можна змістити під сон і прийоми їжі, зберігаючи інтервали. Підйом о 12:00; сніданок о 13:00, вечір о 23:00. Останній прийом - о 01:00 наступної календарної доби.

Оновлено 21 вересня 2026 року: Ніксар 20 мг вранці; Гленцет Едванс увечері.

Коли	Що і скільки
12:00 За 1 годину до їжі	Ніксар 20 мг вранці. З водою. Їжа та соки: не раніше ніж через 1 годину після таблетки; якщо вже поїла - зачекати 2 години до прийому.
12:30 За 30 хв до сніданку	Омепразол / Омез 20 мг - 1 капсула.
13:00 Після сніданку	Медрол 16 мг (курс до 20.09). NOW B-1 100 мг - 2 таблетки (разом 200 мг). Один раз на день, 10 днів від першого прийому. Серетид Евохалер 25/125 мкг - «1 доза». Кількість натискань уточнити; після прийому прополоскати рот і виплюнути воду. Ріалтріс - «1 доза». Кількість розпилень у кожен ніздрю уточнити. Опатанол 1 мг/мл - по 1 краплі в кожне уражене око.
21:00	Опатанол - по 1 краплі в кожне уражене око; приблизно через 8 годин після ранкового прийому.
23:00 Після вечері	Гленцет Едванс - 1 таблетка. Медрол 8 мг (курс до 20.09). Разом із ранковими 16 мг це 24 мг на добу.
01:00 Наступної доби	Серетид і Ріалтріс - повторити призначені дози. Після Серетиду прополоскати рот.

Ніксар за потреби: лікар дозволив збільшення до **40 мг загалом за добу** (ще 20 мг до ранкових 20 мг). Час додаткової дози не уточнено. Для неї також дотримуватися інтервалу з їжею та соками: за 1 годину до або через 2 години після.

У цій спрощеній схемі не приймаємо: Домрид SR і фамотидин / Квамател. Для шлунка залишено омепразол. Дексаметазон не додаємо до Медролу.

Не надолжувати пропуски подвійними дозами. Позначати прийом одразу після нього. Не відмовлятися від їжі заради часу Ніксару - краще змістити таблетку.

Строки та важливі примітки

Курси старої схеми відраховано від **14.09.2026**; Гленцет Едванс - за призначенням від 18.09; для **NOW B-1** - від першого прийому. Останній зазначений день входить у курс. Прийом о 01:00 належить до попереднього дня розкладу; остання нічна доза - у ніч після зазначеної дати. Після завершення курсу прибрати відповідний рядок зі щоденного розкладу, враховуючи винятки нижче.

Препарат	Початок	Тривалість і останній день
NOW B-1 100 мг	Перший прийом	2 таблетки на добу (200 мг). 10 днів від першого прийому.
Медрол	14.09.2026	7 днів: 20.09.2026 До цієї дати потрібен план завершення.
Омепразол / Оmez	14.09.2026	14 днів: 27.09.2026
Ніксар	14.09.2026	30 днів: 13.10.2026
Гленцет Едванс	За призначенням: 18.09.2026	14 днів: 01.10.2026 1 таблетка ввечері.
Ріалтріс	14.09.2026	30 днів: 13.10.2026
Опатанол	14.09.2026	30 днів: 13.10.2026
Серетид Евохалер	14.09.2026	90 днів: 12.12.2026 Подальше лікування астми визначити до завершення.

Що найважливіше

ЕпіПен має бути доступний завжди. Мати при собі 2 справні автоін'єктори по 0,3 мг. Це засіб для анафілаксії, не щоденна доза. Якщо тяжкі прояви зберігаються після першого введення, повторна доза через 5 хвилин; не чекати надруковані у призначенні 30 хвилин.

Серетид приймати регулярно для контролю астми. Він не є інгалятором швидкої допомоги. **Ніксар** залишено для щоденних алергічних симптомів; Ріалтріс та Опатанол - для носа й очей.

Два уточнення щодо доз

Серетид і Ріалтріс: у призначенні написано «1 доза двічі на день», але не визначено кількість натискань та розпилень у кожну ніздрю. Ці числа потрібно уточнити перед використанням таблиці як точного дозатора. Не збільшувати дозу за згодукою.

Медрол: 20 вересня - кінець записаного 7-денного курсу, а не автоматична вказівка різко припинити стероїд. Через попередній дексаметазон до цієї дати потрібна конкретна схема: припинення чи зниження. Самостійно не збільшувати дозу і не продовжувати курс.

Аналіз на *Helicobacter pylori*

Омепразол може зробити аналіз калу хибнонегативним. Якщо остання доза буде **27.09**, три повні тижні без нього завершаться **18.10**; практична дата здачі - з **19.10.2026** за умови виконання правил лабораторії. Недавні антибіотики або препарати вісмуту можуть змінити дату. Цей інтервал відповідає трьом тижням у направленні.

Ця пам'ятка стосується перелічених ліків. Вона не змінює окрему схему Жастінди чи інших постійних препаратів.