

До консультації алерголога

Лада, 33 роки · 18.09.2026 · Мої нотатки для прийому

Найважливіше про історію та нинішній стан

У Лади **астма та сезонна алергія**: з дитинства нежить, чхання, сльозотеча й свербіж очей. Останніми роками, особливо з 2021 року, симптоми значно посилилися. Вона розповідає про щорічні загострення астми з госпіталізаціями на один або кілька тижнів, іноді з киснем.

З 2022 року почалися тяжкі реакції після їжі, спочатку після страви та напою з манго: набряк язика й горла, утруднене дихання, іноді свербіж, плями, нудота та біль у животі. Потім реакції виникали після звичних продуктів, а згодом і без їжі. Точний зв'язок із продуктами тепер незрозумілий.

За останній місяць стан різко погіршився, особливо після нещодавнього COVID. Одразу після короткого покращення на початку вересня напади почали повторюватися дедалі частіше. Зараз тяжкі погіршення трапляються **кілька разів на тиждень, і нам доводиться викликати швидку кожні кілька днів**. Це анафілаксія або дуже схожі на неї напади; неодноразово застосовували ЕпіПен чи отримували адреналін від лікарів. Лікування дає тимчасове полегшення, але симптоми повертаються. Останній напад із ЕпіПен був уночі 16.09.

Окремо дуже турбують набряки та швидке збільшення ваги

Набряки обличчя, рук, ніг і живота не минають між нападами й наростають. Приблизно 10 днів тому вага була близько 61 кг; останні значення пам'ятаю приблизно як 64 → 65 → **66 кг 17.09**. Це близько 5-6 кг за 1-2 тижні, при зрості 170 см. За сьогодні надійного вимірювання немає. На мою думку, це переважно затримка рідини. Прошу окремо оцінити причину та що з цим робити.

Останні два дні: набряк горла й носа та іноді дуже сильний біль у горлі. 17.09 зверталися до лікарні; після дексаметазону й знеболення стало краще. Сьогодні зранку симптоми повторилися слабше, прийняла Медрол і Німесил через біль у горлі та животі. Зараз краще, але набряк і певний біль залишаються.

Поточне лікування

З 14.09: **Медрол 16 мг зранку + 8 мг увечері; Ніксар 10 мг двічі на день**; омепразол 20 мг на день. Серетид Евохалер 25/125 мкг і Ріалтріс двічі на день, Опатанол по 1 краплі в уражене око двічі на день. Медрол призначений до 20.09. До нього кілька тижнів періодично приймала дексаметазон у змінних дозах; 16-17.09 знову отримувала його під час невідкладної допомоги.

Також останнім часом приймала Жастінда, Флебодія 600 мг, омега-3 та цинк; іноді Декатилен. Супрастин припинила через виражену сонливість.

Важливі результати та реакції на ліки

ALEX 3 вже зробили: позитивні амброзія, полин, пилок жита та компонент селери Арі g 7; загальний IgE 108 kU/L. **Триптаза 29.08 - 11,6 мкг/л**, кров узяли приблизно через 5-6 годин після початку нападу. Базової триптази та C4/інгібітора C1-естерази ще немає. Числові результати й деталі - далі.

Лада згадує сильну алергічну реакцію на **цефтріаксон**, реакцію на **Аугментин** та значний набряк обличчя після знеболювального уколу в стоматолога; точну назву останнього препарату не знаємо.

Детальніше про перебіг та обстеження

Як розвивалися події за останній місяць

Кінець серпня. 26.08 після тунця виникли сильний біль у животі, блювання, утруднене дихання й набряк язика/горла. 28.08 після персика - свербіж, набряк язика, зміна голосу й утруднене дихання; застосувала ЕріПеп, приїхала швидка. Приблизно 26.08 також почався COVID із 7-8 днями температури. На початку вересня стало легше лише на короткий час.

Після COVID, у вересні, відбулося найбільше нинішніх кризів. Уже 5-6.09 знову наростали свербіж, плями, слабкість і труднощі з диханням. 07.09 після кисломолочного сиру були плями, набряк очей, запаморочення, кашель і утруднене дихання; у лікарні дали адреналін. 10.09 знову набрякли язик/горло, застосувала ЕріПеп і викликала швидку; **того дня до нападу не їла.** У наступні дні також поверталися плями, біль у животі, сонливість і відчуття набряку, зокрема язика/горла вночі та зранку 15.09. Це не окремі рідкі напади з повним одужанням між ними: після короткого полегшення знову стає гірше.

16.09, близько 03:00: сильний біль у животі, нудота, червоні цятки, відчуття набряку язика/горла та утруднене дихання. Після ЕріПеп за кілька хвилин дихати стало легше. Швидка приїхала приблизно через 25 хвилин, коли стан уже покращився; додатково дали ліки, зокрема дексаметазон.

17.09: сильний біль і набряк горла й носа. ЛОР та алерголог оглянули її й назвали це локальним алергічним набряком; сказали, що того разу це не анафілаксія. Дали **дексаметазон 16 мг і Дексалгін 2 мл внутрішньом'язово**; також прийняла німесулід 100 мг. Медрол на момент звернення ще не приймала. Після лікування стало значно краще; пізніше біль і місцевий набряк майже минули, але зранку 18.09 повернулися.

Обстеження, які маємо

ALEX 3: забір 14.09, аналіз 16.09. Позитивні результати, kUA/L: амброзія 6,76; Amb a 1 - 25,88; Amb a 4 - 34,21; полин 2,48; Art v 1 - 9,93; пилок жита 0,34; селера Api g 7 - 10,02. Манго Man i 1 та персик Pru p 3/Pru p 7 - <0,10. Повний звіт маємо.

Аналізи 14.09: альбумін 39,7 г/л; загальний білок 64,7 г/л; креатинін крові 72,3 мкмоль/л; співвідношення альбумін/креатинін сечі 0,4032 мг/ммоль. Калій 3,66, магній 0,828, фосфор 1,43 ммоль/л. Гемоглобін 112 г/л, MCV 79,5 фл; феритин 31,5 нг/мл, насичення трансферину залізом 9,05%. Це результати до останніх погіршень. C4 та концентрацію/активність інгібітора C1-естерази ще не перевіряли.

Короткий супутній контекст

Після нападів часто кілька днів болить живіт, іноді дуже сильно. Майже місяць їла приблизно **200 ккал/день**; останнього тижня поступово збільшуємо харчування, останніми днями до **600-800 ккал/день**.

У березні 2026 була кишкова непрохідність без операції. У 2024-2026 - кілька операцій через кісти яєчників; навесні з кровотечами, спайками з кишківником і частковим видаленням правого яєчника. Раніше їй говорили про автоімунну проблему щитоподібної залози. Нинішні труднощі з диханням вона відчуває інакше, ніж колишні напади астми.

Питання, які хочемо вирішити сьогодні

- 1. Напади й щоденні симптоми.** Чим пояснюються повторні погіршення та як змінити лікування, щоб їх контролювати? Як далі діяти з Медролом після 20.09?
- 2. Постійні набряки й вага.** Що спричиняє їх наростання, що перевірити та як це зупинити?
- 3. Горло й наступний напад.** Як контролювати набряк і біль; за яких проявів потрібен ЕріПеп? Які обстеження допоможуть уточнити причину нападів?