

До консультації алерголога

Лада, 33 роки · 18.09.2026 · Мої нотатки для прийому

Найважливіше про історію та нинішній стан

У Лади **астма та сезонна алергія**: з дитинства нежить, чхання, сльозотеча й свербіж очей. Останніми роками, особливо з 2021 року, симптоми значно посилюлися. Вона розповідає про щорічні загострення астми з госпіталізаціями на один або кілька тижнів, іноді з киснем.

З 2022 року почалися тяжкі реакції після їжі, спочатку після страви та напою з манго: набряк язика й горла, утруднене дихання, іноді свербіж, плями, нудота та біль у животі. Потім реакції виникали після звичних продуктів, а згодом і без їжі. Точний зв'язок із продуктами тепер незрозумілий.

Останніми місяцями все різко загострилося: приблизно 5-6 або більше тяжких нападів, які ми сприймали як анафілаксію або дуже схожі на неї; неодноразово викликали швидку, застосовували ЕріПен чи отримували адреналін від лікарів. Особливо часто це відбувається в серпні-вересні. Лікування допомагає на певний час, але погіршення повторюються. Останній напад із ЕріПен був уночі 16.09.

Окремо дуже турбують набряки та швидке збільшення ваги

Набряки обличчя, рук, ніг і живота не минають між нападами й наростають. Приблизно 10 днів тому вага була близько 61 кг; останні значення пам'ятаю приблизно як 64 → 65 → **66 кг 17.09**. Це близько 5-6 кг за 1-2 тижні, при зрості 170 см. За сьогодні надійного вимірювання немає. На мою думку, це переважно затримка рідини. Прошу окремо оцінити причину та що з цим робити.

Останні два дні: набряк горла й носа та іноді дуже сильний біль у горлі. 17.09 зверталися до лікарні; після дексаметазону й знеболення стало краще. Сьогодні зранку симптоми повторилися слабше, прийняла Медрол і Німесил через біль у горлі та животі. Зараз краще, але набряк і певний біль залишаються.

Поточне лікування

З 14.09: **Медрол 16 мг зранку + 8 мг увечері; Ніксар 10 мг двічі на день**; омепразол 20 мг на день. Серетид Евохалер 25/125 мкг і Ріалтріс двічі на день, Опатанол по 1 краплі в уражене око двічі на день. Медрол призначений до 20.09. До нього кілька тижнів періодично приймала дексаметазон у змінних дозах; 16-17.09 знову отримувала його під час невідкладної допомоги.

Також останнім часом приймала Жастінда, Флебодія 600 мг, омега-3 та цинк; іноді Декатилен. Супрастин припинила через виражену сонливість.

Важливі результати та реакції на ліки

ALEX 3 вже зробили: позитивні амброзія, полин, пилок жита та компонент селери Арі g 7; загальний IgE 108 kU/L. **Триптаза 29.08 - 11,6 мкг/л**, кров узяли приблизно через 5-6 годин після початку нападу. Базової триптази та C4/інгібітора C1-естерази ще немає. Числові результати й деталі - далі.

Лада згадує сильну алергічну реакцію на **цефтріаксон**, реакцію на **Аугментин** та значний набряк обличчя після знеболювального уколу в стоматолога; точну назву останнього препарату не знаємо.

Детальніше про перебіг та обстеження

Ключові епізоди останнього часу

06.08: після алкогольного напою набряк горла, свистяче й утруднене дихання; швидка, адреналін, повторне погіршення через кілька годин. **26.08:** після тунця біль у животі, блювання, утруднене дихання й набряк язика/горла. **28.08:** після персика свербіж, набряк язика, зміна голосу, утруднене дихання; ЕріPen і швидка. **07.09:** після кисломолочного сиру плями, набряк очей, запаморочення, кашель і утруднене дихання; адреналін у лікарні. **10.09:** набряк язика/горла, ЕріPen і швидка; до нападу того дня нічого не їла.

16.09, близько 03:00: сильний біль у животі й нудота, червоні цятки на руках, відчуття набряку язика/горла, важкість у грудях і труднощі з диханням. Після ЕріPen протягом кількох хвилин дихати стало легше. Приблизно через 25 хвилин приїхала швидка; на момент огляду стан уже покращився. Додатково дали ліки, зокрема дексаметазон.

17.09: сильний біль і набряк горла й носа. ЛОР та алерголог оглянули її й назвали це локальним алергічним набряком; сказали, що того разу це не анафілаксія. Дали **дексаметазон 16 мг і Дексалгін 2 мл внутрішньом'язово**; також прийняла німесулід 100 мг. Медрол на момент звернення ще не приймала. Після лікування стало значно краще; пізніше біль і місцевий набряк майже минули, але зранку 18.09 повернулися.

Обстеження, які маємо

ALEX 3: забір 14.09, аналіз 16.09. Позитивні результати, kUA/L: амброзія 6,76; Amb a 1 - 25,88; Amb a 4 - 34,21; полин 2,48; Art v 1 - 9,93; пилок жита 0,34; селера Api g 7 - 10,02. Манго Man i 1 та персик Pru p 3/Pru p 7 - <0,10. Повний звіт маємо.

Аналізи 14.09: альбумін 39,7 г/л; загальний білок 64,7 г/л; креатинін крові 72,3 мкмоль/л; співвідношення альбумін/креатинін сечі 0,4032 мг/ммоль. Калій 3,66, магній 0,828, фосфор 1,43 ммоль/л. Гемоглобін 112 г/л, MCV 79,5 фл; феритин 31,5 нг/мл, насичення трансферину залізом 9,05%. Це результати до останніх погіршень. C4 та концентрацію/активність інгібітора C1-естерази ще не перевіряли.

Короткий супутній контекст

COVID почався приблизно 26.08: 7-8 днів температури, потім коротке покращення. Після нападів часто кілька днів болить живіт, іноді дуже сильно. Майже місяць їла приблизно **200 ккал/день**; останнього тижня поступово збільшуємо харчування, останніми днями до **600-800 ккал/день**.

У березні 2026 була кишкова непрохідність без операції. У 2024-2026 - кілька операцій через кісти яєчників; навесні з кровотечами, спайками з кишківником і частковим видаленням правого яєчника. Раніше їй говорили про автоімунну проблему щитоподібної залози. Нинішні труднощі з диханням вона відчуває інакше, ніж колишні напади астми.

Питання, які хочемо вирішити сьогодні

- 1. Напади й щоденні симптоми.** Чим пояснюються повторні погіршення та як змінити лікування, щоб їх контролювати? Як далі діяти з Медролом після 20.09?
- 2. Постійні набряки й вага.** Що спричиняє їх наростання, що перевірити та як це зупинити?
- 3. Горло й наступний напад.** Як контролювати набряк і біль; за яких проявів потрібен ЕріPen? Які обстеження допоможуть уточнити причину нападів?