

До першого прийому нового алерголога

Лада, 33 роки · 18.09.2026 · Мої нотатки для консультації

Коротко: чому звертаємось

Я прошу другої думки щодо повторних нападів, схожих на анафілаксію, та набряків, які не минають між ними. Попри лікування, останніми днями знову довелося застосувати ЕріПен і звертатися по невідкладну допомогу. **Зараз особливо турбують набряк горла й носа, іноді дуже сильний біль у горлі, а також наростання набряків тіла і приблизно 5-6 кг додаткової ваги за 1-2 тижні.**

Набряки й збільшення ваги - окреме важливе питання

Набрякли обличчя, руки, ноги й живіт. Раніше набряки теж супроводжували напади, але зараз вони зберігаються й, на мою думку, наростають. Приблизно 10 днів тому вага була близько 61 кг; останні значення пам'ятаю приблизно як 64 → 65 → **66 кг 17.09**. Зріст 170 см. За сьогодні надійного вимірювання немає. Я майже впевнений, що це переважно затримка рідини, а не набір ваги від їжі.

Прошу окремо оцінити причину цих набряків і що з ними робити.

Що відбувалося останніми днями

16.09, близько 03:00. Сильний біль у животі й нудота, червоні цятки на руках, відчуття набряку язика та горла, важкість у грудях і труднощі з диханням. Застосувала ЕріПен; протягом кількох хвилин дихати стало легше. Приблизно через 25 хвилин приїхала швидка. На момент огляду стан уже покращився; додатково дали ліки, зокрема дексаметазон.

17.09. Сильний біль у горлі та набряк горла й носа; біль посилювався дорогою до лікарні. ЛОР і алерголог оглянули її та назвали це локальним алергічним набряком; сказали, що того разу це не анафілаксія. Дали дексаметазон 16 мг, Дексалгін 2 мл внутрішньом'язово та додаткове знеболення. Після лікування стало значно краще; пізніше того дня біль і місцевий набряк майже минули.

18.09. Зранку знову набрякли горло й ніс, боліли горло та живіт. Прийняла Медрол і Німесил. Зараз краще, ніж учора, але певний набряк і біль залишаються.

Як почалася проблема

З дитинства є сезонні нежить, чхання, сльозотеча й свербіж очей; з 2021 року прояви стали значно сильнішими. Лада також розповідає про щорічні загострення астми з госпіталізаціями на один або кілька тижнів, іноді з киснем. Нинішні труднощі з диханням вона відчуває інакше, ніж колишні напади астми.

З 2022 року повторюються напади з набряком язика/горла, утрудненим диханням, іноді свербіжем, плямами, нудотою та болем у животі. Спочатку ми пов'язували їх із манго. Потім напади виникали після звичних продуктів, а **10.09 - без їжі того дня**. У серпні-вересні 2026 вони почастішали. Після допомоги буває покращення, але симптоми повертаються. COVID почався приблизно 26.08; після 7-8 днів температури було лише коротке покращення.

Лікування, обстеження та питання

Ліки останнього тижня

З 14.09 перейшли на схему: **Медрол 16 мг зранку + 8 мг увечері; Ніксар 10 мг двічі на день;** омепразол 20 мг на день. Також Серетид Евохалер 25/125 мкг і Ріалтріс двічі на день, Опатанол по 1 краплі в уражене око двічі на день. Медрол призначений до 20.09. Домрид, Гленцет Едванс і Квамател у цю фактичну схему не включили.

До Медролу кілька тижнів періодично приймала дексаметазон, дози змінювалися; 11-12.09 - приблизно 2,5 та 1,5 мг на день. Супрастин припинила через сонливість. Під час невідкладної допомоги 16-17.09 знову вводили дексаметазон; 17.09 Медрол на момент звернення ще не приймала. 17.09 також прийняла німесулід 100 мг після ін'єкції Дексалгіну, 18.09 зранку - Німесил.

Останнім часом також приймала протизаплідні Жастінда, Флебодія 600 мг, омега-3 та цинк; іноді Декатилен. Раніше використовувала Максидекс і Окомістин. Тразодон приймала лише 4 дні після госпіталізації під час COVID, потім припинила; гідазепам - лише кілька разів.

Що вже обстежили

ALEX 3: кров здали 14.09, аналіз виконаний 16.09. Загальний IgE 108 kU/L. Позитивні результати (kUA/L): амброзія 6,76, Amb a 1 - 25,88, Amb a 4 - 34,21; полин 2,48, Art v 1 - 9,93; пилок жита 0,34; селера Api g 7 - 10,02. Манго Man i 1 та персик Pru p 3/Pru p 7 - <0,10. Повний звіт маємо.

Триптаза 29.08 - 11,6 мкг/л (референс <11); кров узяти приблизно через 5-6 годин після початку нападу. Базову триптазу ще не здали. C4 та концентрацію/активність інгібітора C1-естерази теж ще не перевіряли.

Аналізи 14.09: альбумін 39,7 г/л, загальний білок 64,7 г/л, креатинін крові 72,3 мкмоль/л; калій 3,66, магній 0,828, фосфор 1,43 ммоль/л. Співвідношення альбумін/креатинін сечі 0,4032 мг/ммоль. Гемоглобін 112 г/л, MCV 79,5 фл, феритин 31,5 нг/мл, насичення трансферину залізом 9,05%. Це результати до останніх погіршень.

Ще кілька важливих обставин

Лада згадує сильну алергічну реакцію на **цефтріаксон**, реакцію на **Аугментин** і значний набряк обличчя після знеболювального уколу в стоматолога; точну назву останнього препарату не знаємо.

Майже місяць їла дуже мало, за моєю оцінкою близько **200 ккал/день**. Останнього тижня поступово збільшуємо харчування, останніми днями приблизно до **600-800 ккал/день**. Після нападів часто кілька днів болить живіт, іноді дуже сильно.

У березні 2026 була кишкова непрохідність без операції. У 2024-2026 перенесла кілька операцій через кісти яєчників; навесні були сильні кровотечі, спайки з кишківником і часткове видалення правого яєчника. Раніше їй також говорили про автоімунну проблему щитоподібної залози.

Що найбільше хочемо вирішити сьогодні

1. Зрозуміти причину повторних нападів і підібрати лікування, яке контролюватиме їх та щоденні симптоми.
2. Окремо оцінити наростання набряків тіла й ваги та визначити, як це зупинити.
3. Зрозуміти, як діяти при повторному набряку й болю в горлі, коли потрібен ЕріПен, і які обстеження допоможуть уточнити причину.