

До повторного прийому алерголога

Лада · 23.09.2026 · Мої нотатки для прийому

Найбільше турбує зараз

Нинішнє погіршення астми почалося **в ту саму ніч після останнього прийому**. Дихати важко, ночами погано спить. Останніми днями складається враження, що вона або спить, або робить інгаляції через небулайзер. Іноді користується Вентоліном. Одного разу заснула під час інгаляції; я вимкнув прилад і розбудив її.

Я не розумію, чи достатньо того лікування, яке вона отримує, і чи правильно ми лікуємо астму між нападами. Хочу, щоб її оглянули, оцінили тяжкість нинішнього стану та дали зрозумілу схему на найближчі дні й надалі.

Окремо є виражена сонливість: повільніше думає та говорить, іноді трохи плутається і хитається під час ходьби, наче злегка п'яна. За останні два тижні подібне було щонайменше двічі, наступного дня могла бути цілком нормальною. Нещодавно знову викликала швидку через набряк і біль у горлі та утруднене дихання.

Інгалятори та інші ліки

Беродуал: повідомляла про 20-30 крапель за одну інгаляцію. **Пульмікорт:** один контейнер за інгаляцію; показувала препарат 0,5 мг/мл, 2 мл. Назвала по одному застосуванню кожного, але я не можу точно відтворити всі інгаляції за добу. **Вентолін** використовує іноді для швидкого полегшення.

Серетид Евохалер 25/125 мкг: 18.09 призначено по одному вдиху двічі на день. Користувалася ним 21.09; наскільки регулярно виконує цю схему, я не впевнений.

Медрол: початково призначили 16 мг зранку + 8 мг увечері на 14-20.09. Ще 22.09 вона казала, що приймає його за призначенням. Після нового виклику швидкої сказала, що їй порадили припинити через проблеми з животом. Потрібен чіткий подальший план. До цього протягом кількох тижнів періодично був дексаметазон, зокрема уколи під час невідкладної допомоги.

Гленцет Едванс приймає увечері щонайменше кілька днів; раніше приймала зранку і, за її словами, почувалася нормально. За останньою схемою також **Ніксар 20 мг зранку**. Гідазепам, тразодон та Димедрол зараз не приймає.

Алерголог: обстеження та питання

Лада · 23.09.2026

Що вже відомо

Астма та сезонна алергія тривають багато років, особливо важко з 2021 року. Лада розповідає про щорічні госпіталізації через астму на один або кілька тижнів, іноді з киснем. Останнього місяця також повторювалися напади з набряком язика/горла, плямами та болем у животі; неодноразово застосовували адреналін. Останній відомий мені ЕріПен був уночі 16.09.

FeNO 18.09: 18 ppb, на тлі лікування стероїдами. ALEX 3: позитивні амброзія, полин, пилок жита та компонент селери Api g 7; загальний IgE 108 kU/L.

Удома 22.09 сатурація була **94%**; прилад на мені показував 94-96%, тому не впевнений у точності. Вночі була температура 38,2 °C, згодом 36,6 °C; приймала парацетамол. У записі швидкої 23.09: **SpO₂ 97%, тиск 120/80, пульс 67, температура 36 °C**.

Майже місяць їла приблизно **100 ккал/день**, зараз близько **800-1000 ккал/день**. Живіт часто болить після їжі та стероїдів. Раніше сильно набрякали обличчя, руки, ноги й живіт. Вага знову зросла: **22.09 - 65 кг; 23.09 - 68 кг**.

19.09: ТТГ 5,833 мкМО/мл, вільний Т4 0,54 нг/дл; гемоглобін 112 г/л. Сьогодні також плануємо ендокринолога й гастроентеролога.

Що хочу з'ясувати сьогодні

1. Наскільки тяжке нинішнє погіршення? Прошу оцінити дихання та сонливість і сказати, чи безпечно лікуватися вдома, чи потрібні сьогодні додаткові обстеження або стаціонар. Чи потрібні вимірювання пікової швидкості видиху, спірометрія з пробєю, а при сонливості та поганому диханні - гази крові?

2. Якою має бути щоденна схема контролю астми? Чи достатній призначений Серетид для її стану; чи потрібна зміна препарату або дози? Прошу перевірити техніку інгаляції та потребу в спейсері.

3. Як саме користуватися засобами для полегшення? Потрібні конкретні дози, інтервали й межі застосування Вентоліну, Беродуалу та Пульмікورتу, їх поєднання з щоденним інгалятором і план дій, якщо полегшення коротке. Як відстежувати результат і коли повторний огляд?

4. Що робити з Медролом та рештою ліків? Прошу визначити тривалість і порядок завершення стероїдів з урахуванням попередніх курсів, болю в животі й набряків, а також перевірити, чи можуть ліки посилювати сонливість.