

До повторного прийому алерголога

Перший прийом був 15.08.2026

Що змінилося після першого прийому

За 13 днів сталося ще три тяжкі напади: 26.08, 28.08 і 07.09. У кожному випадку набрякали язик і горло, було важко дихати, вводили адреналін. Раніше такі епізоди траплялися значно рідше.

Призначене лікування спочатку добре допомагало: сезонні симптоми зменшилися, стало легше дихати й спати лежачи. **За останні 3 дні загальний стан знову погіршився:** сильний нежить, слюзотеча, слабкість, важко дихати. Інший лікар порадив дексаметазон, від нього стало краще. Останні 2 дні замість Рупафіну приймає дексаметазон 0,5-1 мг. Решта лікування залишилася за призначенням.

Приблизно місяць періодично свербить язик після їжі, бувають біль у животі та нудота. **За останні 3 дні майже кожен прийом їжі викликає хоча б невелике посилення симптомів, насамперед свербіж у роті.** Не кожне таке погіршення переходить у сильний напад.

Вона боїться їсти й приблизно місяць їсть дуже мало: кілька ложок кисломолочного сиру та слива пару разів на день. Останніми днями ще менше. Потрібно зрозуміти, чим її годувати найближчі тижні.

Три нові епізоди

Усі три продукти були звичними для неї. Вона їла їх і раніше без проблем, вони становили значну частину її й так обмеженого раціону. Персики їла часто, зокрема за кілька днів і за тиждень до нападу. Кисломолочний сир їла майже щодня. Тунець теж їла раніше без наслідків, хоча його точну частоту пригадати складніше. Це не були нові продукти, які вона вперше спробувала перед нападом.

26.08 - консервований тунець. Менш ніж за 20 хвилин почалися біль у животі та блювання. Потім сплутаність свідомості, здається, навіть втрачала свідомість. Усе сильно свербіло, набрякли язик і горло, стало важко дихати. Не пам'ятає, чи був висип. Швидка ввела адреналін, пропонувала госпіталізацію, але вона відмовилася. Після нападу тіло було набрякле.

28.08 - персик. У межах 40 хвилин почали свербіти язик і щоки. Потім набряк язик, свербіли обличчя, очі, голова й ноги, боліли легені. Приблизно через 1,5 години осип голос, далі почала задихатися й сильно хилило на сон. Були червоні плями на руках, шиї та грудях. Ввела ЕріПен і викликала швидку. Плями й набряк обличчя зменшилися. Швидка ввела ще адреналін та інші ліки.

07.09 - кисломолочний сир. Їла близько 15:00. О 15:25 з'явилися червоні плями на обличчі, шиї, руках і грудях; о 15:31 - дрібні прищики на руках, лобі, грудях і шиї. О 17:00 набрякли очі, великі мішки під очима. О 17:30 - сильне запаморочення, нудота, кашель, важко дихати, помітила набряк язика й горла. О 17:40 вже була в лікарні. Лікар ввів адреналін: плями, прищики й набряк під очима зменшилися, але менш ніж за годину почали повертатися. Після Супрастину й дексаметазону стало краще. Після виписки болів і пік живіт. Цього разу набряки обличчя, рук і живота були сильнішими та трималися довше, ніж раніше.

Також перенесла COVID. Почався приблизно 26.08, тест був позитивним. Близько 7-8 днів трималася висока температура, 38,5-39,5 °C. Близько 04.09 одужала й почала гуляти. 05-06.09 знову стало гірше: сильна слабкість, нежить, слюзотеча, важко дихати, після їжі свербіж у роті, біль у животі й нудота.

Попередня історія та мета прийому

Попередні напади

20.09.2022. Через 30-40 хвилин після суші з манго почали свербіти ноги, потім усе тіло. Почервоніння не було, висипу теж, здається, не було. Сильно набрякли язик і горло, було важко дихати. Швидка ввела адреналін. Набряки після нападу швидко зійшли.

Приблизно жовтень 2022. Піла в парку безалкогольний напій, потім з'ясувалося, що в ньому було манго. Через 15-20 хвилин набрякло обличчя, трохи язик, стало трохи важко дихати. Висипу й почервоніння не пригадує. Викликали швидку; набряки швидко зійшли.

Серпень 2023. Кілька днів були невеликі сезонні симптоми. У день нападу сильно свербіли й набрякли очі, набрякли язик і горло, свербів язик, було важко дихати. Висипу не було. Викликали швидку, далі мало що пам'ятає. Пов'язувала це з амброзією.

Літа 2024-2025. Були сезонні симптоми й схожі на серпень 2023 епізоди. Швидку не викликала, сама приймала Супрастин і дексаметазон.

06.08.2026 - Mondoro. У межах 40 хвилин сильно набрякли горло й шия, свербіли язик і горло, дихала зі свистом, було дуже важко дихати. Висипу, почервоніння й свербіж тіла не було. Швидка ввела адреналін. Через 4-6 годин знову стало важче дихати й довелося їхати до лікарні. Наступного дня все тіло було набрякле.

Сезонні симптоми

Сезонна алергія була все життя: навесні біля квітучих дерев сльозилися очі, текло з носа, чхала. У вересні 2021 після переїзду стало значно гірше. Пов'язує це з амброзією: біля кущів і при відкритих вікнах посилювалися нежить, сльози, чхання, іноді було важко дихати. 10.08.2026 після поїздки в інше місто сезонні симптоми різко посилилися.

Ліки та обстеження

Приймає призначене Вами лікування, але **останні 2 дні замінила Рупафін на дексаметазон 0,5-1 мг**. Невролог додав гідазепам 20 мг при тривозі та тразодон 50 мг увечері. Сьогодні прийняла парацетамол та ібупрофен, які швидка порадила від невралгії. Решта схеми без змін.

Із запланованих обстежень зробили лише триптазу під час нападу: **29.08 - 11,6 мкг/л**, референс <11. Кров узяли приблизно через 5-6 годин від початку симптомів. До лабораторії на інші заплановані аналізи не дійшли через новий напад.

Що хочемо отримати від цього прийому

1. Заново оцінити ситуацію. За менш ніж 3 тижні було три тяжкі напади після продуктів, які вона регулярно їла без проблем. Хочемо зрозуміти, наскільки це все ще вказує на їжу, чи могли ми помилково пов'язати напади з їжею на тлі погіршення сезонної алергії. Чому напади почастишали та чому останніми днями свербять у роті майже після кожного прийому їжі.

2. Отримати конкретний план харчування на найближчі тижні, поки пройдемо обстеження. Вона їсть дуже мало й боїться пробувати будь-що. Нам потрібно зрозуміти, що їй давати та як повернути достатнє харчування.

3. Розібратися з лікуванням. Раніше схема допомагала, а останніми днями перестала справлятися із симптомами. Вона повернулася до дексаметазону й відчула полегшення. Хочемо зрозуміти, що приймати далі та як діяти, якщо знову стає гірше.

4. Як організувати ранній забір крові на триптазу при наступному нападі. Минулого разу ми просили зробити цей аналіз, але спочатку медики займалися іншою допомогою. До триптази дійшли приблизно через 5-6 годин від початку нападу, хоча кров на інші аналізи брали раніше. Хвилюємося, що через пізній забір результат міг не відобразити те, що відбувалося під час нападу. Ви працюєте в цій лікарні та клініці: як заздалегідь домовитися, щоб наступного разу кров на триптазу взяли раніше, не затримуючи лікування? Чи можете дати письмове призначення або вказати, до кого звернутися і що сказати бригаді чи в приймальному відділенні? Чи можна взяти кров на триптазу разом із першими іншими аналізами?

5. Що робити із сильним болем у животі після нападу. Після кожного такого епізоду сильно болить живіт. Через це вона погано почувається й не може спати; біль може триматися кілька днів. Що можна дати, щоб безпечно й ефективно його полегшити: парацетамол, ібупрофен чи інший засіб? Просимо конкретну назву, дозу й тривалість з урахуванням дексаметазону та того, що вона дуже мало їсть. При якому болю потрібно знову звертатися до лікарні?