

Коротко для алерголога

Коротко

Близько 5 або більше тяжких алергічних реакцій з набряком горла/язика та утрудненим диханням. **Остання тяжка реакція була приблизно 5 днів тому**; швидка вводила адреналін. Манго — основний підозрюваний тригер, але не всі реакції були після очевидного манго. Також є давня сезонна алергія, особливо в серпні, ймовірно на амброзію, з періодичним свистом, нестачею повітря та стисканням у грудях.

Історія тяжких реакцій

Перший тяжкий епізод — 2022 рік

Після суші з манго приблизно через 30–40 хвилин з'явилися дуже сильний свербіж і висип, набряк обличчя, горла та язика. Язик сильно збільшився, стало важко дихати. Викликали швидку, робили уколи та крапельницю. Лікар швидкої припустив реакцію на манго. За спогадами, загалом було близько 5 або більше тяжких реакцій. Подробиці всіх епізодів уже важко відновити; не всі вони були після очевидного манго.

Остання тяжка реакція — приблизно 5 днів тому

Вночі, приблизно через 30 хвилин після ~100 мл Mondoro невідомого точного складу, з'явилися сильний свербіж, набряк горла, свистяче й утруднене дихання, нестача повітря та осиплість. Їжа була значно раніше вдень.

Швидка вводила адреналін, дексаметазон та інші препарати. Після лікування стало значно легше дихати.

Приблизно через 4–6 годин знову з'явилися утруднене дихання, невеликий свербіж і набряк шиї. Довелося їхати до лікарні, де знову робили уколи/крапельницю.

Після цього епізоду була виражена набряклість/набряки та збільшення ваги приблизно на 3 кг. Невідомо, чи це була затримка рідини і чи пов'язано це безпосередньо з реакцією.

Сезонна алергія та дихання

Є давні сезонні симптоми, особливо в серпні. Ймовірна алергія на амброзію, але наскільки вона підтверджена — неясно.

Бувають нестача повітря, свист і стискання/важкість у грудях; такі симптоми були й цього тижня. Неясно, чи це прояв сезонної алергії, астми/бронхоспазму або їх поєднання.

Періодично температура підвищується приблизно до 37,5 °C і може триматися кілька тижнів. Невідомо, чи це пов'язано із сезонною алергією.

Що зараз приймаю

Дози та регулярність потрібно уточнити:

- дексаметазон;
- Цетрин або L-Cet;
- Супрастин на ніч;
- Гленспрей Актив;
- Тизин на ніч;
- іноді на ніч інгаляції Пульмікорт + Беродуал;
- протизаплідні;
- омега-3.

Що хочеться з'ясувати

1. Що це за тяжкі реакції?

- Чи схожі описані епізоди на анафілаксію? Чи могло повернення симптомів через 4–6 годин бути другою хвилею тієї самої реакції?
- Чи має сенс перевірити базальну триптазу, а при можливій майбутній тяжкій реакції — гостру триптазу?

2. Що саме викликає реакції?

- Наскільки переконливо манго виглядає як основний тригер, якщо частина реакцій була після напоїв без очевидного манго?
- Чи мають сенс специфічний IgE до манго (f91) та/або шкірні проби?
- Якщо цього недостатньо, чи є сенс перевіряти інші конкретні інгредієнти суші або напоїв, які були перед реакціями, якщо їх склад вдасться встановити?

3. Як зменшити ризик нової тяжкої реакції?

- Що зараз справді потрібно уникати, а що можна не виключати без причини?
- Чи потрібно уникати кеш'ю, фісташок, арахісу або інших горіхів, якщо вони раніше нормально переносилися? Чи варто враховувати алкоголь як можливий фактор, що може посилювати реакцію?
- **Чи потрібен автоін'єктор адреналіну і що мені потрібно знати про його використання?**

4. Що робити із сезонною алергією та диханням?

- Чи схожі серпневі свист, нестача повітря та стискання в грудях на астму або бронхоспазм?
- Чи потрібна спірометрія/спірографія з бронхолітичною пробою? Чи варто змінювати нинішню схему ліків?
- Чи варто підтвердити алергію на амброзію? Якщо обговорювати ACIT — чи має сенс IgE до Amb a 1?

5. Чи пов'язані сезонні симптоми з тяжкими реакціями?

- Чи це, швидше за все, дві окремі проблеми, чи сезонна алергія/можлива астма можуть впливати на тяжкість гострих реакцій?

6. Що, можливо, не пов'язане з алергією?

- Чи варто окремо розбиратися з тривалою набряклістю/прибавкою близько 3 кг після останнього епізоду та періодичною температурою близько 37,5 °C?