До прийому психіатра

Лада, 34 роки · 01.10.2026 · Мої нотатки для прийому

Коротко про ситуацію

За словами Лади, **останні два роки вона майже постійно хворіє**. Протягом останніх кількох місяців стало ще важче, особливо за останній місяць: загострення астми, тяжкі алергічні реакції, біль і труднощі з харчуванням. На цьому тлі турбують **тривога, поганий сон, втома та біль, який не дає спати**. Хочу допомогти їй полегшити тривогу й налагодити сон з урахуванням її фізичного стану та ліків.

Що турбує зараз

Тривога. Хвилюється через здоров’я, роботу й зобов’язання перед клієнтами. Має невеликий власний бізнес, зараз не працює.

Сон і погані сни. Давно погано спить; зараз важко заснути, рано прокидається. Кілька разів прокидалася через погані сни й потім не могла заснути. Іноді прокидається від болю: коли я ночував поруч, вона будила мене через біль. Давав парацетамол, але він допомагає мало.

Втома й сонливість. Бували й протилежні періоди, коли дуже багато спала та була виснаженою. Подібне траплялося ще до останнього місяця. Останні два дні після їжі швидко втомлювалася й засинала на 1-2 години. Раніше під час сильної сонливості помічав сповільнення мови й думок та нестійкість при ходьбі.

Попередні спроби лікування

Раніше призначали антидепресант **тразодон (Триттіко), 50 мг перед сном**. Приймала лише **чотири дні**, потім припинила; зараз його не приймає.

Гідазепам: приблизно місяць тому приймала кілька разів; здавалося, що на пару днів допоміг, але потім перестала. Нещодавно знову спробувала протягом кількох днів. Тепер каже, що не допомагає, а **посилює тривогу й втому**. Регулярного лікування тривоги чи сну не було.

Інші проблеми зі здоров’ям

Багаторічна астма та сезонна алергія, щорічні госпіталізації через астму. За останній місяць повторювалися тяжкі реакції з набряком губ, язика або горла, викликами швидкої та застосуванням адреналіну. Наприкінці серпня також перенесла COVID.

З дитинства болить живіт після їжі; через це їсть мало, переважно раз на день. Під час і після нападів астми описує поширений **м’язовий біль**, зокрема в ногах; періодично болить спина. У березні була госпіталізація через кишкову непрохідність без операції; у 2024-2026 роках перенесла кілька гінекологічних операцій.

Нещодавно встановили гіпотиреоз; є нестача заліза. Зріст 170 см, вага 30.09 - 61 кг. Останніми тижнями були набряки та значні коливання ваги.

Ліки на час консультації

Лада · 01.10.2026

Зараз увечері

Дуспаталін Ретард 200 мг - 1 капсула; Проксіум 40 мг - 1 таблетка; Флебодіа 600 мг - 1 таблетка; Жастінда (дієногест 2 мг + етинілестрадіол 0,03 мг); **Аваміс 27,5 мкг/розпилення** в ніс.

Симбікорт Турбухалер 160/4,5 мкг призначений по одному вдиху двічі на день і додатково за потреби; я не впевнений, наскільки регулярно вона ним користується.

Ранкові призначення

Ніксар (біластин) 20 мг зранку, за потреби до 40 мг на добу. Еутирокс 37,5 мкг (половина таблетки 75 мкг) перед сніданком. **Проксіум 40 мг** і **Дуспаталін Ретард 200 мг** призначені двічі на день, тобто також зранку. Повний фактичний ранковий прийом я поки не можу підтвердити.

Нещодавні ліки

Медрол припинила 28.09 після поступового зниження дози. До цього протягом кількох тижнів були Медрол і неодноразово дексаметазон, зокрема під час невідкладної допомоги.

Раніше у вересні приймала **Гленцет Едванс** (монтелукаст + левоцетиризин); 28.09 його не приймала. Парацетамол останнім часом давали через біль, з невеликим полегшенням. Нещодавню повторну спробу гідазепаму та короткий прийом тразодону описав на першій сторінці.