Universidad Diego Portales
Facultad de Ciencias Sociales e Historia
Antropología

Métodos Cuantitativos

Clase 07: Unidad III. Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado

Profesora: Daniela Olivares Collío
Ayudante: Katherine Aravena Herrera
2do semestre 2026

Profesora: Daniela Olivares Collío
daniela.olivares2@mail.udp.cl

Objetivos

Clase 07

Unidad III. Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado

III.4. Medidas de Tendencia Central

III.5. Medidas de Dispersión

¿En cuál parte del curso vamos?



Unidad I | Unidad II | **Unidad III**

Introducción a la Investigación Social Cuantitativa:

I.1. Fundamentos de la Investigación Cuantitativa

I.2. Características de la Investigación Cuantitativa

I.3. Construcción de un problema de Investigación Cuantitativa

I.4. Conceptualización de variables e indicadores y operacionalización

La estadística en el contexto de la investigación social:

II.1. Elaboración de una matriz de datos y su libro de códigos

II.2. Nociones de Universo, Población y Muestra

II.3. Técnicas de recolección y procesamiento de datos

Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado:

III.1. Noción de distribución

III.2. Tipos de análisis estadístico univariado

III.3. Frecuencias


III.4. Medidas de Tendencia Central


III.5. Medidas de Dispersión

¿En cuál parte de una investigación estamos?



¿En cuál parte de una investigación estamos?





ESTADÍSTICA
Conjunto de procedimientos matemáticos realizados para resumir y analizar información obtenida sistemáticamente
MUESTRA → MUESTRA
Estadística Descriptiva
Contabiliza tanto la frecuencia de ocurrencia de cada puntuación en una muestra, como la distribución y dispersión d ellas puntuaciones.
Univariada
Frecuencias
Histogramas
Descriptivos
Gráficos
Bivariada
Tablas contingencia
Correlación
MUESTRA → POBLACIÓN
Estadística Inferencial
Estima los parámetros poblacionales a partir de los estadísticos muestrales. Infiere a partir de una muestra lo que ocurre probablemente en la población objetivo
Univariada
Estimaciones de parámetros
Intervalos de confianza
Multivariada
Test de hipótesis
Regresión

III.4. Medidas de Tendencia Central

Medidas de Tendencia Central

Son las medidas descriptivas que con un valor buscan resumir los datos mostrando el “centro” de la distribución.

La usaremos principalmente para **variables numéricas** (de intervalo y razón), y en algunos casos para **variables ordinales, ojo** no siempre.



Media

- Es la suma de todas las puntuaciones de la variable *X*, dividida por el número de puntuaciones observadas.
- Se conoce como Media Aritmética o Promedio y se representa con una $\bar{x}$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Media

- **No** se deben considerar los **valores perdidos o no válidos**.
- La media es muy **sensible a los valores extremos** y a los valores fuera de rango, sobre todo en muestra pequeñas.
    - Puede servir revisar mis observaciones por medio de un histograma.
- Los promedios pueden "esconder" información:
    - "Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona" – Nicanor Parra.
- El promedio es más representativo si las observaciones presentan una distribución normal.
- Se usa para **variables numéricas** (intervalo y razón) y en algunas variables ordinales cuando cumplen con: tener al menos 5 categorías y ser normales.

Media

Ejemplo:

Durante 2020, el ingreso laboral promedio de la población ocupada en el país fue de **$635.134** neto mensual (que corresponde al ingreso bruto menos los descuentos por previsión y salud) mientras que, el ingreso mediano -el que recibe una persona representativa de la mitad de la población[1]- llegó a $420.000 al mes, es decir, el 50% de quienes trabajan en el país percibieron ingresos menores o iguales a ese último monto.

Media

id	nombre	nota
1	Jeannette	7.0
2	Eduardo	6.5
3	Harold	6.1
4	Evelyn	3.8
5	José Antonio	2.0
6	Marco	5.1
7	Johannes	2.1
8	Franco	4.7
9	Gabriel	5.5
10	Sebastián	4.9
11	Michelle	6.6
12	Ricardo	5.1

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{7.0 + 6.5 + 6.1 + 3.8 + 2.0 + 5.1 + 2.1 + 4.7 + 5.5 + 4.9 + 6.6 + 5.1}{12}$$

$$\bar{x} = 4.95$$

Media

id	nombre	edad
1	Jeannette	20
2	Eduardo	23
3	Harold	27
4	Evelyn	23
5	José Antonio	22
6	Marco	26
7	Johannes	39
8	Franco	21
9	Gabriel	24
10	Sebastián	22
11	Michelle	23
12	Ricardo	38

Ejercicio:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

$$\bar{x} =$$

$$\bar{x} =$$

Mediana

- Divide por la mitad el número total de puntuaciones de un variable X en una muestra.
- **Sobre la mediana se encuentra la mitad de los casos y bajo la mediana se encuentra la otra mitad.**
- Corresponde al percentil 50 de los casos, el cálculo de la mediana solo exige ordinalidad en las puntuaciones.
- Se puede aplicar tanto a variables ordinales como de intervalo o de razón.

Mediana

- Ordenar las puntuaciones de menor a mayor.
- Dividir el tamaño de la muestra (n) en dos:
  - Si **n es impar**, el valor de la mediana será un puntuación real de X en la muestra.
  - Si **n es par**, el valor de la mediana será la media entre las dos puntuaciones ubicadas en la mitad.

$$\bar{x} = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{si } n \text{ es impar} \\ \dfrac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

Mediana

- Al contrario de la media, la mediana es insensible a los valores extremos de las puntuaciones en una distribución.
- Es sensible a cualquier cambio en el tamaño de la muestra:
    - Aumentar n en 1 desplaza la mediana en 1 lugar de ubicación, lo que puede significar otro valor.
- En el caso **variables ordinales** en la tabla de frecuencias, observamos el porcentaje acumulado, y aquel valor que incluye el 50% decimos que es el valor de la mediana.
- La mediana es la MTC más útil cuando la variable tiene un distribución sesgada.

Mediana

Ejemplo:



NOTICIAS | DESTACADO

MERCADOS

La cruda realidad de los salarios en Chile: el 50% de los trabajadores gana menos de $401.000 y las mujeres perciben un 28,1% menos que los hombres

por El Mostrador Mercados | 9 noviembre, 2020

En efecto, en noviembre de 2019, la línea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar promedio de 4 personas, es de $445.042, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social. "Si consideramos solo a los asalariados del sector privado que trabajan jornada completa, la mediana es $449.652, esto quiere decir que prácticamente el 50% ni siquiera podría sacar a un grupo familiar promedio de la pobreza y se hace obligatorio que al menos dos personas trabajen en el hogar", señala el reporte.

Mediana

id	nombre	nota
1	Jeannette	7.0
2	Eduardo	6.5
3	Harold	6.1
4	Evelyn	3.8
5	José Antonio	2.0
6	Marco	5.1
7	Johannes	2.1
8	Franco	4.7
9	Gabriel	5.5
10	Sebastián	4.9
11	Michelle	6.6
12	Ricardo	5.1

Primero: Ordenar puntuaciones

2.0, 2.1, 3.8, 4.7, 4.9, 5.1, 5.1, 5.5, 6.1, 6.5, 6.6, 7.0

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

Segundo: ya que el n es par usamos la segunda fórmula

2.0, 2.1, 3.8, 4.7, 4.9, 5.1, 5.1, 5.5, 6.1, 6.5, 6.6, 7.0

$$\tilde{x} = 5.1 + 5.1 / 2 = 5.1$$

Mediana

id	nombre	edad
1	Jeannette	20
2	Eduardo	23
3	Harold	27
4	Evelyn	23
5	José Antonio	22
6	Marco	26
7	Johannes	39
8	Franco	21
9	Gabriel	24
10	Sebastián	22
11	Michelle	23
12	Ricardo	38

Ejercicio:

Primero: Ordenar puntuaciones


$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)}, & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}, & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

Segundo: elegir fórmula


$$\tilde{x} =$$

Moda


- Es la puntuación que ocurre con mayor frecuencia en la distribución de una variable X.
- No existe cálculo matemático, por lo que es aplicable a la variable de todos los niveles de medición: nominales, ordinales, intervalo o razón.
- Es insensible tanto al cambio en los valores de las puntuaciones como al tamaño de la muestra.



Unimodal



Bimodal



Multimodal

Moda

id	nombre	nota
1	Jeannette	7.0
2	Eduardo	6.5
3	Harold	6.1
4	Evelyn	3.8
5	José Antonio	2.0
6	Marco	5.1
7	Johannes	2.1
8	Franco	4.7
9	Gabriel	5.5
10	Sebastián	4.9
11	Michelle	6.6
12	Ricardo	5.1

$$M_o = 5.1$$

Moda

id	nombre	edad
1	Jeannette	20
2	Eduardo	23
3	Harold	27
4	Evelyn	23
5	José Antonio	22
6	Marco	26
7	Johannes	39
8	Franco	21
9	Gabriel	24
10	Sebastián	22
11	Michelle	23
12	Ricardo	38

Ejercicio:

$$M_o =$$

Límites de las MTC

- Informar las MTC por sí solas resulta insuficiente para tener una idea clara de la forma en que se distribuyen las puntuaciones de una variable X en la muestra.
- El problema es que, teniendo las mismas o MTC similares, dos distribuciones pueden ser muy diferentes.
- Las MTC permiten observar si mi variable tiene una distribución normal o con sesgo en su distribución.
- En una distribución normal, las 3 deberían coincidir.

MTC y niveles de medición

	Moda	Mediana	Media
Nominal	✓		
Ordinal	✓	✓	≠
Intervalar	✓	✓	✓
de Razón	✓	✓	✓

III.5. Medidas de Dispersión

Medidas de Dispersión

- Las medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable.
- ¿Qué significa que una variable varíe mucho o poco?

Rango

- Es la **distancia existente entre las puntuaciones observadas mínima y máxima** de una variable *X*.
- Se calcula como la diferencia entre el mínimo y el máximo más el valor de la "unidad de redondeo" de *X* (considera los límites reales de las puntuaciones).
- Presenta la limitación de ser muy sensible a valores extremos.

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

Rango

id	nombre	nota
1	Jeannette	7.0
2	Eduardo	6.5
3	Harold	6.1
4	Evelyn	3.8
5	José Antonio	2.0
6	Marco	5.1
7	Johannes	2.1
8	Franco	4.7
9	Gabriel	5.5
10	Sebastián	4.9
11	Michelle	6.6
12	Ricardo	5.1

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

R = 7.0 - 2.0

R = 5.0

El mínimo es la nota 2 y el máximo es la nota 7.
El rango de la variable notas es 5 puntos.

Rango

id	nombre	edad
1	Jeannette	20
2	Eduardo	23
3	Harold	27
4	Evelyn	23
5	José Antonio	22
6	Marco	26
7	Johannes	39
8	Franco	21
9	Gabriel	24
10	Sebastián	22
11	Michelle	23
12	Ricardo	38

Ejercicio:

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

$R =$

$R =$

Varianza

- **Es la variación media de las puntuaciones en la muestra**.
- Presenta problemas cuando queremos interpretarla, ya que las puntuaciones ha sido elevadas al cuadrado. Por eso, NO puede interpretarse en la unidad de medida original.
- Es necesario volver a una medida que sea directamente interpretable: pasar de varianza a desviación estándar. El cálculo de la DE requiere del cálculo de la varianza.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Varianza

id	nombre	nota
1	Jeannette	7.0
2	Eduardo	6.5
3	Harold	6.1
4	Evelyn	3.8
5	José Antonio	2.0
6	Marco	5.1
7	Johannes	2.1
8	Franco	4.7
9	Gabriel	5.5
10	Sebastián	4.9
11	Michelle	6.6
12	Ricardo	5.1

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

$$s^2 = \frac{\begin{array}{l}(7.0 - 4{,}95)^2 + (6.5 - 4{,}95)^2 + (6.1 - 4{,}95)^2 + \\ (3.8 - 4{,}95)^2 + (2.0 - 4{,}95)^2 + (5.1 - 4{,}95)^2 + \\ (2.1 - 4{,}95)^2 + (4.7 - 4{,}95)^2 + (5.5 - 4{,}95)^2 + \\ (4.9 - 4{,}95)^2 + (6.6 - 4{,}95)^2 + (5.1 - 4{,}95)^2\end{array}}{12 - 1}$$

$$s^2 = 2.65$$

Varianza

id	nombre	edad
1	Jeannette	20
2	Eduardo	23
3	Harold	27
4	Evelyn	23
5	José Antonio	22
6	Marco	26
7	Johannes	39
8	Franco	21
9	Gabriel	24
10	Sebastián	22
11	Michelle	23
12	Ricardo	38

Ejercicio:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s^2 = \frac{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}{}$$

$$s^2 =$$

Desviación estándar

- La DE describe cómo las puntuaciones de una variable X se distancian del promedio.
- Es la raíz cuadrada de la varianza, por lo que sí es interpretable en la unidad de medida original de la variable.
- Por ser una medida derivada de la media, también es demasiado sensible a los valores extremos: es muy útil con las distribuciones normales, pero lo es menos con las distribuciones sesgadas.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{s^2}$$

Desviación estándar

Se llama “estándar” porque **permite comparar las distribuciones** entre variables con distintas unidades de medida: se puede comparar a cuántas desviaciones estándar está una puntuación dada de la media (p.e.: en promedio, cada puntuación se desvía 4,67 años de la media).

- Cuanto más pequeña sea la desviación estándar mayor será la concentración de datos alrededor de la media.

Si el promedio de nota de de un curso es de 4.0, y la desviación estándar es 0.1, significa que las y los estudiantes tienen notas similares y bordean la media 4.0.

Si el promedio de nota de de un curso es de 4.0, y la desviación estándar es 2.0, significa que las y los estudiantes tienen notas mas dispersas, van desde dos puntos hacia abajo de la media y dos puntos hacia arriba de la media. O sea desde 2.0 hasta 6.0

Desviación estándar

id	nombre	nota
1	Jeannette	7.0
2	Eduardo	6.5
3	Harold	6.1
4	Evelyn	3.8
5	José Antonio	2.0
6	Marco	5.1
7	Johannes	2.1
8	Franco	4.7
9	Gabriel	5.5
10	Sebastián	4.9
11	Michelle	6.6
12	Ricardo	5.1

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{s^2}$$

$$s = \sqrt{2.65} \approx 1.63$$

Desviación estándar

id	nombre	edad
1	Jeannette	20
2	Eduardo	23
3	Harold	27
4	Evelyn	23
5	José Antonio	22
6	Marco	26
7	Johannes	39
8	Franco	21
9	Gabriel	24
10	Sebastián	22
11	Michelle	23
12	Ricardo	38

Ejercicio:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{s^2}$$

$$s =$$

III.5. Medidas de Dispersión

Medidas de Dispersión

- Las medidas de dispersión tratan, a través del cálculo de diferentes fórmulas, de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable.
- ¿Qué significa que una variable varíe mucho o poco?

Rango

- Es la **distancia existente entre las puntuaciones observadas mínima y máxima** de una variable *X*.
- Se calcula como la diferencia entre el mínimo y el máximo más el valor de la "unidad de redondeo" de *X* (considera los límites reales de las puntuaciones).
- Presenta la limitación de ser muy sensible a valores extremos.

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

Rango

id	nombre	nota
1	Jeannette	7.0
2	Eduardo	6.5
3	Harold	6.1
4	Evelyn	3.8
5	José Antonio	2.0
6	Marco	5.1
7	Johannes	2.1
8	Franco	4.7
9	Gabriel	5.5
10	Sebastián	4.9
11	Michelle	6.6
12	Ricardo	5.1

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

R = 7.0 - 2.0

R = 5.0

El mínimo es la nota 2 y el máximo es la nota 7.
El rango de la variable notas es 5 puntos.

Rango

id	nombre	edad
1	Jeannette	20
2	Eduardo	23
3	Harold	27
4	Evelyn	23
5	José Antonio	22
6	Marco	26
7	Johannes	39
8	Franco	21
9	Gabriel	24
10	Sebastián	22
11	Michelle	23
12	Ricardo	38

Ejercicio:

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

$R =$

$R =$

Varianza

- **Es la variación media de las puntuaciones en la muestra**.
- Presenta problemas cuando queremos interpretarla, ya que las puntuaciones ha sido elevadas al cuadrado. Por eso, NO puede interpretarse en la unidad de medida original.
- Es necesario volver a una medida que sea directamente interpretable: pasar de varianza a desviación estándar. El cálculo de la DE requiere del cálculo de la varianza.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Varianza

id	nombre	nota
1	Jeannette	7.0
2	Eduardo	6.5
3	Harold	6.1
4	Evelyn	3.8
5	José Antonio	2.0
6	Marco	5.1
7	Johannes	2.1
8	Franco	4.7
9	Gabriel	5.5
10	Sebastián	4.9
11	Michelle	6.6
12	Ricardo	5.1

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s^2 = \frac{\begin{array}{l}(7.0 - 4{,}95)^2 + (6.5 - 4{,}95)^2 + (6.1 - 4{,}95)^2 + \\ (3.8 - 4{,}95)^2 + (2.0 - 4{,}95)^2 + (5.1 - 4{,}95)^2 + \\ (2.1 - 4{,}95)^2 + (4.7 - 4{,}95)^2 + (5.5 - 4{,}95)^2 + \\ (4.9 - 4{,}95)^2 + (6.6 - 4{,}95)^2 + (5.1 - 4{,}95)^2\end{array}}{12 - 1}$$

$$s^2 = 2.65$$

Varianza

id	nombre	edad
1	Jeannette	20
2	Eduardo	23
3	Harold	27
4	Evelyn	23
5	José Antonio	22
6	Marco	26
7	Johannes	39
8	Franco	21
9	Gabriel	24
10	Sebastián	22
11	Michelle	23
12	Ricardo	38

Ejercicio:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s^2 = _____$$

$$s^2 =$$

Desviación estándar

- La DE describe cómo las puntuaciones de una variable X se distancian del promedio.
- Es la raíz cuadrada de la varianza, por lo que sí es interpretable en la unidad de medida original de la variable.
- Por ser una medida derivada de la media, también es demasiado sensible a los valores extremos: es muy útil con las distribuciones normales, pero lo es menos con las distribuciones sesgadas.

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{s^2}$$

Desviación estándar

Se llama “estándar” porque **permite comparar las distribuciones** entre variables con distintas unidades de medida: se puede comparar a cuántas desviaciones estándar está una puntuación dada de la media (p.e.: en promedio, cada puntuación se desvía 4,67 años de la media).

- Cuanto más pequeña sea la desviación estándar mayor será la concentración de datos alrededor de la media.

Si el promedio de nota de de un curso es de 4.0, y la desviación estándar es 0.1, significa que las y los estudiantes tienen notas similares y bordean la media 4.0.

Si el promedio de nota de de un curso es de 4.0, y la desviación estándar es 2.0, significa que las y los estudiantes tienen notas mas dispersas, van desde dos puntos hacia abajo de la media y dos puntos hacia arriba de la media. O sea desde 2.0 hasta 6.0

Desviación estándar

id	nombre	nota
1	Jeannette	7.0
2	Eduardo	6.5
3	Harold	6.1
4	Evelyn	3.8
5	José Antonio	2.0
6	Marco	5.1
7	Johannes	2.1
8	Franco	4.7
9	Gabriel	5.5
10	Sebastián	4.9
11	Michelle	6.6
12	Ricardo	5.1

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{s^2}$$

$$s = \sqrt{2.65} \approx 1.63$$

Desviación estándar

id	nombre	edad
1	Jeannette	20
2	Eduardo	23
3	Harold	27
4	Evelyn	23
5	José Antonio	22
6	Marco	26
7	Johannes	39
8	Franco	21
9	Gabriel	24
10	Sebastián	22
11	Michelle	23
12	Ricardo	38

Ejercicio:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{s^2}$$

$$s =$$

Usos de las MD

- Las MD se interpretan comparando diferentes muestras.
- Si se dispone de dos conjuntos de datos, será más homogéneo el que tenga menor desviación estándar, varianza o rango.
- Por ejemplo, si les dijera que dividí el curso en cuatro grupos, cuyas notas tuvieron las siguientes propiedades...
    - Grupo A: Media de notas: 4.8, desviación estándar: 0,3.
    - Grupo B: Media de notas: 5,5, desviación estándar 2,5.
    - Grupo C: Media de notas: 4,7, desviación estándar 4,2.
    - Grupo D: Media de notas: 4,2, desviación estándar 0,5.
    - ¿En cuál grupo le gustaría estar, en cuál no y por qué?

MD y niveles de medición

	Rango	Varianza	Desviación estándar
Nominal			
Ordinal	✓		
Intervalar	✓	✓	✓
de Razón	✓	✓	✓

Ejercicios

ID	Nombre	Edad	Peso (kg)	Salario	(X-Prom) EDAD	(X-Prom) ^2 EDAD	(X-Prom) PESO	(X-Prom) ^2 PESO	(X-Prom) SALARIO	(X-Prom) ^2 SALARIO
1	Felipe	30	70	500,000						
2	Tamara	33	65	450,000						
3	Juan Carlos	40	76.3	600,000						
4	Sofia	45	93.5	1,200,000						
5	Esteban	59	80	800,000						

Promedio EDAD		RANGO EDAD		VARIANZA EDAD	DE EDAD	
Promedio PESO		RANGO PESO		VARIANZA PESO	DE PESO	
Promedio SALARIO		RANGO SALARIO		VARIANZA SALARIO	DE SALARIO	

Universidad Diego Portales
Facultad de Ciencias Sociales e Historia
Antropología

Métodos Cuantitativos

Clase 07: Unidad III. Estadística Descriptiva y Análisis descriptivo univariado

Profesora: Daniela Olivares Collío