





Martes 06 julio de 2021

Docente: Canelón Juan Carlos

4 Año

Área de formación: Química

Correo electrónico: <u>jccanelon-01@hotmail.com</u>

Telef. 0424-9640399



Ciencia, tecnología e innovación



Soluciones



Soluciones Unidades físicas Unidades químicas Diluciones y concentraciones

> "Todo está hecho de átomos... pero, ¿De qué se componen los átomos? Los hombres de ciencia han mostrado siempre una sorprendente curiosidad por tratar de buscarle explicación a todo aquello cuanto signifique un enigma para ellos."









SOLUCIONES

Una solución es un sistema monofásico, ópticamente homogéneo, formado por dos o más componentes llamadas soluto y solvente, los cuales se encuentran en proporciones variables dentro de ciertos límites y pueden separarse mediante procedimientos físicos tales como la evaporación y la destilación.

Una solución está compuesta por:

Solución = soluto + solvente

Soluto: es la sustancia que se disuelve

Solvente: es la sustancia que disuelve al soluto.

Formas de Expresar las Concentraciones de las Soluciones

La concentración de las soluciones suele conocerse de dos maneras:

Unidades físicas de las soluciones

Para establecer las cantidades de soluto y solvente presentes en una solución, muchos profesionales (químicos, ingenieros, farmacéuticos, biólogos, médicos, bioanalistas... entre otros) tienen que medir, necesariamente, una de las siguientes magnitudes físicas:

Masa (m)
Volumen (v)
Cantidad de sustancia (n)

Es importante conocer como se expresa la composición de las soluciones en términos de concentración y reconocer la importancia que tiene el establecer patrones de medida para la concentración de la sustanciasen el ambiente, en productos de uso cotidiano y tecnológicos.







Por razones prácticas se ha optado por expresar las siguientes magnitudes físicas:

$$C = \underline{msto}$$
 $C = \underline{vsto}$ $C = \underline{msto}$ vsol $C = \underline{msto}$

en tanto por ciento, dando las siguientes relaciones porcentuales:

% masa / masa =
$$\underline{msto}$$
 x 100 % volumen / volumen = \underline{vsto} x 100 % masa / volumen = \underline{msto} x 100 wsol

C = concentración de la solución

msto = masa del soluto expresada en mg, g, kg...

msol = masa de la solución expresada en mg, g, kg...

vsto = volumen del soluto expresada en ml, L, cm³ o cc...

vsol = volumen de la solución expresada en ml, L, cm³ o cc...

I) Tanto por ciento masa / masa (%m/m)

Esta magnitud física expresa la concentración en gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución. *Por ejemplo:*

Si una solución esta al 30% m/m, esto quiere decir que: el porcentaje indica que por cada 100g de solución están contenidos 30g de soluto y 70g solvente.

Ejercicio:

Determinar la concentración de una solución de 80g de sal común (NaCl) en 320g de agua.

Análisis: para determinar la concentración es necesario conocer la cantidad de solución resultante, se suma el soluto y el solvente.

b) Aplicando la fórmula:
$$\%$$
 masa / masa = $\underline{\text{msto}}$ x $100 = \underline{80}$ g x $100 = \mathbf{20}\%$ m/m msol 400 g

Aplicando regla de tres también podemos resolver el ejercicio:







Si en 400g de solución	 80g de soluto			
En 100g de solución	 X	\rightarrow	X = 20 %	ն m/m

¿Qué cantidad de calamina se necesitará para preparar 2kg de loción al 5%m/m?

II) Tanto por ciento volumen/volumen (% v/v)

Esta magnitud física expresa la concentración en cm³ o ml de soluto contenidos en 100cm³ o ml de solución.

Ejercicio:

Determinar la concentración de una solución que ha sido preparada disolviendo 20cm³ de alcohol en 30cm³ de agua.

Solución:

- a) Volumen de la solución: $Vsol = Vsto + Vste = 20cm^3 + 30cm^3 \rightarrow Vsol = 50cm^3$
- b) Aplicando la fórmula: $\% \text{ v/v} = \underline{\text{vsto}} \text{ x } 100 \rightarrow \% \text{v/v} = \underline{20 \text{cm}^3} \text{ x } 100 = 40\% \text{ v/v}$ Vsol 50 cm³

Aplicando regla de tres también podemos resolver el ejercicio:

Si en 50cm³ de solución ----- 20cm³ de soluto
En 100 cm³ de solución -----
$$X \rightarrow X = 40 \% \text{ v/v}$$

¿Qué volumen de agua se necesitará para preparar 12,5 de solución de ácido clorhídrico al 17% v/v?

III) Tanto por ciento masa / volumen (%m/v)

Esta magnitud física expresa la concentración en gramos de soluto contenidos en 100 ml de solución o cm³.







Ejercicio:

El menthiolate, solución germicida y antiséptico de uso común contiene 100 mg de timerosal en cada 100 cm³ de solución. Determine la concentración de la solución en % m/v.

Solución:

Aplicando la fórmula: % m/v =
$$\underline{\text{msto}}$$
 x 100 \rightarrow %m/v = $\underline{0,1g}$ x 100 = 0,1 g/cm³
Vsol 100 cm³

$$\%$$
m/v = 0,1 %

En la etiqueta de una solución de mercuriocromo se lee que contiene 18ml de solución al 7 % en masa / mililitros. ¿Qué cantidad de soluto estará contenido en dicha solución?

Unidades químicas de concentración

1) Molaridad M (mol/l) ó (n/l)

Una relación que se suele emplear para expresar la concentración de las soluciones, una de las más útiles e importante, es *la molaridad* que relaciona la cantidad de soluto expresado en moles, con el volumen de solución. Así por ejemplo, al expresar una solución de concentración 0,1 mol/l señala que en dicha solución contiene 0,1 mol de soluto por cada litro de solución.

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{mol sto}}{\mathbf{L sol.}}$$

Ejercicio:

Determinar la concentración molar de una solución que fue preparada disolviendo 5 gramos de K₂Cr₂O₇ en 80 ml de solución. Masa molar del K₂Cr₂O₇ = 294g/mol.

Solución:

Se determina el número de moles de soluto ($K_2Cr_2O_7$) nsto: = msto = 5 g = 0,017mol. Masa molar 294 g / mol

Se convierte los ml a L, Vsol = 80 ml x 1L = 0.08 L1000 ml







Se calcula la concentración:
$$M = \underline{nsto} \rightarrow M = \underline{0,017 \text{ mol}} \rightarrow M = 0,21 \text{ mol/L}$$

Vsol 0.08 L

¿Qué cantidad en gramos de hidróxido de potasio estará presente en 2,5 dm³ de solución de concentración 0,08 mol/L?

2) Molalidad m (nto / Kgste)

Es la magnitud física que mide la cantidad de soluto, expresada en moles, por cada kilogramo de solvente.

Ejercicio:

¿Cuál es la molalidad de una solución que contiene disueltos 360g de glucosa, C6H12O6, en dos litros de agua? Densidad del agua = 1g/ml

Solución:

Se calcula la masa molar del soluto:
$$C = 6x12 = 72$$

$$C_6H_{12}O_6 \qquad H = 12x1 = 12$$

$$O = 6x16 = 96 + 180g/mol$$

Se calcula el número de nsto: $nC_6H_{12}O_6 = \underline{msto} = \underline{360 \text{ g}} = \mathbf{2 \text{ mol}}.$ Masa molar $180 \underline{\text{g}}/\text{mol}$

Se determina la molalidad: $m = \underline{nsto} = \underline{2mol} \rightarrow m = \underline{1mol/kg}$. mste 2kg

Recuerda utilizar la densidad para transformar unidades, como se hizo en esta caso de llevar los 2L kilogramos.

¿Cuál será la molalidad de una solución que se preparo disolviendo 0,07 kg de Cloruro de Sodio (NaCl) en tres litros de agua?







3) Fracción molar (Xsol)

Define la cantidad de soluto expresada en moles, por cada mol de partículas de solución y se expresa con la letra (x).

$$Xsol. = Xsto + Xste = 1$$

$$\mathbf{Xsto} = \underbrace{\mathbf{nsto}}_{\mathbf{nsto} + \mathbf{nste}} \qquad \mathbf{Xste} = \underbrace{\mathbf{nste}}_{\mathbf{nste} + \mathbf{nsto}}$$

Xsol = fracción molar de la solución, **Xsto** = fracción molar del soluto, **Xste** = fracción molar del solvente.

Ejercicio

Calcula la fracción molar de una solución que contiene 72g de azúcar (C₆H₁₂O₆) disueltos en 108g de agua.

Solución:

Masa molar del agua = 18g/mol Masa molar de la glucosa = 180g/mol

Se calcula el número de nsto: $nC_6H_{12}O_6 = \underline{msto} = \underline{72 \text{ g}} = \mathbf{0,4 \text{ mol.}}$ Masa molar $180 \underline{\text{g}}/\text{mol}$

Se calcula el número de nste: $nH_2O = \underline{mste} = \underline{108} \, \underline{g} = \underline{6} \, mol.$ Masa molar $\underline{18} \, \underline{g} / mol$

Número de moles solución (nsto + nste) = 0.4 + 6 = 6.4 mol Se calcula Xsto y Xste:

 $\mathbf{Xsto} = \underline{nsto}$ = $\underline{0,4}$ = 0,0625 $\mathbf{Xste} = \underline{nste}$ = $\underline{6}$ = 0,9375 $\underline{nsto} + \underline{nste}$ = 6,4







Comprueba que Xsol. = Xsto + Xste = 1

$$X$$
sol. = $0.06 + 0.93 = 0.99$

Calcular la fracción molar de urea y agua de una solución que se formo disolviendo 0,02 kg de urea en 0,1 kg de agua.

4) Partes por millón (ppm)

Cuando la cantidad de soluto presente en una solución es muy pequeña, es decir, cundo está muy diluida, es posible expresar la concentración en partes por millón (ppm), la cual expresa la cantidad de partes de soluto que hay por cada millón de partes de solución.

En el campo de la contaminación ambiental es común el empleo de unidades tales como el mg/ L, mg /kg. Así por ejemplo la organización mundial de la salud (O.M.S), ha fijado las concentraciones máximas tolerables para las sustancias químicas tóxicas contaminantes que presentan peligro para la salud en aguas destinadas al consumo de humanos.



Fecha de entrega Del 12 al 16 de julio de 2021

PARTE TEÓRICA

- 1) ¿Por qué los ingenieros químicos miden la cantidad de azufre en el petróleo?
- 2) ¿Por qué en la industria de las bebidas gaseosas se miden las cantidades de edulcorante, cafeína, y todos los componentes que dichas bebidas?







- 3) ¿Por qué los ingenieros de las siderúrgicas miden las cantidades de hierro, carbono, manganeso entre otros elementos?
- 4) Explique cuáles son los factores que afectan la solubilidad de la soluciones. De un ejemplo de cada uno de ellos.
- 5) Realiza un ensayo mínimo de dos hojas tomando en cuenta la importancia que tienen las soluciones en la vida cotidiana.
- 6) ¿Qué es la normalidad? ¿Cuáles son sus unidades? De ejemplo de un ejercicio.

PARTE PRÁCTICA

- 1) Se formó una disolución de azúcar y agua para hacer cupcakes, se tenían 1200 gramos de agua y se calcularon los moles de azúcar 25,2 moles. En base a esa información calcule la molalidad de mezcla.
- 2) Se tiene una disolución de ácido sulfúrico al 40% en masa y de densidad 1,32 g/ml calcular la concentración en m/v.
- 3) Determine la masa del soluto y del solvente en 100ml de solución de ácido nitrico al 82% m/v.
- 4) La vainilla C8H12O3 se encuentra naturalmente en el extracto de vainilla y se emplea como saborizante, una muestra de 37,2 mg de vainilla se disolvió en 168,5 mg de éter difenilico C12H10O. Calcule la molalidad de la solución.
- 5) Un estudiante disuelve 350g de H2SO4 en 750cc de agua obteniendo 895cc de solución. Calcular lo siguiente: a) Concentración molar. b) Concentración molal. c) fracción molar del soluto y solvente.
- 6) La cafeína C8H10N4O2 es un estimulante que se encuentra en el te y en el café una muestra de la sustancia se disolvió en 45 ml de cloroformo CHCl3 para dar una solución de 0,0945 molar. Calcule cuántos gramos de cafeína habrá en la muestra.
- 7) Realiza un vídeo explicando la pregunta número cuatro (4) la parte teórica.
- 8) Realiza un vídeo explicando la parte (a) y la parte (c) del ejercicio número cinco (5) de la parte práctica.









- Puedes apoyarte con toda la información que creas necesaria ó este a tu alcance.
- Realizar la actividad lo más organizada posible llevando un orden cronológico de las preguntas respuestas.
- Identificar claramente quien envía el trabajo y en la portada del mismo el nombre y sección del estudiante.
- Colocar nombre a todas las hojas de trabajo, cuando envíen fotos.