





Lunes 17 de Enero del 2022

Docente: José A. Lucas

3er Año "A" y "B"

Área de formación: Física

Fecha límite de entrega: 31/01/2022



Petróleo y Energía



- La agricultura como proceso fundamental para la independencia alimentaria.
- El papel de la mujer en el proceso histórico de Venezuela para la construcción de la independencia.



• Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U)



# Movimiento Rectilineo Uniforme (M.R.U)

Imagina que eres un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Estás arreglando unos paneles solares averiados, cuando de pronto, al presionar, tu destornillador sale disparado de tus manos. Si no lo atrapas a tiempo, el destornillador estará viajando por el espacio en línea recta y a velocidad







constante, a menos que algo se interponga en su camino. Esto sucede porque la herramienta se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, o M.R.U.



Estación Epacial Internacional orbitando nuestro planeta. Créditos: <u>International Space Station orbiting above earth</u> de la National Reconnaissance Office.

El M.R.U se define como movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento una velocidad constante y sin aceleración.

Recuerda que la velocidad es un vector, entonces, al ser constante, no varía ni su magnitud, ni su dirección de movimiento.

En tal sentido:

Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante. Esto implica que recorre distancias iguales en tiempos iguales.







# Ecuaciones del Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U):

Movimiento rectilíneo uniforme		
Variable a calcular	Ecuación	
Velocidad	$V = rac{desplazamiento}{tiempo}$ $v = rac{d}{t}$	
Rapidez	$V = \frac{distancia\ recorrida}{tiempo}$ $V = \frac{d}{t}$	
Distancia	distancia = velocidad.tiempo d= v . T	
Tiempo	$t = rac{distancia}{velocidad}$ $t = rac{d}{v}$	

## Unidades del Movimiento Rectilíneo Uniforme


	Significado	Unidad de Medida	Otra Unidad de Medida
d	distancia	m	Km
V	velocidad	m/s	Km/h
t	tiempo	S	h







#### Resumen del Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U)









### **Ejemplos:**

#### Ejemplo 1:

Un móvil avanza con M.R.U a una rapidez de 5 m/s durante 10 s. Calcular la distancia recorrida.


#### Solución:

Se debe recordar que el móvil avanza con M.R.U y además se tienen los siguientes datos:

• Rapidez: v = 5 m/s

• Tiempo: t = 10 s.

• Distancia: d = ?



Se calcula la distancia «d» empleando la siguiente fórmula:.

$$d = v \cdot t$$
 Ahora se procede a sustituir valores numéricos

$$d=5\,\frac{m}{s}\cdot 10\,s$$

$$d=5\ \frac{m}{s}\cdot 10\ s$$

$$d = 50 m$$

La distancia recorrida por el auto es de 50 metros.







#### Ejercicio 2:

Una bicicleta avanza con M.R.U recorriendo 3 kilómetros en 1500 segundos. ¿Con qué rapidez avanza?

#### Solución:

En este caso, se puede ver que la bicicleta avanza con M.R.U, es decir, con rapidez constante. Además, la distancia está expresada en kilómetros, lo cual indica que se debe expresaren metros (para seguir trabajando en el sistema (M.K.S)


$$d = 3km = \frac{3km.\,1000m}{1km} = 3000m$$

Ahora sí, se tiene los siguientes datos:

• Tiempo: t = 1500 s.

• Distancia: d = 3000 m.

• Rapidez: v = ?



Como se debe calcular la rapidez, se utiliza la ecuación correspondiente:

$$v = \frac{d}{t}$$

Ahora se procede a sustituir valores.

$$v = \frac{3000 \, m}{1500 \, s}$$

$$v = \frac{3000 \, m}{1500 \, s}$$

$$v = 2 m/s$$

La rapidez con la que avanza la bicicleta es de 2 m/s.









# PARTE I

# Teoría y Resolución de Ejercicios 20 PUNTOS

- 1. Defina las magnitudes físicas. 3 pts
- 2. ¿Cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? 2 pts
- 3. ¿Qué es una magnitud escalar y una magnitud vectorial? 3 pts
- **4.** La velocidad del sonido en el aire es 340 m/s. Desde que se produjo el relámpago hasta que se oyó el trueno han transcurrido 8 s. ¿A qué distancia se produjo la descarga eléctrica? **4 pts**
- **5.** Un tren avanzó 30 metros en un tiempo de 2.4 segundos, si la velocidad del tren era constante ¿Cuál fue la velocidad del tren durante los 2.4 segundos? **4 pts**
- 6. Hay dos hombres que practican caminata olímpica. El hombre a recorre una distancia de 37 metros en 12.5 segundos, mientras que el hombre b hace logra una distancia de 44 metros en 19.3 segundos, conociendo esto: ¿Cuál de los dos hombres fue más rápido? 4 pts









- ✓ Colección Bicentenario de 3er año Ciencias Naturales /Ciencias para vivir en comunidad Ely Brett C. Física de 3er año.
- ✓ Se sugiere que el estudiante tenga una calculadora científica para facilitar el desarrollo de algunas operaciones matemáticas
- ✓ Las actividades deben ser desarrolladas en el cuaderno de clases, y enviarla al correo electrónico:

joselucasc007@gmail.com