





Docente: Canelón Juan y Salazar Fernando.

5 Año: "A" y "B"

Área de formación: Química



Petróleo y Energía



El protagonista de la vida: El carbono



- ✓ Isómeros
- ✓ Tipos de Isómeros
- ✓ Importancia

"Todo está hecho de átomos... pero, ¿De qué se componen los átomos? Los hombres de ciencia han mostrado siempre una sorprendente curiosidad por tratar de buscarle explicación a todo aquello cuanto signifique un enigma para ellos"









ISÓMEROS

Existen compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular pero se diferencian en algunas de sus proipiedades. Estos compueretos reciben el nombre de isómeros y este fenómeno se conoce como isomería.

Puede generalizarse que los isómeros son compuestos con la misma fórmula molecular, pero con difrenetes fórmulas estructurales. Son iguales entre sí en cuanto a los átomos que están unidos unos con otros, pero se diferencian en cuanto a la orientación espacial de sus átomos, lo cual es la razón de las diferencias entre sus propiedades.

Por ejemplo:

Sustancia	Fórmula	Fórmula	Pto. De	Reacción con
Química	Molecular	Estructural	Ebulliciuón	Sodio
Alcohol Etílico	C2H6O	CH3 – CH2 - OH	78°C	Desprende H (g)
Éter Dimetílico	C2H6O	CH3 – O - CH3	-24°C	No reacciona

Observe que ambas sustancias tienen la misma fórmula molecular pero difieren en su fórmula estructural y en las propiedades físicas y químicas, al tener estructuras diferentes, los isómeros tienen propiedades diferente.

Tipos de Isómeros

Para el estudio de los isómeros se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- *a) Isómeros Estructurales*: Estudian aquellas sustancias químicas que, teniendo la misma fórmula molecular, presentan fómulas estructurales diferentes y se clasifican como isómeros:
- **De cadena:** Se caracterizan porque los átomos en la cadena carbonada tienen diferentes posiciones. Por ejemplo:







Sustancia	Fórmula Molecular	Fórmula Estructural
2-metilpropano	C4H10	СН3 - СН − СН3 СН3
n-butano	C4H10	$H_3C - CH_2 - CH_2 - CH_3$

Ejercicios:

Para el compuesto C₅H₁₂ existen tres posibles isómeros de cadena, por ejemplo:

H₃C - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₃

H₃C - CH- CH₂ - CH₃

H₃C - CH- CH₂ - CH₃

CH₃

$$CH_3$$

n-pentano

2-metilbutano

2,2-dimetilpropano

En general, el número de isómeros estructurales aumenta considerablemente a medida que aumenta el número de átomos de carnono.

- *De Posición:* Se caracterizan por tener el mismo grupo funcional, pero se diferencian en las pociones que ocupan en la cadena carbonada. Por ejemplo:

Sustancia	Fórmula Molecular	Fórmula Estructural
1-propanol	СзН7ОН	$H_3C - CH_2 - CH_2 - OH$
2-propanol	СзН7ОН	CH ₃ -CH - CH ₃







Ejercicios:

2-metil-ciclopentanol

3-metil-ciclopentanol

- **De Función:** Se caracterizan por presentar un grupo funcional diferente, en consecuencia, pertenecen a series homólogas distintas. Por ejemplo:

Sustancia	Fórmula Molecular	Fórmula Estructural
Etanol	C2H6O	H ₃ C – CH ₂ – OH
Éter dimetílico	C2H6O	H ₃ C - O - CH ₃

Ejercicios:

Compare los compuestos y note que pertenecen a diferentes familias, uno pertenene a las cetonas y el otro a los aldehídos.

¿Cuál es cetona y cual es aldehído? ¿Cuál es fórmula molecular?

- **b)** *Isómeros Espaciales*: Estos isómeros se diferencian solo por la orientación de sus átomos en el espacio y para su estudio se clasifican en dos grupos:
 - ➤ Geométricos: Indican las rotacioes de los átomos y moléculas alrededor del enlace, cuando dos grupos similares se encuentran del mismo lado del doble enlace, el isómero adopta la posición







"cis" y cuando dos grupos similares se encuentran en lados opuestos, el isómero adopta la posición "trans".

Por ejemplo:

Las fórmulas del ácido maléico y el ácido fumárico ilustran la isomería geométrica cis y trans.

HOOC
$$COOH$$
 $C = C$ $COOH$

Ácido Maléico (cis) Ácido Cis-2-eno-butanodioico Ácido Fumárico (trans) Ácido Trans-2-eno-butanodioico

➤ Ópticos: son aquellos que presentan la propiedad de desviar el plano de la luz polarizada, se dicen que estos son compuestos ópticamente activos.

En todos estos compuestos se observa una característica común y es la presencia de carbonos asimétricos, que son aquellos cuyas cuatro velencias estan unidas a átomos o grupos de átomos diferente.

La desviación del plano de la luz polarizada, puede ser en dos sentidos: en sentido del movimiento de las agujas del reloj (hacias la derecha) (+) son conocidas como destrójiras y aquellas que la desvian hacia la izquierda (-) son conocidas como levógiras.

¿Qué son enatiómeros y diasteroisómeros?









Taller presencial 15 puntos (explicado el tema)

Ejercicios 5 puntos (Entrega día del taller)

- 1) Explique si el fenómeno de isomería tiene algún efecto sobre las propiedades físicas y quimicas de los compuestos orgánicos.
- 2) ¿Qué determina la existencia de isómeros geométricos?
- 3) ¿Cuántos compuestsos pueden tener la misma fórmula molecular C4H10O? Nombrelos
- 4) Escribe y construye la fórmula estrucural del n-pentano y del 2-metilbutano argumentado si esos compuestos representan un caso de isomería.
- 5) Escribe y nombra los isómeros de posición que resulten del compuesto con fórmula molecular C4H9Cl.



- Puedes apoyarte con toda la información que creas necesaria o esté a tu alcance.
- Llamar o enviar mensaje al profesor para solicitar apoyo sobre dudas.
- Informar sobre las actividades asignadas a tus padres o representantes para que participen en el proceso de aprendizaje.
- Realizar la actividad lo más organizada posible llevando un orden cronológico de las preguntas respuestas.
- Identificar claramente quien envía el trabajo y en la portada del mismo el nombre y sección del estudiante.

Teléf. 0424-9640399 (solo para consultas y dudas)

"Por más ciertos que sean los hechos correspondientes a cualquier ciencia, por más justas que sean las ideas derivadas de estos hechos, solo podremos comunicar a los demás impresiones falsas e imperfectas si nos faltan palabras para expresarlos con propiedad"

A. Lavoisier