



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. Arthur Araruna
QXD0115- Estrutura de Dados Avançada

Árvores AVL são balanceadas

1 Conceitos

Vamos relembrar os nossos conceitos que serão necessários para o resultado a ser demonstrado:

Definição 1.1. Uma árvore binária T , com n nós, tal que $h(T) = O(\lg n)$ é dita *balanceada*.

Definição 1.2. O *balanço* de um nó binário n é definido pela função $bal(n) := h(n.dir) - h(n.esq)$.

Definição 1.3. Uma árvore binária T é AVL quando, para todo nó $n \in T$, $|bal(n)| \leq 1$.

2 Demonstração

Observação:

A argumentação abaixo não é baseada na que consta em Szwarcfiter e Markenzon (2010) pois uma das afirmações dadas como válidas não é de fácil demonstração.

Note que devemos mostrar que $h \leq c \cdot \lg n$ para algum $c > 0$, com h sendo a altura de uma árvore AVL qualquer e n sendo seu tamanho. Entretanto, nossa estratégia será um pouco mais restrita, mas permitirá concluirmos a mesma coisa.

Em vez de analisarmos uma árvore qualquer, vamos observar, para um dado h arbitrário, uma árvore AVL com altura h que contenha o mínimo possível de nós. Se essa árvore respeitar a desigualdade anterior, poderemos concluir que *todas* as AVL com essa mesma altura também a respeitarão (já que para essa tal árvore o lado direito da desigualdade é o menor possível, todas as outras apresentarão valores ainda maiores, o que mantém a desigualdade).

2.1 Estrutura da árvore

Para entendermos como construir uma árvore como desejamos, veja que sempre que, em uma árvore AVL T com altura h , encontrarmos um nó n com $bal(n) = 0$, poderíamos substituir uma de suas sub-árvores por outra AVL com uma altura 1 unidade menor que a que foi retirada sem invalidar a propriedade AVL de T . Isso constrói uma nova árvore T' com a mesma altura que a anterior T e certamente tamanho menor. Dessa forma, podemos concluir que a árvore desejada não pode ter nenhum nó com balanço nulo.

2.2 Contagem de nós da árvore

Vamos definir a função $N(h)$ de forma a representar o menor número de nós possível para uma árvore AVL de altura h , que chamaremos de T .

Como vimos anteriormente, as sub-árvores de T devem possuir alturas $h-1$ e $h-2$, não necessariamente nesta ordem. Além disso, podemos afirmar que ambas se tratam de árvores AVL com o mínimo de nós para a respectiva altura, caso contrário não faria sentido T possuir

tamanho mínimo (já que elas poderiam ser trocadas por outras árvores de mesma altura e menos nós).

Dessa forma, podemos afirmar que o valor de $N(h)$ pode ser calculado como

$$N(h) = \begin{cases} N(h-1) + N(h-2) + 1, & \text{se } h \geq 2; \\ 1, & \text{se } h = 1; \\ 0, & \text{se } h = 0. \end{cases}$$

Observe que a função $N(h)$ é monotonicamente crescente¹. Com isso, e observando os casos-base, podemos afirmar que $N(h) \geq 2N(h-2)$ para todo $h \geq 3$ ².

3 Conclusão

Resolvendo⁴ a nova equação de recorrência obtida, obtemos que $N(h) \geq 2^{h/2}$. Lembrando que $N(h)$ é o número de nós de T , que passaremos a denominar por n , concluímos que, para todo $h \geq 3$,

$$\begin{aligned} n = N(h) &\geq 2^{h/2} && \Rightarrow \\ \log_2 n &\geq \frac{h}{2} && \Rightarrow \\ h &\leq 2 \log_2 n \end{aligned}$$

Apêndice

4 Resolução da Recorrência

Referências

SZWARCFITER, J.L.; MARKENZON, L. **Estruturas de dados e seus algoritmos (3a. ed.)**. [S.l.]: Grupo Gen - LTC, 2010. ISBN 9788521629948.

¹Isso porque todos os valores envolvidos são não-negativos e as operações realizadas são apenas adições.

²Considere que substituímos o termo $N(h-1)$ por um termo $N(h-2)$ e o termo 1 por um termo 0. Em ambas as substituições, os novos valores são menores.

³É válido para todo $h \geq 2$, mas o valor-base 0 atrapalha a argumentação que vem a seguir.

⁴Veja argumentação no Apêndice