تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster



العلاج بالضخ أو الترسيب لمرض باركنسون

Pump therapy for Parkinson's disease

العلاج بالضخ أو التسريب لمرض باركنسون

حقائق أساسية للمرضى.

ماهو دور العلاج الدوائي في مرض باركنسون؟

يعانى مرضى باركنسون من نقص المادة الكيميائية (دوبامين) فى المخ.

يساعد العلاج الدوائي فى تخفيف الأعراض وتؤخذ معظم هذه الأدوية عن طريق الفم مرات عديدة يومياً.

فى بداية استخدام الأدوية لأول مرة ستلاحظ امتداد مفعولها لتشمل اليوم بأكمله ، لكن كلما تقدم المرض ستلاحظ أن مفعول الدواء لا يدوم حتى موعد الجرعة التالية ، وهذا يسمى توقف أو زوال المفعول.

عندما يحدث التوقف(OFF) تعاود أعراض مرض باركنسون فى الظهور مرة أخرى مثل الرجفة ، بطء الحركة وصعوبة

المشي، بينما تتحسن هذه الأعراض عندما يبدأ الدواء فى العمل وهذا يسمى ببدأ التشغيل (ON) ينتج عن ذلك الحاجة لأخذ الدواء مرات عديدة فى اليوم مع صعوبة التحكم فى أعراض المرض .

ماهو العلاج بالضخ (الحقن التسريبي) لمرض باركنسون؟

هو العلاج عن طريق تسريب الدواء أو ضخه من خلال إبرة صغيرة يتم إدخالها تحت الجلد ، أو عن طريق أنبوب (قسطرة) يتم إدخاله عن طريق الأمعاء الدقيقة ، موفراً تدفق مستمر للأدوية خلال اليوم .

يعد عقار ليڤودوبا (Levodopa) وعقار الأبومورفين (Apomorphine) الأكثراستخداماً عن طريق الضخ أو التسريب لعلاج نقص الدوبامين فى المخ.

- ليڤودوبا (Levodopa) :

يتحول هذا العقار فى المخ إلى دوبامين.

ويعتبر من أكثر الأقراص استخداما لعلاج مرض باركنسون ، والآن يمكن ضخه عن طريق الأمعاء على هيئة جل معوي يسمى ليڤودوبا – كاربيدوبا (LCIG) ويستخدم لتقليل أوقات التوقف (OFF)

- أبومورفين (Apomorphine) :

هذا العقار يعمل كمنبه لمستقبلات الدوبامين ، وله نفس تأثير الدوبامين على خلايا المخ. يتم ضخه أو تسريبه تحت الجلد إما فى حقنه مرة واحدة أو على شكل ضخ مستمر.

وأيضا يساعد فى تقليل أوقات التوقف (OFF)

كيف يخزن الدواء ؟

يتم تخزين كلاً من الجل المعوى ليڤودوبا – كاربيدوبا LCIG و أبومورفين فى مضخة خارجية محمولة متصلة بأنبوب، حيث تتصل مضخة الجل المعوى بأنبوبة تقوم بضخ الليڤودوبا إلى الأمعاء ، بينما يتصل أنبوب مضخة الأبومورفين بإبرة صغيرة مثبتة تحت الجلد بواسطة لاصق لحفظها فى مكانها.

لماذا العلاج بالضخ (الحقن التسريبي)؟

عندما تعاني من ظاهرة زوال مفعول الدواء (Wearing off) ، لا تقوم خلايا المخ بإمتصاص الليڤودوبا أو تخزين الدوبامين. ينتج عن ذلك عدم تحكمك فى أعراض المرض مع حاجتك لتناول الدواء بصفة مستمرة مرات عديدة خلال اليوم.

- وهنا يضمن لك العلاج بالضخ أو التسريب استمرارية الدواء ويوفرتخفيف الأعراض بشكل ثابت يمكن الإعتماد عليه.
- كما يقلل أيضا العلاج بالضخ أو التسريب من الحاجة لتناول الدواء عن طريق الفم عدة مرات فى اليوم.
- يعد العلاج بالضخ أكثر فعالية من الأقراص الممتدة المفعول أو اللصقات المستخدمة لعلاج مرض باركنسون.

من ينبغي أن يأخذ هذا العلاج في الاعتبار؟

يوصى بالعلاج بالضخ أو التسريب إذا كانت الأدوية المتناولة عن طريق الفم تساعدك لكنك تعاني من زوال المفعول (wearing off) أو ظهور إختلال الحركة (dyskinesia) وهي حركات لا إرادية تظهر مع تناول الكثير من الأدوية .

عادة ما يقوم الكثير من المرضى بتجربة أدوية أخرى مختلفة يتم تناولها بالفم أو لصقات خاصة بمرض باركنسون قبل قرار بدء العلاج بالضخ

من الضرورى ملاحظة أنه فى حالة عدم استجابة أعراضك للأدوية المتناولة عن طريق الفم وتحسنها ، حتى لفترة قصيرة ، لا يوصى باستخدام العلاج بالضخ أو التسريب.

أين يتم إعطاء هذا الدواء ؟

يبدأ المرضى العلاج بالضخ أو التسريب عادة فى المستشفى وفى بعض الأحيان فى العيادة الخارجية.

مع استخدام الجل المعوى ليڤودوبا – كاربيدوبا (LCIG)
يقوم الطبيب بتثبيت أنبوب القسطرة فى أمعائك ويبدأ الدواء.

مع إستخدام الأبومورفين قد يتطلب الأمر المكوث فى المستشفى لبضعة أيام وذلك لتجربة الدواء أو قد تتم التجربة فى العيادة الخارجية .

العلاج بالضخ عادة ما يبدأ فى الصباح وينتهي ليلاً . في خلال فترة الشهور الأولى للعلاج يقوم الطبيب أو الممرض بضبط الجرعة التي تحتاجها.

ماهي مضاعفات و قيود (معيقات) استخدام العلاج بالضخ (الحقن التسريبي) ؟

العلاج بالضخ غير متوفر فى جميع أنحاء العالم ، يوجد فقط في بعض البلدان

تكلفة العلاج بالضخ أعلى من الحبوب واللصقات مما يحد من توافرها



التعامل مع العلاج بالضخ يحتاج لوجود مقدم للرعاية وتدريب ودعم

قد تحدث بعض المشاكل التقنية أثناء تركيب أنبوبة الجل المعوى ليڤودوبا – كاربيدوبا (LCIG).

حدوث حساسية الجلد وارد مع استخدام الابومورفين.

استخدام الجل المعوى ليڤودوبا – كاربيدوبا (LCIG) أو الأبومورفين (Apomorphine) له نفس مضاعفات أدوية باركنسون الأخرى مثل :

- الشعور بالغثيان
- النعاس
- انخفاض ضغط الدم
- الإرتباك
- الهلوسة

تحدث هذة الأعراض على وجه الخصوص إذا كان هناك مشاكل مع الأدوية الأخرى.

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

قسم التمريض

المركز الوطني للعلوم العصبية

King-fahad-medical-city

@Kfmc_Riyadh

KfmcRiyadh

8001277000

HEM3.19.000688