Formelprüfung Part B (Teil II): Satz und Notation

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Teil II, Kap. 1–4, geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`). Geprüft wurden nur Satz und Notation in Formeln: Tippfehler, Klammern, Indizes, uneinheitliche Schreibweisen, Mathemodus, Satzzeichen an Formeln, Verweise. Beweise wurden **nicht** nachgerechnet; wo ein Befund inhaltlich wirkt, steht „bitte prüfen".

Noch nichts geändert. Die Liste dient zur Besprechung; umgesetzt wird erst nach Rücksprache.

Spalten: S. = gedruckte Buchseite, ermittelt über das nächstgelegene Label (kann um eine Seite abweichen). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● eindeutig · ◐ sehr wahrscheinlich · ○ Hinweis/Ermessen.

Insgesamt **206 Punkte**: 50 ●, 93 ◐, 63 ○. Davon stehen 13 bereits in der Arbeitsliste `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` (im Kommentar markiert).

Einzelbefunde

Teil II, Kap. 1 – Basic Results on Spaces $C_0(X)$ (`part-b/chap-b1.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
137	57	○	`C_{0}(X\backslash F)`	`C_{0}(X\setminus F)`	LaTeX	\backslash setzt einen großen Backslash ohne Abstände wie bei einem binären Operator; für Mengendifferenz \setminus (im Buch überwiegend, 34 vs. 12 Stellen). Einzige Stelle im Kapitel.
137	57	◐	`via the map $f + J \to f\vert_{F}$`	`via the map $f + J \mapsto f\vert_{F}$`	Notation	Zuordnung von Elementen: \mapsto (im Buch durchgehend so, z. B. t ↦ T(t)f); ebenso Z. 110 `$t \to \delta_{t}$` → `$t \mapsto \delta_{t}$`.

Teil II, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b2.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
142	58	○	`(n/tR(n/t,A))^{n}`	`((n/t)R(n/t,A))^{n}`	Notation	„n/tR" ist mehrdeutig (liest sich wie n/(tR…)); n/t klammern.
142	101	○	`\mleft( (\eu^{tA}f(x) - f(x)) \mright)`	`\bigl( (\eu^{tA}f)(x) - f(x) \bigr)`	Klammern	Doppelte Klammer; gemeint ist (\eu^{tA}f)(x), vgl. Z. 102.
142	102	•	`\mleft( (\eu^{tA}f(x) \mright)`	`(\eu^{tA}f)(x)`	Klammern	Innere öffnende Klammer ohne Gegenstück; gedruckt „((e^{tA}f(x)) ".
142	146	◐	`This shows~\ref{thm:b2-1.3-2} to hold.`	`This shows~\ref{thm:b2-1.3-3} to hold.`	Verweis	Im Beweisschritt (b) ⇒ (c) wird A + ‖A‖Id ≥ 0, also (c), gezeigt; bitte prüfen.
142	152	◐	`\qedhere \qedhere`	`\qedhere`	LaTeX	\qedhere steht doppelt (Z. 152/153).
144	225	◐	`0 \leq u \in C(K)`	`0 \ll u \in C(K)`	Tippfehler	Gemeint ist ein strikt positives u (vgl. Z. 246, 461, 629, 638: „strictly positive" bzw. u ≫ 0); vermutlich ≪ bei der Konvertierung zu ≤ geworden. Ebenso Z. 251, 423, 474, 561, 605, 732, 823 (jeweils u), 1861 (p, vgl. Satz: „strictly positive p") und 2260 (p mit inf p > 0). Bitte

						prüfen.
144	247	○	`\{u \in C(K): u \gg 0\}`	`\{u \in C(K) \colon u \gg 0\}`	Notation	Sonst \colon in Mengenklammern (anderer Abstand); ebenso Z. 2455, 2463, 2664, 2669.
144	263	◐	`\sup_{\lambda \geq \omega}`	`\sup_{\lambda \geq w}`	Tippfehler	Im selben Ausdruck und in Theorem~\ref{thm:b2-1.8} heißt die Konstante w, nicht ω.
146	389	•	`\textcite{greinervoigtwolff:1981}` + Zeilenumbruch + `)`	`\textcite{greinervoigtwolff:1981})`	Abstand	Schon in der Arbeitsliste. Der Zeilenumbruch erzeugt ein Leerzeichen vor „)“.
147	434	○	`(f \in C(K)\,)`	`(f \in C(K))`	Abstand	Überzähliger Abstand vor „)“; ebenso Z. 902 `\,($f \in C[-1,0]$\,)`.
148	568	•	`$\lambda > \lambda_{0}$ ,`	`$\lambda > \lambda_{0}$,`	Abstand	Leerzeichen vor Komma.
148	588	◐	`(see Eq.~\myeqpageref{eq:a3-1.3})`	`(see Part-I, Eq.~\myeqpageref{eq:a3-1.3})`	Verweis	Verweis auf Part I ohne „Part-I“; gedruckt „(3.1.3)“, kollidiert mit der Gleichungsnummerierung in Part II, Kap. 3.
149	636	○	`Au = \lambda u - 1`	`Au = \lambda u - \1`	Notation	Konstante Funktion sonst \1 (vgl. u = R(λ,A)\1 in derselben Zeile).
150	696	•	`0 & \text{if } x+t > 0`	`0 & \text{if } x+t > 1`	Tippfehler	Gegenfall zu „x+t ≤ 1“; bitte prüfen (wegen X = [0,1) ggf. „< 1“ / „≥ 1“).
150	730	◐	`also generates a positive semigroup).`	`also generates a positive semigroup.`	Klammern	Schon in der Arbeitsliste. Schließende Klammer ohne öffnende.
151	754	○	`&\text{ then } q \cdot B`	`&\text{then } q \cdot B`	Abstand	Führendes Leerzeichen in \text rückt die Zeile gegenüber Z. 752/753 ein; ebenso Z. 2995/2996 im array (`\text{ and there exists …}`, `\text{ such that …}`).
151	770	◐	`$(I - q \cdot B)$`	`$(\Id - q \cdot B)$`	Notation	Identität sonst \Id (Z. 775, 779); ebenso Z. 793 und 812 `(R(1,B) - I)`.
151	803	•	`\sup\nolimits_{|f|_{u} \leq 1}\{ \,`	`\sup\nolimits_{|f|_{u} \leq 1}`	Klammern	Die hier geöffnete Mengenklammer { wird nie geschlossen (Z. 804 schließt nur das innere {…}).
151	820	◐	`B = m^{1/k} \cdot A`	`B = m^{l/k} \cdot A`	Tippfehler	Der Laufindex l (l = 1, …, k−1) kommt sonst nicht vor; gemeint m^{l/k}; bitte prüfen.
152	854	○	`(P') \quad $f \in C(K)_{+}$`	`$(\mathrm{P}')$ \quad $f \in C(K)_{+}$`	Notation	Im Textmodus wird ' zum Apostroph statt Strich; ebenso Z. 846 und 876. Zudem überzähliges `\,` vor „implies“.
153	916	•	`\eu^{\lambda x} d\mu(x)`	`\eu^{\lambda x} \diff{\mu(x)}`	Notation	Kursives d, sonst aufrechtes \diff (vgl. Z. 913); ebenso Z. 1499 `- d\phi` und Z. 1832 `h(\phi(s,x))ds` (→ `\ds`).
153	958	○	`L_{11}u_{1} + \ldots + L_{1n}u_{n}`	`L_{11}u_{1} + \dots + L_{1n}u_{n}`	LaTeX	Zwischen Operatoren zentrierte Punkte; ebenso Z. 960.
154	1026	○	`g \in C([0,1])`	`g \in C[0,1]`	Notation	Im selben Beispiel C[0,1] (Z. 992) neben C([0,1]) und C^{2}([0,1]) (Z. 995, 1032, 1034); im Kapitel sonst meist C[−1,0], C^{1}[−1,0]. Vereinheitlichen.
154	1029	◐	`k = \frac{1}{2}\lambda\mleft(`	`k = \frac{1}{2\lambda}\mleft(`	Tippfehler	Mit Faktor λ/2 gilt λ²k − k'' = g nicht, mit 1/(2λ) schon (Original vermutlich „1/2λ“); bitte prüfen.
154	1041	○	`\exp(\lambda^{2})`	`\exp(2\lambda)`	Tippfehler	Die Determinante des Randwertsystems für h = a e^{λx} + b e^{−λx} enthält e^{2λ}; bitte prüfen.

155	1112	◐	`\lim_{t \to 0} 1/t(\Theta(f+tu) - \Theta(f))`	`\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{t} (\Theta(f+tu) - \Theta(f))`	Notation	Rechtsseitige Ableitung, also t ↓ 0 (wie Z. 1138); „1/t(…)“ zudem mehrdeutig.
156	1122	○	`\label{prop:b2-2.3}` … `(chain rule). Let`	`\begin{proposition}[Chain rule]\label{prop:b2-2.3}`	LaTeX	Titel steht als Text im Rumpf statt als optionales Argument (vgl. [Hille-Yosida] in Part I).
156	1140	◐	`- \Theta(k(a)) - D_{k'(a)}\Theta(k(a))\bigr]`	`- \Theta(k(a))\bigr] - D_{k'(a)}\Theta(k(a))`	Klammern	Der D-Term gehört nicht unter 1/t (vgl. Z. 1138); bitte prüfen.
156	1172	◐	`z = (x_{0} + iy_{0})`	`z = (x_{0} + \iu y_{0})`	Notation	Kursives i, sonst \iu (Z. 1417, 1541); ebenso Z. 1179 und 1183 (`iy_{0}`, `iu_{2}`).
156	1177	◐	`(\Theta(x_{0},y_{0})\vert u)`	`(\nabla\Theta(x_{0},y_{0})\vert u)`	Tippfehler	Gemeint ist das Skalarprodukt mit dem Gradienten; Θ(x0,y0) ist ein Skalar; bitte prüfen.
158	1254	◐	`= \left\langle \Re\left[\left(\widehat{\sign} \bar{f}\right)(Af)\right],\phi \right\rangle`	`= \Re\bigl[(\widehat{\sign} \bar{f})(Af)\bigr](x)`	Tippfehler	Die linke Seite ist punktweise in x; rechts gehört der Wert an der Stelle x (so die auskommentierte Z. 1255), nicht die Paarung mit ϕ.
158	1317	◐	`\overline{\lim}_{h \downarrow 0}`	`\limsup_{h \downarrow 0}`	Notation	Sonst \limsup (Z. 1139–1141).
159	1338	•	`\lim_{t \downarrow 0} \frac{1}{h}`	`\lim_{h \downarrow 0} \frac{1}{h}`	Tippfehler	Grenzübergang in h (vgl. Z. 1336/1337).
159	1338	•	`\langle (\vert T(s+h)f\vert - \vert T(s)f\vert ,`	`\langle \vert T(s+h)f\vert - \vert T(s)f\vert,`	Klammern	Öffnende Klammer ohne Gegenstück.
161	1482	◐	`for $(f \in D(A_{\max})$ and $ \phi \in D(A'_{\max}))$.`	`for $f \in D(A_{\max})$ and $\phi \in D(A'_{\max})$.`	Klammern	Klammerpaar über zwei Formeln verteilt; Klammern überflüssig.
161	1527	•	`D(A'_{max})`	`D(A'_{\max})`	Notation	Kursives „max“, sonst \max.
161	1548	◐	`\int_{0}^{1} \phi(x)\, \diff{\vert f(x)\vert}`	`\int_{-1}^{0} \phi(x)\, \diff{\vert f(x)\vert}`	Tippfehler	Integrationsgrenzen; das Intervall ist [−1,0]; bitte prüfen.
161	1548	○	`= \\` + `&= \phi(0)`	`\\` + `&= \phi(0)`	LaTeX	Gleichheitszeichen am Zeilenende und am nächsten Zeilenanfang (doppelt); sonst im Kapitel nicht so gesetzt.
162	1588	•	`\Re[\widehat{(\sign} f)(Af)]`	`\Re[(\widehat{\sign} \bar{f})(Af)]`	Klammern	Klammer im \widehat-Argument, Hut über „(sign“. Zusätzlich \bar{f} wie in (2.2.9) (ebenso Z. 1587); bitte prüfen.
162	1601	•	`$f~\in~C_{0}[-1,0)$`	`$f \in C_{0}[-1,0)$`	LaTeX	Tilden im Mathemodus erzeugen zusätzliche Abstände; ebenso Z. 2678 `=~x` und Z. 2967 `M^{-1}~+~h`.
164	1692	◐	`C([0,1]) \times K`	`C([0,1] \times K)`	Tippfehler	Identifikation C([0,1],C(K)) mit C([0,1] × K); bitte prüfen.
164	1702	○	`f,g \in D(\delta). \label{eq:b2-3.4} \\`	`f,g \in D(\delta), \label{eq:b2-3.4} \\`	Satzzeichen	Punkt nach der ersten von zwei Bedingungen; ggf. Punkt ans Ende von Z. 1703.
166	1811	◐	`by Eq.~\myeqpageref{eq:a2-1.8}`	`by Part-I, Eq.~\myeqpageref{eq:a2-1.8}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste (S. 166, „Verweis prüfen“). Das Ziel liegt jetzt in Part I, gedruckt wird aber „(2.1.8)“, identisch mit Eq. (2.1.8) dieses Kapitels; „Part-I,“ ergänzen.
166	1817	◐	`for all $t \geq 0$, $f \in C(K)$`	`for all $t \geq 0$, $f \in C(K)$.`	Satzzeichen	Satzpunkt fehlt (Absatzende nach abgesetzter Formel).
166	1838	•	`$f \in D(\delta)$ ,`	`$f \in D(\delta)$,`	Abstand	Leerzeichen vor Komma.
166	1841	○	`\frac{\diff{}}{\dt}\vert_{t = 0}`	`\left.\frac{\diff{}} {\dt}\right\vert_{t = 0}`	Notation	Strich nicht skaliert; sonst \left. … \right\vert (z. B. Z. 1744).
167	1895	○	`$A$ is \text{local}`	`$A$ is \emph{local}`	LaTeX	\text im Textmodus wirkungslos; vermutlich Hervorhebung des definierten Begriffs gemeint.
167	1913	◐	`non-com\-mutative C*-algebras`	`non-com\-mutative \CA-algebras`	Notation	In der Überschrift (Z. 1912) \CA (C mit hochgestelltem *), im Text „C“*

						mit Sternchen auf der Grundlinie; ebenso Z. 1914 (2x).
167	1922	•	`(\pm\1 - A)(D(A)) = \mathcal{A}_{h}.`	`(\pm\1 - A)(D(A)) = \mathcal{A}_{h}`	Satzzeichen	Der Satz geht nach der Formel weiter („and A is local …“).
167	1934	•	`T(t)_{t \in \R}`	`(T(t))_{t \in \R}`	Klammern	Sonst durchgehend (T(t))_{t ∈ R}.
168	2003	◐	`T(.)f`	`T(\cdot)f`	Notation	Platzhalter sonst \cdot (z. B. Z. 2560).
171	2151	◐	`\eu^{-ws}k_{s}(x)`	`\eu^{-\omega s}k_{s}(x)`	Notation	In (2.3.16)/(2.3.17) heißt die Konstante ω, im weiteren Beweis w; ebenso Z. 2153, 2158, 2160, 2169, 2170, 2177, 2183.
171	2183	•	`k_{t}(t)\,p(x)^{-1}`	`k_{t}(x)\,p(x)^{-1}`	Tippfehler	Argument ist x (vgl. Z. 2177).
172	2211	○	`for all \\`	`for all`	LaTeX	Manueller Zeilenumbruch im Fließtext; ebenso Z. 2764 (`\\is contained`) und 2767 (`$\delta_{m}$\\`).
173	2241	•	`p(\phi_{t}(x)^{-1}`	`p(\phi_{t}(x))^{-1}`	Klammern	Schließende Klammer fehlt (vgl. (2.3.15)).
173	2258	◐	`$V^{-1}\delta V$ generates a positive group`	`$V\delta V^{-1}$ generates a positive group`	Tippfehler	Passend zu (2.3.18) A = VδV^{-1} + h und Z. 2270; bitte prüfen.
173	2299	○	`denotes the scalar product in $\R^{n}$`	`denotes the scalar product in $\R^{n}$.`	Satzzeichen	Satzpunkt am Ende des Beispiels fehlt.
173	2308	•	`f(\phi(x,t))`	`f(\phi(t,x))`	Tippfehler	Argumentreihenfolge; sonst ϕ(t,x).
173	2309	•	`\big(\mathrm{grad}\: f)(\phi(t,x)) \big\vert F(\phi(t,x))\big)`	`\big((\mathrm{grad}\: f)(\phi(t,x)) \big\vert F(\phi(t,x))\big)`	Klammern	Öffnende Klammer vor grad fehlt (vgl. (2.3.21)).
173	2347	◐	`\nabla(f \circ \phi_{t})(x) = (\nabla f)(\phi_{t}(x))`	`[\mathrm{grad}\:(f \circ \phi_{t})](x) = (\mathrm{grad}\: f)(\phi_{t}(x))`	Notation	Im selben Beispiel sonst „grad“ (Z. 2289–2315); ebenso Z. 2349, 2352, 2353 (überarbeitete Passage).
175	2405	◐	`-\infty \leq c \text{ and } m(c) = 0`	`-\infty < c \text{ and } m(c) = 0`	Tippfehler	Analog zu „d < ∞“ in Z. 2413; der Fall c = −∞ ist die Alternative „a = c = −∞“.
175	2508	•	`Bg = V^{-1}\delta_{m}V = V^{-1}(m(g \circ q)')`	`Bg = V^{-1}\delta_{m}Vg = V^{-1}(m(g \circ q)')`	Tippfehler	g fehlt.
176	2532	•	`C^{1}(a',b)`	`C^{1}(a',b')`	Tippfehler	Strich fehlt.
176	2546	○	`B_{1}u(t) \quad u(0) = f.`	`B_{1}u(t), \quad u(0) = f.`	Satzzeichen	Komma vor \quad.
176	2576	○	`\quad x \in (a,b).`	`\quad (x \in (a,b)).`	Notation	Laufbereich sonst in Klammern (z. B. Z. 2569); ebenso Z. 2621.
176	2588	◐	`g(q_{n}^{-1}(q_{n}(x) + t))`	`g(g_{n}^{-1}(g_{n}(x) + t))`	Notation	Die Funktionen heißen in Remark~\ref{rem:b2-3.17} bzw. in (2.3.22) g_n; q_n wird in Theorem~\ref{thm:b2-3.24} anders verwendet; ebenso rechte Seite.
178	2758	◐	`then $D(\delta)$ contains`	`then $D(\delta_{m})$ contains`	Tippfehler	Gemeint ist der Definitionsbereich von δ_m.
178	2767	◐	`differentiable functions in $D_{0}(\delta_{m})$`	`differentiable functions in $D(\delta_{m})$`	Tippfehler	Zirkuläre Definition; vgl. Theorem~\ref{thm:b2-3.17}.
180	2865	◐	`constructed from $m$ in Theorem~\ref{thm:b2-3.17}`	`constructed from $m$ in Remark~\ref{rem:b2-3.17}`	Verweis	Die Konstruktion des Flusses (2.3.22) steht nach der Aufteilung jetzt in der Remark; ebenso Z. 2931.
182	2970	○	`$A = V\delta_{m}V^{-1} + h$`	`$A = V^{-1}\delta_{m}V + h$`	Notation	Die Aussage (2.3.24) lautet A = V^{-1}δ_mV + h; mit V = MU passt die Form im Beweis nicht dazu (dann V = (MU)^{-1}); bitte prüfen.
182	2975	•	`\phi(a,t) = a` … `\phi(b,t) = b`	`\phi(t,a) = a` … `\phi(t,b) = b`	Tippfehler	Argumentreihenfolge (vgl. Z. 2978).
						Sonst \tilde{\delta}_m (Z. 2992–

182	2981	◐	`\widetilde{\delta}_{m}`	`\tilde{\delta}_{m}`	Notation	3037); sichtbar verschiedene Akzentbreite (2x in der Zeile).
183	3050	◐	`A = V^{-1}\delta_{m}V + h`	`A = V^{-1}\tilde{\delta}_{m}V + h`	Notation	Auf C[a,b] ist der Operator δ_m (vgl. Theorem~\ref{thm:b2-3.27}); bitte prüfen.
184	3077	•	`(Theorem~\ref{thm:b2-3.14} )`	`(Theorem~\ref{thm:b2-3.14})`	Abstand	Schon in der Arbeitsliste. Leerzeichen vor „)“.

Teil II, Kap. 3 – Spectral Theory of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b3.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
188	64	◐	`\geq \vert\lambda_{0} - \mu_{0}\vert^{-1}`	`\geq \vert\lambda_{0} - \mu_{0}\vert^{-1}.`	Satzzeichen	Abgesetzte Formel beendet den Satz, der Punkt fehlt (der nächste Satz beginnt groß); ebenso Z. 74, 166, 250, 518, 636, 722, 812, 1486, 1972, 2212.
189	115	○	`(Af)(x) = f'(x) - xf(x), D(A) = \{`	`(Af)(x) = f'(x) - xf(x), \quad D(A) = \{`	Abstand	Komma zwischen zwei Formelteilen im Mathemodus ohne Abstand, wirkt gequetscht; ebenso Z. 449, 464, 1474, 1611, 1746, 1839, 2261.
190	197	◐	`by Example~\ref{ex:a3-3.6}`	`by Part-I, Example~\ref{ex:a3-3.6}`	Verweis	Das Ziel liegt in Part-I. Ohne den Zusatz liest man „Example 3.3.6“ als Beispiel aus Part-II (vgl. Z. 799, 945, 969, 1199 mit „Part-I,“).
190	230	◐	`\phi \in D(A^*)$ such that $A^*\phi = \alpha\phi`	`\phi \in D(A')$ such that $A'\phi = \alpha\phi`	Notation	Die Adjungierte steht sonst im ganzen Kapitel mit Strich (A', T(t)'), nur hier als A^*.
192	307	○	`equation Eq.~\myeqpageref{eq:b3-1.16}`	`Eq.~\myeqpageref{eq:b3-1.16}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Doppelte Bezeichnung „equation Eq.“.
192	312	○	`\langle \phi,1 \rangle = 1`	`\langle \phi,\1_{K} \rangle = 1`	Notation	Die konstante Funktion steht sonst als \1 bzw. \1_{K} (fett), hier als normale 1.
192	334	○	`\exp(-(x-y)^{2}/4t)`	`\exp(-\vert x-y\vert^{2}/(4t))`	Notation	x, y ∈ R^n: Das Quadrat eines Vektors und „/4t“ sind mehrdeutig; bitte prüfen.
192	344	◐	`\langle \phi,f \rangle = \lim_{t \to \infty}\langle T(t)f,\phi \rangle`	`\langle f,\phi \rangle = \lim_{t \to \infty}\langle T(t)f,\phi \rangle`	Notation	Die Argumente der Dualpaarung sind innerhalb derselben Formel vertauscht. Im Kapitel steht sonst meist ⟨f,ϕ⟩ (Z. 749, 1190, 1202), umgekehrt nur noch in Z. 312.
194	479	◐	`we have for all $f$.`	`we have for all $f$`	Satzzeichen	Der Punkt vor der abgesetzten Formel (3.2.9) unterbricht den Satz.
195	536	○	`\text{ and \ }`	`\text{ and }`	Abstand	Das überzählige „\ “ erzeugt einen doppelten Wortabstand.
196	567	○	`Eq.~\myeqpageref{eq:b3-2.12})`	`Eq.~\myeqpageref{eq:b3-2.13})`	Verweis	Die Rechnung davor benutzt die iterierte Form (3.2.13), nicht (3.2.12); bitte prüfen.
196	594	◐	`\eu^{-\alpha t}\eu^{\im\beta t}S_{h}^{-1}T(t)S_{h}`	`\eu^{-\alpha t}\eu^{-\im\beta t}S_{h}^{-1}T(t)S_{h}`	Tippfehler	Vorzeichen: Aus (i) mit λ = e^{iβt} folgt e^{iβt}T(t) = S_h^{-1}T(t)S_h, also der Faktor e^{-iβt}. Das passt auch zu iβ + A = S_h^{-1}AS_h (Z. 536); bitte prüfen.
196	610	◐	`for every $k \in \z$\,`	`for every $k \in \z$.`	Satzzeichen	Die Definition endet mit \, statt mit einem Punkt; ebenso Z. 2315 (`\ds\,` am Formelende in Prop. 3.4.8 (iv), dort Komma).

196	623	•	`of\/ $\im \R$ ,`	`of\/ $\im \R$,`	Satzzeichen	Leerzeichen vor dem Komma; ebenso Z. 789, 2298, 2301 („values , “), 2304.
196	635	◐	`M_{6} &= \cup_{n=0}^{\infty}\{`	`M_{6} &= \bigcup_{n=0}^{\infty}\{`	LaTeX	In einer abgesetzten Formel gehört hier das große \bigcup (wie in Z. 626); \cup ist das binäre Zeichen.
197	674	◐	`semigroup on $C(D)$ (which is given by`	`semigroup on $C(D)$ which is given by`	Klammern	Die öffnende Klammer wird nie geschlossen (die Formel in Z. 677 endet mit einem Punkt).
197	691	○	`(\eg $S = M$)`	`(\eg $S = -\im M$)`	Tippfehler	S ⊆ R, aber M ⊆ iR, also kann S = M nicht stimmen; bitte prüfen.
198	744	○	`T(t)\vert h\vert - \vert h\vert \geq 0`	`T(t)\vert h\vert - \vert h\vert \geq 0,`	Satzzeichen	Die abgesetzten Formeln (3.2.14) und (3.2.15) folgen ohne Satzzeichen und Bindewort aufeinander; Vorschlag: Komma und „and“ einfügen.
198	767	◐	`C_{0}(X\backslash M)`	`C_{0}(X\setminus M)`	Notation	\backslash statt der Mengendifferenz \setminus (sonst \setminus, z. B. Z. 2041, 2468); ebenso Z. 768 (`M\backslash N`).
199	781	○	`I_{1} \subsetneq \ldots \subsetneq I_{k}`	`I_{1} \subsetneq \cdots \subsetneq I_{k}`	LaTeX	Zwischen Relationszeichen gehören \cdots auf die Mittelachse; ebenso Z. 812 (`= \ldots =`).
199	803	•	`\frac{1}{2\pi i}`	`\frac{1}{2\pi\im}`	Notation	Kursives i statt \im (aufrechtes i).
199	827	◐	`Q_{m/} = \lim_{z \to 0}z^{m}R(z,A_{k})`	`Q_{m/I_{k-1}} = \lim_{z \to 0}z^{m}R(z,A_{k})`	Tippfehler	Der Index ist abgeschnitten (vgl. Z. 842 `Q_{1/I_{k-1}}`); ebenso Z. 835.
199	841	○	`{Q_{1}}_{/I_{k-1}}`	`Q_{1/I_{k-1}}`	Notation	Dasselbe Objekt steht in Z. 842 als `Q_{1/I_{k-1}}` und sieht im Druck anders aus; vereinheitlichen.
201	893	•	`$\ I_0$ & $I_2$ & $I_2$ & $I_3$`	`$I_0$ & $I_1$ & $I_2$ & $I_3$`	Tippfehler	Im Tabellenkopf steht I_2 doppelt, I_1 fehlt; außerdem steht ein überflüssiges \ vor I_0.
201	945	◐	`AQ = QA = s(A)A = 0`	`AQ = QA = s(A)Q = 0`	Tippfehler	Für das Residuum Q eines Pols 1. Ordnung gilt AQ = s(A)Q; bitte prüfen.
202	1016	○	`r_{\text{ess}}(T(t)) < r(T(t))`	`r_{\text{ess}}(T(t_{0})) < r(T(t_{0}))`	Tippfehler	Die Voraussetzung in Kor. 3.2.11 ist für t_0 formuliert; ebenso Z. 1015 (`\exp(s(A)t) = r(T(t))`); bitte prüfen.
203	1070	○	`all $\im k$, $k \in \Z$, $k \neq 0$`	`all $\im n$, $n \in \Z$, $n \neq 0$`	Notation	k ist in diesem Beispiel schon die Funktion k ∈ C_0(R) (Z. 1046, 1052), also doppelt belegt; dann auch e_k → e_n; bitte prüfen.
204	1146	◐	`Eq.~\myeqpageref{eq:b3-2.25} and Eq.~\myeqpageref{eq:b3-2.26}`	`Eq.~\myeqpageref{eq:b3-2.27} and Eq.~\myeqpageref{eq:b3-2.28}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Die Abschätzung folgt aus (3.2.27) und (3.2.28).
204	1162	•	`\{\alpha e_{\lambda} \colon a \in \C\}`	`\{\alpha e_{\lambda} \colon \alpha \in \C\}`	Tippfehler	Die Laufvariable heißt einmal α, einmal a.
204	1170	○	`\langle e_{\lambda},\phi \rangle`	`\phi(e_{\lambda})`	Notation	Im selben Satz und in (3.2.30) steht φ(e*λ), hier* ⟨e*λ*,φ⟩; vereinheitlichen.
206	1293	◐	`satisfy $T \neq \{0\}$ and $T \subseteq`	`satisfies $I \neq \{0\}$ and $I \subseteq`	Tippfehler	Schon in der Arbeitsliste. Zweimal T statt I.
206	1302	◐	`\langle f_{0},T(t)'\delta_{y} \rangle > 0`	`\langle f_{0},T(t)'\delta_{y} \rangle = 0`	Tippfehler	Die Träger sind disjunkt (Z. 1301), also = 0; nur so folgt „y ∉ …“; bitte prüfen.
						Klammern unausgeglichen (4

206	1306	•	`(T(t_{0})(f)(y)`	`(T(t_{0})f)(y)`	Klammern	öffnende, 3 schließende).
206	1315	◐	`\ref{item:b3-3.1-v} $\implies$~\ref{item:b3-3.1-vi}`	`\ref{item:b3-3.1-v} $\implies$~\ref{item:b3-3.1-iv}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Gedruckt steht „(e) ⇒ (f)“, gezeigt wird (e) ⇒ (d).
206	1320	◐	`Part-I, Example~\ref{subsec:a1-3.3}`	`Part-I, Section~\ref{subsec:a1-3.3}`	Verweis	Ziel ist der Unterabschnitt „The Subspace Semigroup“ in „Standard Constructions“. Unterabschnitte werden sonst mit „Section“ zitiert (Z. 329, 1857).
207	1352	○	`(1 - R(\lambda,A)M_{h})^{-1}`	`(\Id - R(\lambda,A)M_{h})^{-1}`	Notation	Die Identität steht sonst als \Id (Z. 1135–1143); ebenso Z. 1354, 2058.
208	1388	◐	`\bigcup_{t>0}\text{supp}\{k(t,x,.)\}`	`\bigcup_{t>0}\supp k(t,x,\cdot)`	Notation	Makro \supp statt \text{supp} verwenden; Platzhalter als \cdot (vgl. Z. 1708); die Mengenklammern um die Funktion sind überflüssig.
208	1404	○	`C([0,1])`	`C[0,1]`	Notation	Sonst C[0,1] bzw. C[-1,0] (Z. 673, 1104); ebenso Z. 127 (`C(\left[0,1\right])`).
209	1435	•	`\dim(\Kern{s(A) - A} \leq 1`	`\dim(\Kern{s(A) - A}) \leq 1`	Klammern	Nach \Kern{…} fehlt die schließende Klammer.
209	1435	◐	`(\cf Theorem~\ref{thm:b3-1.6}), then`	`(\cf Theorem~\ref{thm:b3-1.6})), then`	Klammern	Schon in der Arbeitsliste. Die Klammer „(\eg if …“ wird nicht geschlossen.
211	1558	•	`A + i(\beta - \alpha)`	`A + \im(\beta - \alpha)`	Notation	Kursives i statt \im; ebenso Z. 1562.
211	1564	○	`\im (\beta - \alpha) \in P\sigma(A)`	`\im (\alpha - \beta) \in P\sigma(A)`	Tippfehler	Aus Kern(A + i(β−α)) ≠ {0} folgt der Eigenwert −i(β−α) = i(α−β); bitte prüfen.
211	1590	◐	`$h\cdot p_{n}(h)$`	`$h\cdot p_{n}(\tilde{h})$`	Tippfehler	Das Polynom wird auf h̃ angewandt (Z. 1587); ebenso Z. 1598, 1600.
211	1595	○	`k=0,1,2,\ldots`	`k=1,2,3,\ldots`	Tippfehler	h^{[k]} (k ≥ 1) liegt in Kern(ikα − A). Mit k = 0 verschwindet ϕ nicht auf dem Span (vgl. Z. 1597); bitte prüfen.
212	1666	○	`|j(f)| > \epsilon|f|`	`|j(f)| \geq \epsilon|f|`	Tippfehler	Die strikte Ungleichung ist für f = 0 falsch; bitte prüfen.
213	1726	◐	`P\sigma(A)\cap(s(A) + \im\R) = \{s(A)\}`	`P\sigma(L)\cap(s(L) + \im\R) = \{s(L)\}`	Notation	Der Operator heißt in (ii) L (vgl. Z. 1742 s(L)); ebenso Z. 1773 (A in Teil (iii)), bitte prüfen.
213	1729	◐	`0 < f \in C_{0}(X)`	`0 < f \in C_{0}(\Omega)`	Notation	Grundraum ist hier Ω.
213	1739	◐	`(see Definition~\ref{def:b3-3.1}\,(e))`	`(see Definition~\ref{def:b3-3.1}\,(e)).`	Satzzeichen	Am Absatzende fehlt der Satzpunkt.
214	1746	•	`L_{0}h = i \alpha h`	`L_{0}h = \im\alpha h`	Notation	Kursives i statt \im.
214	1757	◐	`w_{i}'~,\\`	`w_{i}',\\`	LaTeX	Die Tilde im Mathemodus erzeugt Leerraum vor dem Komma; ebenso Z. 1758, 1765 (`~.`).
214	1765	○	`\sum_{ij} a_{ij}w_{i}'w_{j}'`	`\sum_{i,j} a_{ij}w_{i}'w_{j}'`	Notation	In (3.3.14) steht \sum_{i,j}; ebenso Z. 1768.
215	1820	•	`\lambda \in \{ \sigma(A) \colon \Re(\lambda) < s(A)\}`	`\{\lambda \in \sigma(A) \colon \Re(\lambda) < s(A)\}`	Notation	Die Mengenschreibweise ist verdreht.
215	1835	◐	`[$1^{st}$ part of the proof]`	`[First part of the proof]`	Mathemodus	„st“ steht kursiv im Mathemodus; alternativ `1\textsuperscript{st}` .
215	1866	○	`Example~\ref{ex:b3-2.6}(vi)`	`Example~\ref{ex:b3-2.6}\,(vi)`	Abstand	Sonst steht \, vor der Teilnummer; ebenso Z. 2249 (`\ref{prop:b3-4.8}(i)`).

216	1879	○	`\phi = (\phi_{t}): \R_{+} \times K \to K`	`\phi = (\phi_{t}) \colon \R_{+} \times K \to K`	Notation	Der Abbildungsdoppelpunkt ist sonst \colon (z. B. Z. 1366); ebenso Z. 2207, 2278, 2282.
218	2029	◐	`By the definition given in Eq.~\myeqpageref{eq:b3-4.1}`	`By the definition given in Eq.~\myeqpageref{eq:b3-4.4}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. c_t(h,ϕ) ist in (3.4.4) definiert.
219	2058	○	`(A - \lambda)g_{n} = (1 - \eu^{-\lambda(n+1)}T(n+1))f_{n}`	`(\lambda - A)g_{n} = (\Id - \eu^{-\lambda(n+1)}T(n+1))f_{n}`	Tippfehler	Vorzeichen: (λ − A)∫_0^s e^{-λt}T(t)f dt = (Id − e^{-λs}T(s))f; bitte prüfen.
219	2063	○	`\dt \right\vert \geq\]`	`\begin{multline*} … \end{multline*}`	LaTeX	Die Abschätzungskette ist auf vier getrennte … verteilt (Z. 2063–2071), die erste Zeile endet mit „\geq“; besser eine mehrzeilige Umgebung.
219	2065	◐	`\left\vert \eu^{-\lambda t}\vert h_{t}(y_{n})f_{n}(\phi(t,y_{n}))\right\vert`	`\left\vert \eu^{-\lambda t}h_{t}(y_{n})f_{n}(\phi(t,y_{n}))\right\vert`	Klammern	Überzähliger Betragsstrich nach e^{-λt}.
219	2075	•	`1/2\epsilon \cdot\left(\eu^{\epsilon n} - \eu^{\epsilon(n-1)})\right)`	`1/(2\epsilon)\cdot\left(\eu^{\epsilon n} - \eu^{\epsilon(n-1)}\right)`	Klammern	Vor \right) steht eine überzählige „)“; außerdem ist „1/2ε“ mehrdeutig (vgl. 1/ε in Z. 2070).
219	2093	◐	`R{\sigma}(A_{/})`	`R\sigma(A_{/I_{\infty}})`	Notation	Der Index ist abgeschnitten (vgl. Z. 2097 `A_{/I_{\infty}}`); ebenso Z. 2094.
219	2102	•	`\lambda = a + \im\beta$, $\alpha,\beta \in \R`	`\lambda = a + \im\beta$, $a,\beta \in \R`	Tippfehler	α statt a (vgl. Z. 2036).
219	2102	◐	`|f| = |f(\phi(\tau,x_{f}))|`	`|f| = \vert f(\phi(\tau,x_{f}))\vert`	Notation	Gemeint ist der Betrag einer Zahl, nicht eine Norm.
220	2115	•	`\underbar{c}(h,\phi)`	`\underline{c}(h,\phi)`	Notation	\underbar (Textbefehl) statt \underline wie sonst; der Strich sitzt im Druck sichtbar anders.
220	2115	◐	`\exp(\underbar{c}(h,\phi)-2\epsilon)`	`\exp((\underline{c}(h,\phi)-2\epsilon)\tau)`	Tippfehler	Für λ ∈ H_{2ε} hat e^{λτ} den Betrag e^{aτ}, der Faktor τ fehlt vermutlich; bitte prüfen.
220	2147	◐	`$(a)\implies(b)$`	`(a)~$\implies$~(b)`	Mathemodus	Die Teilbezeichnungen (a), (b) stehen kursiv im Mathemodus, sonst aufrecht (vgl. Z. 1292); ebenso Z. 2149.
220	2153	○	`\phi\vert_{K_{\infty}}`	`\phi_{\vert K_{\infty}}`	Notation	Die Einschränkung von ϕ steht sonst als `\phi_{\vert K_{\infty}}` (Z. 2018, 2021, 2091, 2215).
221	2254	○	`(see Proposition~\ref{prop:b3-4.8}\,(i))`	`(see Proposition~\ref{prop:b3-4.8}\,(ii)–(v))`	Verweis	Teil (i) betrifft die rechte Halbebene (so schon in Z. 2249); die Teilantwort für den Mittelstreifen liefern (ii)–(v); bitte prüfen.
222	2276	◐	`\eu^{\mathcal{\im\omega}}`	`\eu^{\im\omega}`	LaTeX	Überflüssiges \mathcal.
222	2283	◐	`corresponding to $\phi$ and $h$`	`corresponding to $\tilde{\phi}$ and $h$`	Notation	Der Fluss wurde in Z. 2280 als \tilde{\phi} eingeführt.
223	2352	◐	`\exp(-(h^{\star}+\im\beta)t)`	`\exp(-(\hat{h}+\im\beta )t)`	Tippfehler	h^⋆ statt ĥ (vgl. Z. 2348, 2371).
224	2371	◐	`& {= \frac{1}{n}\int_{0}^{n}`	`&= \frac{1}{n}\int_{0}^{n}`	Abstand	Die geschweifte Klammer um „= …“ unterdrückt den Abstand vor dem Gleichheitszeichen; ebenso Z. 2372.
225	2424	◐	`f(\phi(t,x)) \dt = \\`	`f(\phi(t,x)) \dt \\`	LaTeX	Das Gleichheitszeichen steht doppelt (am Zeilenende und am Anfang der nächsten Zeile); ebenso Z. 2425.
226	2484	○	`\im\cdot 2\pi k/\tau_{x} \colon x \in X, 0 < \tau_{x} < \infty`	`\im\cdot 2\pi k/\tau_{x} \colon k \in \Z, x \in X, 0 < \tau_{x} < \infty`	Notation	Der Laufbereich von k fehlt (vgl. Z. 2449).

226	2537	◐	`Example~\ref{ex:b3-3.4}\,(iii)`	`Example~\ref{ex:b3-2.14}\,(ii)`	Verweis	Section 4.3 behandelt retardierte Gleichungen, 3.3.4 (iii) ist dagegen die erste Ableitung. Gemeint ist vermutlich Beispiel 3.2.14 (ii) (Notes zu Section 2, vgl. Remark 3.2.15 (iv)) oder 3.3.4 (iv); bitte prüfen.
226	2541	◐	`as defined in~\ref{def:b3-3.1}`	`as defined in Definition~\ref{def:b3-3.1}`	Verweis	Die Bezeichnung fehlt, gedruckt wird nur „3.3.1“.
226	2547	○	`(more general than Example~\ref{ex:b3-3.4}\,(ii))`	`(more general than Example~\ref{ex:b3-3.4}\,(v))`	Verweis	3.3.4 (ii) behandelt Kernoperatoren, elliptische Operatoren stehen in (v)/(vi) bzw. in Beispiel 3.3.10 (ii); bitte prüfen.

Teil II, Kap. 4 – Asymptotics of Positive Semigroups on $C_0(X)$ (`part-b/chap-b4.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
231	14	◐	`Part-I, Chapter~\ref{chap:a1} and Chapter~\ref{chap:b2}`	`Part-I, Chapter~\ref{chap:a3} and Chapter~\ref{chap:b3}`	Verweis	„results … on the spectrum of the generator“: die Spektraltheorie steht in Kap. 3 (a3/b3), nicht in a1 (Basic Results) bzw. b2 (Characterization); bitte prüfen.
232	65	•	`P\sigma(A')$ , and`	`P\sigma(A')$, and`	Abstand	Leerzeichen vor Komma nach Formel; ebenso Z. 270 (`C_{0}(X)''$ ,`), 1462 und 1464 (`\lambda$ , then`).
232	76	◐	`from Section~\ref{subsec:a3-4.4}`	`from Part-I, Section~\ref{subsec:a3-4.4}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Ziel ist der Part-I-Unterabschnitt „Spectrum of the adjoint semigroup“; Präfix „Part-I,“ fehlt, Ziel bitte prüfen.
232	77	◐	`$(c) \Rightarrow (a)$`	`(c)~$\Rightarrow$~(a)`	Notation	Aufzählungslabels sind aufrecht (\upshape), im Mathemodus erscheinen sie kursiv; im Fließtext sonst aufrecht („condition (c)“, Z. 647). Ebenso Z. 622, 632, 652, 663, 667, 815, 817, 819, 824, 940 (`$(i)$`, `$(ii)$`), 1569, 1571.
232	133	◐	`\C\backslash\{0\}`	`\C\setminus\{0\}`	Notation	Mengendifferenz uneinheitlich: \backslash hier, \setminus (= \smallsetminus) in Z. 1667; ebenso Z. 140, 757, 758.
232	151	•	`\dot{r} &= 1 - r~,`	`\dot{r} &= 1 - r,`	LaTeX	Tilde im Mathemodus erzeugt sichtbaren Zwischenraum; ebenso Z. 1284 (`(0)~\in~F`), 1408 (`\lambda~>~|\Phi|+w`), 1466 (`B~+~\Phi_{\lambda'})~\neq~\emptyset`).
232	204	◐	`\langle f,\mu \rangle \,=\, \eu^{\im\alpha t}\langle f,T(t)'\mu \rangle`	`\langle f,\mu \rangle \,=\, \eu^{-\im\alpha t}\langle f,T(t)'\mu \rangle`	Tippfehler	Aus $T(t)'\mu = \eu^{\im\alpha t}\mu$ folgt der Faktor $\eu^{-\im\alpha t}$ (so auch Z. 210); betrifft beide Faktoren der Zeile; bitte prüfen.
232	240	○	`thus \,$R(\lambda,A)'^2E'`	`thus $R(\lambda,A)'^2E'`	Abstand	\, vor der Formel vergrößert den Wortabstand sichtbar.
234	263	◐	`Part-I, Definition~\ref{def:a2-1.11}`	`Part-I, Proposition~\ref{prop:a1-1.11}`	Verweis	Definition 2.1.11 definiert holomorphe Halbgruppen; die benutzte Darstellung von $R(1,A^*)^{n+1}$ als Integral steht in Prop. 1.1.11, Eq. (1.1.7) (eq:a1-1.7); bitte prüfen.
235	273	◐	`\int_0^{\infty} \langle T(t)^*\phi,\rho \rangle \dt`	`\int_0^{\infty} \langle T(t)^*\phi,\rho \rangle \dt .`	Satzzeichen	Satzende nach abgesetzter Formel, Punkt fehlt (nächster Satz beginnt mit „Since“); ebenso Z. 541 (`\lambda_1 = r` → `\lambda_1 = r .`, danach „Now …“).
235	313	•	`for r > 0.`	`for $r > 0$.`	Mathemodus	Variable und Relation ohne Mathemodus.
235	318	◐	`\int_0^{\infty} |T(t)\mu| \dt`	`\int_0^{\infty} |T(t)^*\mu| \dt`	Tippfehler	Stern fehlt, vgl. Z. 311 und linke Seite derselben Formel.
235	345	○	`|T(t)'\mu_n|`	`|T(t)^*\mu_n|`	Notation	In Z. 331 und 337 steht $T(t)^*\mu_n$, hier und Z. 346 $T(t)'\mu_n$; vereinheitlichen.
235	352	◐	`t \to |T(t)'\mu|`	`t \mapsto |T(t)'\mu|`	Notation	Abbildungsvorschrift, sonst \mapsto (z. B. Z. 864).
						Prop. 3.4.4 (F-Produkt) hat nur (i), (ii); $\omega_0(A)$

235	354	◐	`Part-I, Proposition~\ref{prop:a3-4.4}\,(iii)`	`Part-I, Section~\ref{subsec:a3-4.4}\, (iii)`	Verweis	$= \omega_0(A^*)$ steht als (iii) im Unterabschnitt „Spectrum of the adjoint semigroup" (subsec:a3-4.4); bitte prüfen.
237	412	•	`\exp((\epsilon +\Re(\lambda_m))t) \text{ for } t \geq 0, \epsilon >0\\`	`\exp((\epsilon +\Re(\lambda_m))t)\\`	Tippfehler	„for t ≥ 0, ε > 0" steht doppelt (Z. 412 und 413).
237	434	○	`\{z \in \sigma(T(t_{0})) :`	`\{z \in \sigma(T(t_{0})) \colon`	Notation	Sonst \colon in Mengenschreibweise (z. B. Z. 423); „:" ergibt anderen Abstand.
237	439	•	`\sigma(T(t_{0})_{\vert \Kern{P}} \subseteq`	`\sigma(T(t_{0})_{\vert \Kern{P}}) \subseteq`	Klammern	Schließende Klammer zu $\sigma($ fehlt.
237	455	◐	`f \in P_n E`	`f \in P_n G`	Notation	Theorem 4.2.1 spricht vom Banachraum G, der Beweis benutzt E; ebenso Z. 456 (`E = P_n E`).
237	455	○	`P_n E = \ker(\lambda_n-A)`	`P_n E = \ker(\lambda_n-A)^{k(n)}`	Tippfehler	Bild des Residuums ist der verallgemeinerte Eigenraum (vgl. Z. 458: $(\lambda - A)^k = 0$); bitte prüfen.
237	482	•	`follows from Eq.~\myeqpageref{eq:a2-1.3}`	`follows from Part-I, Eq.~\myeqpageref{eq:a2-1.3}.`	Satzzeichen	Satzpunkt am Beweisende fehlt; zudem Part-I-Gleichung ohne „Part-I," (vgl. auskommentierte Fassung Z. 501).
238	529	○	`Proposition~\ref{prop:b3-3.5}(i)`	`Proposition~\ref{prop:b3-3.5}\,(i)`	Abstand	Sonst überall `\,(i)` nach \ref.
239	589	◐	`C(K) \not\subseteq B(K) \not\subseteq C(K)''`	`C(K) \subsetneq B(K) \subsetneq C(K)''`	Tippfehler	$B(K)$ wird unmittelbar davor als Teilraum von $C(K)''$ identifiziert; gemeint sind wohl echte Inklusionen; bitte prüfen.
239	605	○	`R''(\1_C) \in G$,`	`R''(\1_C) \in G$.`	Satzzeichen	Letzter Punkt der Aufzählung endet mit Komma, danach beginnt ein neuer Satz („In case …").
239	647	○	`$\{R'y' \colon y' \in G'$, $\|y'\| \leq 1\}$`	`$\{R'y' \colon y' \in G',\ \|y'\| \leq 1\}$`	LaTeX	Mengenklammer auf zwei Formeln verteilt ({ und } in getrennten …, über Z. 647/648); ebenso Z. 662.
241	713	◐	`P_t(x,.)`	`P_t(x,\cdot)`	Notation	Punkt als Platzhalter; sonst \cdot (z. B. Z. 555 `T(\cdot)f`); ebenso Z. 716 (`P_t(.,C)`), 770.
242	807	○	`\omega_{\text{ess}}(\TT)`	`\omega_{\mathrm{ess}}(\TT)`	Notation	In der kursiven Proposition wird \text{ess} kursiv gesetzt, im Fließtext (Z. 797, 821) aufrecht.
242	846	○	`\text{exp}(-\omega_{0}(\TT)t)`	`\exp(-\omega_{0}(\TT)t)`	LaTeX	Sonst \exp (z. B. Z. 937).
243	893	○	`nonneg<U+00AD>ative`	`nonnegative`	LaTeX	Unsichtbares weiches Trennzeichen (U+00AD) im Quelltext.
243	895	◐	`k_1, \dots, k_m`	`k(1), \dots, k(m)`	Notation	Polordnungen in Eq. (4.2.1) als $k(n)$, in Theorem 4.2.10 als k_n; ebenso Z. 899 (`k_n - 1`).
244	899	•	`e^{\lambda_n t}`	`\eu^{\lambda_n t}`	Notation	Kursives e; im Kapitel sonst \eu bzw. \exp.
244	910	•	`\omega_{ess}(\TT) < 0$, hence $r_{ess}(T(1))`	`\omega_{\text{ess}}(\TT) < 0$, hence $r_{\text{ess}}(T(1))`	Notation	„ess" als kursives Produkt gesetzt; sonst \text{ess}.
244	914	○	`P = P_1+P_2+ \ldots +P_m`	`P = P_1 + P_2 + \dots + P_m`	Notation	Grundlinienpunkte zwischen Operationszeichen; sonst \cdots bzw. \dots (Z. 409, 898).
245	1008	◐	`\alpha g(0)`	`\alpha g_r(0)`	Tippfehler	Index r fehlt.
245	1018	•	`m(z) \, dz`	`m(z) \,\diff{z}`	Notation	Kursives d; sonst \diff (vgl. Z. 1014). Ebenso Z. 1292 (`\frac{d}{ds}`) und 1758 (`\frac{d}{dt}`) → `\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}` usw.
246	1039	•	`\begin{equation*}\label{eq:b4-2.12}`	`\begin{equation}\label{eq:b4-2.12}`	Verweis	\label in equation* ohne \tag übernimmt die Nummer der Proposition (4.2.13); der Verweis Z. 1818 „Eq. (4.2.13)" zeigt auf keine Gleichung. Alternativ in Z. 1818 auf Proposition~\ref{prop:b4-2.13} verweisen.
247	1143	◐	`\textit{if }`	`\text{if }`	Notation	In (T) (Z. 1126) und Z. 1221 aufrechtes „if"; ebenso Z. 1144.
247	1145	•	`\end{cases}\quad, \quad`	`\end{cases}, \quad`	Abstand	Geviert vor dem Komma; vgl. Z. 1128.

249	1257	◐	`\dot{w}(0) = \dot{w}(t)`	`\dot{w}_t(0) = \dot{w}(t)`	Tippfehler	Für $x(t) \in D(A)$ wird die Ableitung von w_t an der Stelle 0 gebraucht; bitte prüfen.
251	1355	◐	`\Phi(e_\lambda \otimes x)`	`\Phi(\epsilon_\lambda \otimes x)`	Notation	Die Funktion $s \mapsto \eu^{\lambda s}$ ist in Z. 1157 als ϵ_λ eingeführt und wird so verwendet (Z. 1391, 1408, 1592); ebenso Z. 1380 (`e_\mu`), 1789 (`e_{\lambda}`).
251	1355	◐	`\Phi(e_\lambda \otimes x) \, , \, x \in F \, .`	`\Phi(e_\lambda \otimes x), \quad x \in F .`	Abstand	Schmaler Abstand vor Komma und Punkt; ebenso Z. 1605 und 1606 (`\, , \ &&`), 1619 (`0\, ,`).
252	1422	•	`supp$(f) \subseteq [-\delta,0])$`	`$\operatorname{supp}(f) \subseteq [-\delta,0]$)`	Mathemodus	„supp“ außerhalb des Mathemodus; die schließende Textklammer steht im Mathemodus.
253	1441	•	`0 \leq R(t, B +\Phi_\mu) \leq R(t,B+\Phi_\mu)`	`0 \leq R(t, B +\Phi_\mu) \leq R(t,B+\Phi_\lambda)`	Tippfehler	Beide Seiten identisch; aus $\Phi_\mu \leq \Phi_\lambda$ folgt die Abschätzung durch die von $B+\Phi_\lambda$ erzeugte Halbgruppe (vgl. Z. 1444f.); bitte prüfen.
253	1482	•	`Theorem~\ref{thm:c3-1.1}.\, (i)`	`Theorem~\ref{thm:c3-1.1}\, (i)`	Satzzeichen	Schon in der Arbeitsliste. Überzähliger Punkt vor (i).
256	1645	○	`-\tau \leq t \leq 0 , \Psi \in C[-\tau,0]`	`-\tau \leq t \leq 0 ,\ \Psi \in C[-\tau,0]`	Abstand	Zu knapper Abstand nach dem Komma, vgl. Z. 1606 (`, \ \psi \in E`).
256	1665	•	`$Eq.~\eqref{eq:b4-3.9}$`	`Eq.~\eqref{eq:b4-3.9}`	Mathemodus	„Eq.“ im Mathemodus (kursiv, Tilde in der Formel).
257	1705	○	`\begin{equation}\label{eq:b4-3.11}`	`Label auf die Gleichung Z. 1698–1701 setzen`	Verweis	Das Label sitzt auf der Randbedingung; „solution (semigroup) of Eq. (4.3.11)“ in Z. 1727, 1735, 1740 meint aber das ganze Problem; bitte prüfen.
258	1753	○	`F = L^1([a,1])`	`F = L^1[a,1]`	Notation	Gleich danach (Z. 1763) $L^1[a,1]$, $AC[a,1]$, $C[a,1]$.
258	1759	◐	`u &= \Psi \in E.`	`u_0 &= \Psi \in E.`	Tippfehler	Anfangsbedingung betrifft das Historiensegment, vgl. Z. 1090, 1722.
258	1768	○	`[a,1/2(r+1)]`	`[a,(r+1)/2]`	Notation	Mehrdeutig (lesbar als $1/(2(r+1))$); ebenso Z. 1769.
258	1805	◐	`C*-algebras`	`\CA-algebras`	Notation	Sonst \CA (C^*), vgl. Z. 367.
258	1807	•	`\textcite[V.8.8]{schaefer:1974}.`	`\textcite[V.8.8]{schaefer:1974}).`	Klammern	Schließende Klammer zu „(see“ (Z. 1806) fehlt.
258	1811	◐	`Theorem~\ref{thm:b4-1.1} seems to be folklore`	`Theorem~\ref{thm:b4-2.1} seems to be folklore`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Notes zu Section 2; gemeint ist wohl Theorem 4.2.1.