Sea Nymph Sports Gras 6-2-8





Sea Nymph Sports Gras 6-2-8 +3 % MgO: Grobgranulierter, organisch-mineralischer Dünger mit hohem Humusund Aminosäurengehalt, seit Jahrzehnten erprobt auf Tees, Vorgrüns, Rasenwegen, Sportstadien und Sportplätzen und überall dort, wo nur höchste Pflanzenqualität zählt. Das ausgewogene Verhältnis an Huminstoffen, Aminosäuren, Nährstoffanteilen und verschiedenen Calziumarten führt zu einem konstanten Wachstum und erhöhter Strapazierfähigkeit.

Enthält Spurennährstoffe (B, Cu, Mn, I, Zn) unterhalb der Kennzeichnungsschwelle nach DümV.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

ACHTUNG!

H316: Verursacht leichte Hautreizungen
P332 + P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt aus Irland

Kennzeichnung nach irischem Recht Organisch-mineralischer NPK-Dünger 6-2-8 unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus aerober Behandlung und Düngemitteln.

Nettomasse:	20 kg
Eisen (Fe):	2,0 %
Magnesiumoxid (MgO):	3,0 %
Gesamtkaliumoxid (K ₂ O):	7,7 %
Gesamtphosphat (P ₂ O₅):	2,3 %
	1,4 %
	1,1 %
Nitratstickstoff:	
Gesamtstickstoff (N):	6,0 %

Inverkehrbringer:

Wöbking GmbH, Rheinstraße 36, 49090 Osnabrück

Ausgangsstoffe:

Pflanzliche Stoffe aus der Lebens-, Genuss-, & Futtermittelherstellung aus aerober Behandlung (Kompostierung), pflanzliche Stoffe aus Meeresalgen aus aerober Behandlung (Kompostierung), Stickstoffdünger, Phosphatdünger, Kaliumdünger, Kalkdünger, Sekundärnährstoffdünger.

Nebenbestandteile:

Schwefel (S):	2,5 %
Calziumoxid (CaO):	8,0 %
Organische Substanz:	30,0 9
Aminosäuren & Enzyme:	1,9 %
Fulvinsäure:	5,8 %
Huminsäure:	3,0 %

Hinweise zur sachgerechten Lagerung:

Trocken, Frostfrei in geschlossener Originalverpackung lagern. Vor direkter Sonne und Temperaturen über +40°C schützen. Von Kindern, Nahrungsmitteln, Tieren fernhalten. Lagerung: Es darf nicht zu Einträgen in Oberflächengewässer, Grund-/Abwasser kommen.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung:

Auf weitere abfallrechtliche, wasserrechtliche und düngerechtliche Vorschriften wird verwiesen.

Anwendungszeitraum

	ш	
Jan Geb ärz pril		6 X 6 8

Applikation

25 - 40 g/m

Wirkung

8 - 10 Wocher

Weitere Angaben:

Hinweis: Die Empfehlungen der amtlichen Beratung haben Vorrang.