

Fastfood Restorantlarındaki Ürünlerin Besin içeriği ve İnsan sağlığına Olan Etkilerinin Analizi

Uğur Oruç*

Özet

Bu çalışmada fastfood restorantlarının satmış olduğu fast food ürünlerinin kalori, toplam yağ, sodyum, trans yağ , şeker gibi besin içeriği değerleri incelenerek insan sağlığı üzerinde ne denli etkilerinin olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda literatür taraması yapılmış ve veri setindeki veriler baz alınarak grafikler oluşturulmuştur.veri seti t- testi uygulanarak bulgular desteklenmiş ve veriler analiz edilmiştir .

1 Giriş

Son zamanlarda hem lezzetli olması hem de pratik olması sebebiyle fastfood ürünleri özellikle günümüzde çok fazla rağbet görüyor. Bu nedenle günümüzde pek çok çeşit fastfood restorantı mevcuttur. Fastfood sistemi dünyada ilk kez Amerika’da McDonald kardeşlerin 1850’de Hamburg yöresinden gelen işçilerin tanıttığı hamburgeri temel alan fastfood sistemini 1950 yılında işletmeye açmaları ile başladığı söylenebilir(Elmacıoğlu, 1996). 1950’li yıllarda McDonald ile başlayan fastfood serüveni popülerleşerek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde ise binlerce çeşit fastfood restorantı vardır. Ayrıca bedenli popüler olmasının nedenleri arasında fastfood işletmelerinin popülerlik, standart lezzet ve kaliteye sahip olması ve fiziksel mekan özellikleri de büyük bir rol oynuyor(Adnan, t.y.).Bu yüzden günümüzde pek çok insan evde yemek yapmaya üşendiği veya pek vakti olmadığı için bu ürünleri sipariş vererek veya bizzat restoranta giderek tüketiyor. Yapılan araştırmalar doğrultusunda Amerika’da temizlik ve yemek yapma süreleri karşılaştırıldığında yemek yapma süresinin çok az olduğu tespit edilmiştir(Jaworowska vd., 2013). Çünkü Amerika’da fast food ürünleri insanlar tarafından çok tüketildiği için evde yemek yapma süresi çok azdır.Özellikle fastfood ürünlerinin en çok öğrenci grupları tarafından tercih edildiği belirlenmiştir.Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin büyük çoğunluğu fast-food tüketmektedir(ÖZTÜRK ve ONURLUBAŞ, t.y.).Ancak bu denli lezzetli ve pratik olan fastfood ürünlerinin besin içerikleri sebebiyle fazla tüketimi sonucu insan sağlığına ciddi zararları vardır.Tüketilen bu besinlerin miktarı ve bileşiminin kardiyovasküler hastalıklar, kanser, şişmanlık gibi birçok kronik hastalığın gelişmesine neden

*18080432, [Github Repo](#)

olduğu bilinmektedir(RAKICIOĞLU vd., 2000). Bu ürünlerin içermiş olduğu besin değerleri normal bir insanın alması gereken besin değerlerinin çok üstünde olmasının yanında bazı zararlı besin içeriklerini de barındırıyor olması fazla tüketimi sonucu insan sağlığını tehlikeye atıyor. Özellikle içeriğindeki yağ ve sodyum oranlarının yüksek olması pek çok hastalığın gelişimine etki ediyor.Bu ürünler diğer pek çok besin türlerinden daha fazla enerji, yağ ve sodyuma sahiptir(Wu ve Sturm, 2013). BU çalışmada fastfood ürünlerinin içermiş olduğu besin değerlerini ve insan sağlığına olan etkilerini analiz etmeye çalışacağım.

1.1 Çalışmanın Amacı

İnsan sağlığının kalitesi üzerinde tükettiği gıdalar çok büyük bir rol oynar. insan sağlığına faydalı içeriği olan besinleri yeterli oranda almak insan yaşamını olumlu etkilerken; fastfood gibi besin içeriği zararlı olan besinler de çok fazla tüketildiği taktirde insan yaşamını olumsuz etkiler. Yani insanların tüketmiş olduğu besinlerin içeriği ve değeri insan sağlığı ve kalitesi üzerinde çok önemli bir rol oynar. Github’da tidyverse adlı kullanıcının reposundan bulduğum, 515 gözlem ve 18 değişkeni içinde barındıran ve bazı fastfood restoranlarının ürünlerini ve besin içeriğini gösteren veri setiyle bu ürünlerin besin içeriklerini inceleyeceğim. Bu doğrultuda insan sağlığı için hangi fastfood ürünlerinin ne denli tüketilebileceğini veya tüketilmemesi gerektiğini aynı zamanda hangi restoranın ürünlerinin daha zararlı olduğunu veya tüketilebilir olduğunu bulabileceğiz. Veri setindeki ürünlerin içeriğini ve değerlerini inceleyip bu doğrultuda hem restoranları hem de ürünlerin insan sağlığına ne denli etkilerinin olacağını karşılaştırabileceğim bir analiz yapacağım.

1.2 Literatür

Bir nsanın sağlığını ve yaşam kalitesini belirleyen en önemli faktör tükettiği besinlerdir. Besinlerin birçok hastalığın gelişmesinde ve önlenmesinde önemli bir rol oynadığı iyi bilinmektedir(Jaworowska vd., 2013). Zararlı içeriği olmayan besinleri tüketen insanlar daha daha sağlıklı bir hayat sürer. Ancak sağlığı olumsuz etkileyebilecek çok az tüketilmesi ya da hiç tüketilmemesi gereken bazı besinler de tüketildiğinde çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.Bu zararlı besinlerin başında fastfoodlar gelir. Çok lezzetli ve pratik olmasının yanında kolay ulaşılabilir olması insanlar için tüketimi daha cazip bir hale geliyor.Ayrıca fastfood ürünlerinin fiyatlarında uygun olması da bu ürünleri çekici kılıyor(Adnan, t.y.). Ancak pek çok fastfood ürünü içerdiği zararlı maddeler yüzünden fazla tüketildiğinde insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle içerisindeki yüksek yağ ve sodyum, basit şekerler ve yüksek karbonhidratlar insan sağlığına ciddi zararlar veriyor. Fastfood sisteminin sodyum, kolesterol ve yağ (Özellikle doymuş yağ) tüketim miktarı fazla olmasına karşılık kalsiyum, A ve C vitamini ve posa içeriği bakımından yetersizdir(Elmacıoğlu, 1996). Özellikle fastfood çocuk menülerindeki özel içecekler diğer normal menüdeki içeceklere göre daha fazla yağ, doymuş yağ ve karbonhidrat içeriyor(Wu vd., 2013).Çocukların beslenmesinde diyetin sodyum içeriğinin düşük olması hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini ve böbrek solit yükünü azaltmaktadır(RAKICIOĞLU vd., 2000). Bu yüzden çocukların beslenmelerinde daha dikkatli olunması gerekir. Böylece okullarda bile düşük sodyum ve

düşük yağlı menüleri içeren beslenme programların uygulanması ve çocukların aralarda tükettikleri fastfood besinleri seçerken de daha bilinçli davranmaları konusunda eğitilmeleri gerekir(RAKICIOĞLU vd., 2000). Ayrıca fast-food ürünlerinin yanında ağırlıklı olarak gazlı içeceklerde tüketildiği için sağlığa daha da zararlı bir hale geliyor(ÖZTÜRK vd., t.y.).Yağ, sağlık için gereklidir ve günlük beslenmede mutlaka yeterli miktarda yağ bulunmalıdır. Ancak aşırı yağ tüketimi, şişmanlık, koroner kalp hastalıkları (KKH) ve çeşitli kanser oluşum riskini artırır(Yücecan, 2008) Aynı zamanda yağ açısından yüksek besinler daha yüksek bir obezite gelişme riskine yol açar(Jaworowska vd., 2013). Düşük yağlı ve düşük şekerli besinlerin tüketilmesi vücut ağırlığının kontrolü açısından da katkıda bulunmaktadır(RAKICIOĞLU vd., 2000). Aynı şekilde fazla sodyum hipertansiyona; kolesterol ve doymuş yağ asitleri ise kalp ve damar hastalıklarına neden olur(Elmacıoğlu, 1996). Bu yüzden besinler tüketilirken içeriğine çok dikkat edilmelidir. Ancak fastfood tüketen insanların büyük çoğunluğu fast-food tüketim alışkanlığının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşünmesine rağmen fast-food tüketiminin olumsuz etkilerine karşı gelecekte önlem almayı düşündüğü tespit edilen kişilerin sayısı bir hayli azdır (ÖZTÜRK vd., t.y.).Sağlıklı beslenmede öncelikle toplam yağ tüketiminin azaltılması, kolesterol alımının sınırlandırılması, orta derecede tuz tüketimi, sebze ve meyve tüketiminin artırılması, basit şekerlerin yerine kompleks karbonhidratların tüketilmesi önerilmektedir(RAKICIOĞLU vd., 2000).Yani mümkün oldukça optimal beslenmelidir.Optimal beslenmede;“minumum hastalık riski, maksimum iyi hal/sağlık” dolayısıyla maksimum sağlıklı yaşam” hedeflenmektedir(Yücecan, 2008).



2 Veri



```
library(tidyverse)
library(here)
dt <- read_csv(here("./data/dt.csv"))
```



Tablo 1: Özet İstatistikler

	Ortalama	Std.Sap	Min	Medyan	Mak
cal_fat	238.81	166.41	0.00	210.00	1270.00
calories	530.91	282.44	20.00	490.00	2430.00
cholesterol	72.46	63.16	0.00	60.00	805.00
sat_fat	8.15	6.42	0.00	7.00	47.00
sodium	1246.74	689.95	15.00	1110.00	6080.00
sugar	7.26	6.76	0.00	6.00	87.00
total_carb	45.66	24.88	0.00	44.00	156.00
total_fat	26.59	18.41	0.00	23.00	141.00
trans_fat	0.47	0.84	0.00	0.00	8.00

3 Yöntem ve Veri Analizi







```
##
## One Sample t-test
##
## data: dt$total_fat
## t = 8.1229, df = 514, p-value = 3.405e-15
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 20
## 95 percent confidence interval:
##  24.99637 28.18421
## sample estimates:
## mean of x
##  26.59029
##
```

```
## One Sample t-test
##
## data: dt$sugar
## t = 14.305, df = 514, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 3
## 95 percent confidence interval:
##  6.676809 7.847463
## sample estimates:
## mean of x
##  7.262136

##
## One Sample t-test
##
## data: dt$calories
## t = 0.00021062, df = 514, p-value = 0.9998
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 530.91
## 95 percent confidence interval:
##  506.4621 555.3632
## sample estimates:
## mean of x
##  530.9126

##
## One Sample t-test
##
## data: dt$sodium
## t = 0.024269, df = 514, p-value = 0.9806
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 1246
## 95 percent confidence interval:
##  1187.008 1306.467
## sample estimates:
## mean of x
##  1246.738
```

4 Sonuç

İncelenen makaleler doğrultusunda fastfood ürünlerinin fazla tüketiminin insan sağlığını obezite, çeşitli kalp ve damar rahatsızlıkları, kolesterol, şeker gibi hastalıkları tetikleyerek ciddi derecede tehlikeye attığı anlaşılmıştır. Bu ürünlerin içerisinde sağlığa faydalı besinler bulunmasına rağmen zararlı besinlerin daha çok olması bu ürünlerin tüketimi halinde insan sağlığını olumsuz etkilediği görülmüştür. Veri setindeki değerler de baz alınarak fastfood

restoranlarında satılan ürünlerin değerleri çeşitli grafikler ve testlerle analiz edilmiş olup içerisinde özellikle insan sağlığına en çok zarar veren trans yağ, toplam yağ, şeker , sodyum ve kalori değerleri üzerinde durulmuş ve bu değerleri en çok barındıran ürünler tespit edilmiştir. Bu değerler doğrultusunda aslında fastfood ürünlerini mümkün oldukça tüketmemek veya tüketimini minimum bir seviyede tutmak gerektiği anlaşılmıştır. Sağlıklı bir yaşam için kalori, trans yağ, sodyum, şeker gibi maddeleri içerisinde çokça barındıran fastfood ürünlerini tüketmek yerine bu değerleri en az seviyede barındıran ürünlerin tercih edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

5 Kaynakça

- Adnan, A. (t.y.). YERLİ VE YABANCI FASTFOOD ÜRÜNLERİNİN GENÇLERİN TERCİH NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 17(38), 1-24.
- Elmacioğlu, F. (1996). Hızlı hazır yemek sisteminde (fast-food) önceliklerin belirlenmesi. *Beslenme ve Diyet Dergisi*, 25(1), 30-34.
- Jaworowska, A., Blackham, T., Davies, I. G. ve Stevenson, L. (2013). Nutritional challenges and health implications of takeaway and fast food. *Nutrition reviews*, 71(5), 310-318.
- ÖZTÜRK, D. ve ONURLUBAŞ, E. (t.y.). Üniversite Öğrencilerinin Fast-Food Tüketim Alışkanlıklarının İncelenmesi. *Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi*, 11(3), 221-232.
- RAKICIOĞLU, N., TOPÇU, A. A. ve JAVIDIPOUR, I. (2000). Ankara'daki Bazı Fast-Food Restoranlarında Satılan Hamburgerlerin Besin Ögesi İçeriği Ve Beslenme Açısından Değerlendirmesi. *Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi*, 57(1), 7-12.
- Wu, H. W. ve Sturm, R. (2013). What's on the menu? A review of the energy and nutritional content of US chain restaurant menus. *Public health nutrition*, 16(1), 87-96.
- Yücecan, S. (2008). Optimal beslenme. *Sağlık Bakanlığı Yayın*, 726, 2-4.