

서울대학교병원마인드바디센터The SHIM

신체 조절하기 프로그램 워크북

신체조절 프로그램 서약서

▶ 프로그램의 목적과 진행

1. 이 프로그램은 트라우마 경험자의 심리적 고통을 완화하고 신체적 안정을 도모하는 기술을 습득하도록 돕는 것을 목적으로 합니다.
2. 총 4번의 구조화된 회기가 예정되어 있고, 필요에 따라 추가 회기를 진행할 수 있습니다.
3. 프로그램 내에서 이루어진 내용은 모두 비밀이 보장되며, 전문가 자문 및 연구와 같은 예외 상황에는 반드시 내담자의 동의를 구하도록 하겠습니다. 단, 자신이나 타인의 생명이 위협되는 경우에는 예외입니다.
4. 상담의 질 향상 및 추후 상담 계획, 증거자료 보존을 위해 동의 하에 프로그램 내용을 녹취할 수 있습니다.
5. 증상 호전이나 기타 사유로 참여 중단을 원할 경우 치료자와 논의하고 종결 여부를 결정합니다.

▶ 프로그램에 참여하는 방법

1. 관찰자가 아닌 능동적 참여자가 되어 프로그램에 참여하고 자신의 경험을 표현해 봅니다.
2. 자신이나 타인을 규정짓기보다는 열린 마음을 가지고 나와 타인을 있는 그대로 바라봅니다.
3. 다른 사람들에게 선불리 충고, 조언하거나 다른 사람을 판단, 평가하지 않습니다. 내 안에서 올라오는 생각들이나 도움을 주고 싶은 마음을 표현하는 것이 도움이 됩니다.
4. 집단에서 이루어진 어떤 것이라도 집단 밖에서 화제로 삼지 않습니다. 이것은 집단의 안전과 운영에 심각한 위기를 초래할 수 있습니다.
5. 나를 발견하고 성장하고자 참여한 여러분 자신에게 격려의 박수를 쳐줍니다.

나 _____은/는 신체조절 프로그램에 적극적으로 협조하며 참여하면서 상담 약속을 준수할 것을 서약합니다.

년 월 일

대상자: (서명)

상담자: (서명)

신체조절 프로그램의 과정

※ 본 프로그램은 국가트라우마센터에서 개발된 트라우마 치유 프로그램인 《마음프로그램》을 기초로 하여 제작되었습니다.

회기	회기명	주제	내용
1	흔적으로 남은 트라우마: 트라우마 이해하기	트라우마 심리교육	- 트라우마로 발생할 수 있는 정상 반응과 관련 증상을 이해한다. - 트라우마와 관련하여 내가 경험하고 있는 반응을 탐색한다.
2	나는 안전하다: 통제능력 회복하기	기본 안정화 1 : 신체 및 상황에 대한 통제능력 회복	- 긴장 상태에 대한 감각을 키우고, 지나치게 긴장된 근육을 이완하는 능력을 기른다. - 스트레스 상황과 이로 인한 불편한 기분을 조절하도록 돕는 대처자원을 개발한다.
3	나는 이곳에 있다: 지금 여기로 돌아오기	기본 안정화 2 : 지금-현재에 대한 마음챙김 및 착지	- 나는 지금 여기에 있음을 인지한다. - 나의 몸을 스스로 통제할 수 있음을 안다.
4	삶은 계속된다: 미래를 바라보기	자원 강화 및 긍정성 증진	- 현재와 미래 상황을 긍정적인 관점으로 조망한다. - 프로그램 전과 비교하여 달라진 점을 돌이켜보고, 나의 대처능력에 대한 자신감을 갖는다.

척도 소개

앞으로의 프로그램에서 우리는 매 회기마다 현재의 불편감과 우울, 불안 수준의 점수를 매길 것입니다. 이를 통해 주관적으로 ‘좋아졌다’, ‘나빠졌다’고 느끼는 것이 아니라 객관적인 수치 변화를 확인할 수 있게 됩니다. 이 프로그램의 마지막 시간에 이 수치의 변화를 함께 그래프로 그려 확인해볼 것입니다. 되도록 성실하게 응답해 주시기 바랍니다.

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 어느 정도 수준인가요?

불편한 상황	불편감 점수	나의 상황
매우 고통스러운 상태로 어지럽고 정신을 잃을 것 같다.	100	
울고 싶고 불안하며, 내 자신을 조절하기 어렵다.	75	
마음이 불편하지만 어느 정도 참을 수 있다.	50	
비교적 편안하다. 마음이 다소 불안하더라도 저절로 금세 진정된다.	25	
불안감이나 몸의 긴장이 전혀 없다.	0	

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 1. 흔적으로 남은 트라우마 : 트라우마 이해하기

이번 회기 우리의 목표

- 트라우마로 발생할 수 있는 정상 반응과 관련 증상을 이해한다.
- 트라우마와 관련하여 내가 경험하고 있는 반응을 탐색한다.

어디까지 왔나요?

트라우마 이해하기	통제능력 회복하기	지금 여기로 돌아오기	미래를 바라보기
--------------	--------------	----------------	-------------

정신적 외상 경험은 흔적을 남긴다.
그 흔적은 범위가 아주 방대할 수도 있고, 가족에게 밀접한 영향을 줄 수도 있으며,
어두운 비밀로 존속해 여러 세대를 거쳐 알게 모르게 전해지기도 한다.
그러한 경험들은 마음과 감정에도 흔적을 남기고, 즐거움과 친밀감을 느끼는 능력에도 영향을 주며,
심지어 생물학적인 특성과 면역 체계에도 자국을 남긴다.

- 베셀 반 데어 코크, 《몸은 기억한다》

1. 트라우마란?

트라우마는 어떤 사람의 몸과 마음이 감당할 수 있는 수준을 넘어서는 사건을 겪는 것을 말합니다.
트라우마 사건이란 재난, 사고, 전쟁, 성폭행, 폭력 등과 같은 충격적인 일들을 말합니다.



2. 트라우마 경험 후 생길 수 있는 변화

트라우마를 경험한 사람들은 다양한 신체적 반응, 감정, 생각 및 행동의 변화를 겪을 수 있습니다. 다음 속담의 의미를 생각해 볼까요?

“자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다.”

“구더기 무서워 장 못 담근다.”

“종로에서 뺨 맞고 한강 가서 눈 흘긴다.”

이러한 반응은 지극히 정상적이고 자연스러운 것입니다. 트라우마 이후 여러 변화를 경험하는 것은 결코 그 사람이 나약해서가 아닙니다.

아래 변화 중 나에게 해당하는 것이 있다면 체크해 봅시다.



신체적 반응의 변화

- ☐ 피로감
- ☐ 메스꺼움(토할 것 같은 느낌)
- ☐ 발한 또는 오한
- ☐ 쇼크
- ☐ 현기증
- ☐ 흉통
- ☐ 호흡곤란
- ☐ 무감각



감정적 변화

- ☐ 긴장감
- ☐ 두려움
- ☐ 슬픔
- ☐ 우울감
- ☐ 절망
- ☐ 무력감
- ☐ 분노
- ☐ 과민하고 예민한 느낌
- ☐ 압도되는 느낌
- ☐ 죄책감
- ☐ 취약함(쉽게 영향 받고 상처받는 상태)



생각의 변화

- ☐ 미래가 단절될 것 같다는 생각
- ☐ 결정 내리기 어렵고 혼란스러운 느낌
- ☐ 기억력 저하
- ☐ 집중력 저하
- ☐ 외상경험이 다시 생생하게 떠오름
- ☐ 악몽
- ☐ 거슬리거나 반갑지 않은 생각
- ☐ 트라우마의 원인 또는 결과에 대하여 자신 또는 타인을 비난함
- ☐ 한 번에 너무 많은 생각
- ☐ 자살사고
- ☐ 기억의 단절



행동의 변화

- ☐ 깜짝 놀람
- ☐ 과잉 경계
- ☐ 타인으로부터 고립되려 함
- ☐ 타인에게 지나치게 의존함
- ☐ 식욕과 수면의 변화
- ☐ 약물 남용 (알코올, 약물) 증가
- ☐ 정서적 또는 신체적 친밀감 문제
- ☐ 아무도 믿지 못하거나 사랑의 감정을 갖지 못함
- ☐ 감정이 없는 느낌
- ☐ 영성 상실
- ☐ 위험을 감수하는 행동들
- ☐ 자살 충동 및 행동

트라우마에 따른 변화는 사람마다 각각 다릅니다. 트라우마 사건 이후 대부분의 사람들이 한동안 이런 반응을 경험하지만, 시간이 지나면서 자연스럽게 회복됩니다.

3. 유발요인 찾기

- 불안, 공포, 분노, 슬픔 등의 불편감을 유발하는 내적, 외적 단서나 자극을 유발요인이라고 합니다.
- 유발요인에 노출되면 사건 당시의 생각이나 기억이 떠올라 불편해질 수도 있고, 그 기억에 완전히 빠져서 이후에 무슨 일이 일어났는지 모르게 되는 경우도 있습니다.

어떤 것이 나의 트라우마 사건을 떠오르게 하거나 나를 불편하게 하나요?

유발요인

구체적으로 작성해 봅시다.

☐ 보이는 것

☐ 소리

☐ 냄새나 맛

☐ 촉각

☐ 운동감각

☐ 통증, 신체감각

☐ 날짜, 계절, 시간

☐ 스트레스 사건이나 상황, 장소

☐ 각성, 강한 감정

☐ 생각이나 행동

☐ 기타

4. 트라우마가 일상생활에 미치는 영향

트라우마 증상에 대처하는 방식은 일상생활에 영향을 미칩니다. 트라우마에 대한 생각과 기억이 계속 떠오를 때 나는 어떻게 하고 있나요?

아래 방식 중 나의 대처방식과 비슷한 것이 있다면 체크해 봅시다.

☐ 약물(알코올 및/또는 약물)을 사용한다. 	☐ 일 중독자가 된다. 
☐ 다른 사람과 거리를 둔다. 	☐ 분노와 공격적인 행동을 한다. 
☐ 이외 나만의 대처방식	

트라우마에 대처하기 위한 방법은 잠시 증상을 벗어나게 할 수 있지만, 장기적으로는 나의 삶의 영역을 좁게 만들 수 있습니다.

5. 안정화란?

- 안정화란, 트라우마 사건을 경험한 후 발생한 불편감을 줄이고, 스스로를 조절하는 방법입니다.
- 불편한 반응을 유발시키는 요인을 알고, 스스로를 조절하는 방법을 찾는다면 불편감은 감소합니다.
- 꾸준한 연습을 통해 안정화 기법을 일상생활에서 효과적으로 활용할 수 있게 된다면, 현재 겪고 있는 고통을 완화하는 데 도움이 될 것입니다.


첫 번째 안정화 : 복식호흡훈련

Key point


- 복식호흡 흐름(4-3-5-3)



- 숨을 들이마실 때보다 내쉴 때 더 천천히 합니다. 마음을 편하게 하거나 진정시키기 위해 중요한 점은 천천히 내쉬는 것입니다.



횡격막 내려옴



횡격막 올라감

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요?

점

숙제: 복식호흡훈련 기록지

- 복식호흡훈련을 매일 30회씩(1세트) 실시합니다.
- 복식호흡 실시 후, 호흡 전/후의 불편감 점수(0~100점)와 호흡 집중도를(상/중/하) 기록지에 작성합니다.
- 프로그램을 성공적으로 마치기 위해서는 시간과 노력이 필요하며, 숙제는 빠른 회복을 위해 중요합니다.

날짜	불편감점수		집중도
	전	후	
			상 중 하
			상 중 하
			상 중 하
			상 중 하
			상 중 하

참고자료: 외상후 스트레스장애란?

외상후 스트레스장애란 무엇인가?

- 트라우마 사건으로 인한 불편감이 한 달 이상 지속되고, 주관적인 고통이 심하며, 일상생활에 지장이 될 때 외상후 스트레스장애라고 합니다.
- 외상후 스트레스장애는 전문가의 도움을 받아야 하는 질환입니다.

외상후 스트레스장애의 주요 증상

1. 침습

- 침습은 트라우마 사건과 관련된 불쾌한 기억이 반복적으로 떠오르는 현상을 말합니다.
- 침습은 뇌가 일어난 일을 곱씹어 이해하고 소화시키려는 시도입니다.
- 악몽을 꾸거나 극단적으로는 사건이 다시 일어난 것처럼 느끼고 행동하게 되기도 합니다.
- 사건을 연상시키는 것들로 인해 괴롭거나 신체반응으로 나타나기도 합니다.

2. 회피

- 회피는 트라우마 사건을 연상시키는 것들을 피하려고 노력하는 것을 말합니다.
- 회피는 본능적으로 고통을 차단하거나 피함으로써 스스로를 보호하려는 본능적인 시도입니다.
- 회피가 반복되면 사건을 떠오르게 하는 장소, 활동, 사람을 피하고, 관련 내용이 나오는 TV 뉴스나 영화를 보지 않는 등 행동변화가 발생하기 때문에 일상생활을 유지하는 데 어려움이 생길 수 있습니다.
- 힘들지만 회피대상을 파악하여 점차적으로 직면하도록 노력하는 것이 중요합니다.

3. 인지와 기분의 변화

- 트라우마 사건을 경험하면 흔히 생각이나 기분이 부정적으로 변하게 됩니다.
- 이는 사건 이후 발생하는 불편한 반응들로 인해 평소와 달리 통제력을 상실하기 때문에 발생합니다.
- 자신이나 세상, 주변 사람들에 대한 생각이 부정적으로 바뀌고, 자책감, 수치심, 타인에 대한 비난, 부정적 감정(두려움, 공포, 분노, 수치감), 평소 좋아하던 활동에 대한 흥미 상실, 사람들과 소외감, 좋은 감정을 못 느끼는 것 등이 해당됩니다.
- 외출이나 사람을 만나지 않으려 하기보다 오히려 적극적으로 활동을 계획하고, 긍정적으로 사고하려 노력하는 것이 도움이 됩니다.

4. 과각성

- 과각성은 몸(신경, 근육)이 항상 경계 상태에 있는 것으로, 경계를 낮추고 쉬지 못합니다.
- 과각성은 놀란 몸을 스스로 보호하기 위해 발생합니다.
- 과격하고 예민해지며, 지나치게 주위를 살피고, 소스라치게 깜짝 놀라거나 위험한 행동을 하기도 합니다.
- 불면증도 흔하며, 집중력이 떨어지거나 건망증이 생기기도 합니다. 심한 경우에는 공황발작이 발생하기도 합니다.

5. 해리

- 해리는 자신의 몸이나 정신으로부터 분리되는 경험입니다.
- 내가 아닌 것처럼 느끼거나 주변 환경이 낯설게 느껴지거나 꿈꾸는 것 같이 느껴지기도 합니다.
- 어떤 경우는 사고 당시 상황이나 일상생활의 일부가 기억이 나지 않을 수도 있습니다.
- 해리는 너무 충격적인 경험을 뇌가 강력히 차단하기 때문에 생긴다고 볼 수 있습니다.

6. 통증이나 신체증상

- 사고로 다치지 않은 경우에도 몸에 통증이나 불편함이 있을 수 있고, 당시에 다치거나 통증이 있었다면 통증을 더욱 심하게 느낄 수도 있습니다.
- 이러한 신체증상은 일반적인 의학적 검사로 원인을 알 수 없는 경우가 많지만, 괴명이나 과장이라고 볼 수 없고, 사고 당시에 신체에 남은 기억으로 발생했다고 볼 수 있습니다.

7. 우울증상

- 트라우마 사건을 경험한 후, 종종 슬픔이나 우울감을 느낄 수 있습니다.
- 무기력하고 희망이 없다고 느끼며, 자주 울게 되거나 때로 자해나 자살에 대해 생각하기도 합니다. 이러한 증상이 2주 이상 지속되고, 일상생활에 지장을 줄 때에는 전문가와 상담이 필요합니다.
- 우울증은 외상후 스트레스장애와 흔히 동반되며, 외상후 스트레스장애가 호전되면 회복될 수 있습니다.

8. 불안증상

- 트라우마 사건 경험 후 느끼는 불안이나 두려움은 당연한 반응이며, 특정 상황이나 자극에 불안해지는 경우가 대부분이지만, 아무런 이유 없이 불안해질 수도 있습니다.
- 이러한 불안은 힘들지만, 실제로 신체적 이상이 있는 것은 아니며, 치료로 호전될 수 있습니다.

9. 물질이나 행위 중독

- 트라우마 사건 이후 발생하는 정신적, 신체적 고통을 나름대로 줄여보기 위해 수면제 혹은 음식, 게임, 스마트폰 또는 위험한 행동(예를 들어 과속운전이나 사람들과 싸움)을 반복하기도 합니다.
- 힘들 때 주의를 돌리거나 기분전환을 돕는 건강한 행위는 치료에 도움이 되므로 건강한 중독을 만드는 것이 필요합니다.

트라우마 사건이 발생한 후 한동안은 여러 반응을 경험할 수 있습니다. 하지만 이러한 반응들은 지극히 정상적이고 자연스러운 것입니다. 또 외상후 스트레스장애는 절대 그 사람이 나약하다는 것을 의미하지 않습니다. 큰일을 겪은 후 너무 놀란 기억이 몸과 마음에 남아 그런 것일 뿐입니다.

PART 2. 나는 안전하다 : 통제능력 회복하기

이번 회기 우리의 목표

- 긴장 상태에 대한 감각을 키우고, 지나치게 긴장된 근육을 이완하는 능력을 기른다.
- 스트레스 상황과 이로 인한 불편한 기분을 조절하도록 돕는 대처자원을 개발한다.

어디까지 왔나요?

트라우마 이해하기	통제능력 회복하기	지금 여기로 돌아오기	미래를 바라보기
--------------	--------------	----------------	-------------

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

외상으로 피해자는 역량감과 통제력을 빼앗겼기 때문에,
회복을 이끄는 원칙은 생존자의 힘과 통제 능력을 회복하는 데 있다.
첫 번째 회복 단계에서는 생존자의 안전을 확립한다.
안전이 단단히 단속되지 않는 경우 어떠한 치료 작업도 성공할 수 없기 때문이다.

- 주디스 허먼, 《트라우마》

두 번째 안정화: 근육이완

- 우리 몸은 스트레스 상황에서 자동적으로 긴장하게 되고, 마음이 편해지면 몸은 이완됩니다.
- 근육이완은 몸에 힘을 주었을 때와 편안하게 풀었을 때의 차이를 느낌으로써 자신의 신체 변화를 지각하고, 조절능력 향상을 돕는 안정화 기법입니다.

몸의 각 부분에 힘을 주었다가 풀면서 몸에서 느껴지는 긴장감과 이완감을 느껴봅니다.

세 번째 안정화: 안전지대 연습

- 안전지대 연습은 불편감을 느끼거나 스트레스를 받을 때 마음의 평안을 되찾을 수 있는 이미지를 만드는 기법입니다.
- 불안하거나 긴장될 때 나만의 안전지대를 떠올림으로써 긴장을 완화시킬 수 있습니다.

아무에게도 방해받지 않고 편안하고 안전하게 느껴질 장소를 떠올려 보세요.
가보았던 장소도 좋고, 상상의 장소도 좋습니다.
고요하고 안전하게 느껴지는 곳을 생각하세요. 바닷가나 편안한 방일 수도 있습니다.

나의 안전지대 이름:

숙제: 근육이완 기록지

- 근육이완 녹음본을 매일 한 번씩 듣고, 근육이완 전/후로 불편감 점수가 어떻게 달라졌는지, 기법을 얼마나 집중하여 실행했는지 기록합니다.
- 근육이완 실시 후 전/후의 불편감 점수(0~100점)와 집중도를(상/중/하) 기록지에 작성합니다.
- 프로그램을 성공적으로 마치기 위해서는 시간과 노력이 필요하며, 숙제는 빠른 회복을 위해 중요합니다.

날짜	불편감점수		집중도
	전	후	
			상 중 하
			상 중 하
			상 중 하
			상 중 하
			상 중 하

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 3. 나는 이곳에 있다 : 지금 여기로 돌아오기

이번 회기 우리의 목표

- 나는 지금 여기에 있음을 인지한다.
- 나의 몸을 스스로 통제할 수 있음을 안다.

어디까지 왔나요?

트라우마 이해하기	통제능력 회복하기	지금 여기로 돌아오기	미래를 바라보기
--------------	--------------	----------------	-------------

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

PTSD 환자의 머릿속에 트라우마 기억이 우세한 이유 중 하나는
현재를 온전히 살아가지 못하기 때문이다.
지금 있는 곳에 온전히 머무르지 못하면 자연스레 살아 있다고 느낄 수 있는 곳으로 가게 된다.
그 장소가 공포와 고통으로 가득한 곳이라 해도 마찬가지다.

- 베셀 반 데어 코크, 《몸은 기억한다》

네 번째 안정화: 호흡 마음챙김명상

- 호흡 마음챙김명상이란 현재 호흡에 주의를 집중하여 어떠한 해석 없이 지금 여기에 있는 나 자신을 알아차리는 것입니다.
- 호흡은 마음의 변화에 따라 달라지는데, 시시각각 달라지는 호흡을 직접 관찰해 봅니다.
- 이 기법은 고통스러운 트라우마 기억이 떠오를 때, 호흡에 집중함으로써 지금 여기로 돌아 오도록 돕습니다.

지금 이 순간 호흡을 하며 느껴지는 미세한 감각의 변화를 있는 그대로 관찰해 보세요.

다섯 번째 안정화: 착지연습

- 착지연습은 트라우마 경험 후에 내가 아닌 것 같거나 꿈인지 현실인지 잘 구분이 되지 않을 때, 그리고 원하지 않는 기억이 자꾸 떠올라 멍해질 때 사용하는 안정화 기법입니다.
- 이 기법은 시각, 청각, 신체 감각 등을 이용해 지금 여기에서의 외부 자극과 신체 감각을 인식함으로써 고통감에서 벗어나도록 돕습니다.

시각적 착지 연습

주변을 둘러보세요. 지금 여기에서 보이는 것 5가지를 적어 보세요.

	무엇이 보이나요?	그것의 모양, 색깔, 무늬, 느낌이 어떨까요?
1		
2		
3		
4		
5		

청각적 착지 연습

주변의 소리에 집중해 보세요. 지금 여기에서 들리는 것 3가지를 적어 보세요.

	무엇이 들리나요?	어떤 소리이고 어떤 느낌이 드나요?
1		
2		
3		

인지적 착지 연습

다음 질문에 답해 보세요.

지금 여기는 어디인가요? (장소명, 층수, 지역, 국가)	
오늘은 며칠인가요? (날짜, 요일, 월, 계절, 연도)	
지금 나이가 몇 살이지요?	
지금 우리나라 대통령은 누구인가요?	
핸드폰을 꺼내서 보세요. 오늘 뉴스에서 무엇이 나왔고, 오늘 날씨는 어떨까요?	

신체 감각적 착지 연습

다음 질문에 답해 보세요.

의자 팔걸이를 만져 보세요. 어떤 느낌인가요?	
엉덩이를 의자에 붙여 보세요. 의자의 느낌이 어떨까요?	
발바닥을 바닥에 붙이고 무게를 실어 보세요. 발바닥이 바닥에 닿는 느낌이 어떨까요?	
주머니에서 한 가지 물건을 꺼내 만져 보세요. 어떤 느낌인가요?	

운동 감각적 착지 연습

다음 동작을 시도해 보세요.

박수를 세 번 쳐 보세요.

어렸을 때 했던 잼잼 동작을 왼쪽, 오른쪽 번갈아 가면서 해 보세요.

어깨와 등을 한번 쪽 펴고, 앞으로 세 번, 뒤로 세 번 돌려 보세요.

양 발가락을 꼬지락거리면서 움직여 보세요.

한쪽 발꿈치를 다른 쪽 무릎에 대는 동작을 반복해 보세요.

지금까지 연습해본 기법 중에서 특히 마음에 드는 방법이 있었나요?

숙제: 호흡 마음챙김명상 기록지

- 호흡 마음챙김명상 녹음본을 매일 한 번씩 듣고, 아래의 기록지를 작성합니다.
- 프로그램을 성공적으로 마치기 위해서는 시간과 노력이 필요하며, 숙제는 빠른 회복을 위해 중요합니다.

날짜	불편감점수		주의 집중하여 내가 관찰한 것은 무엇인가? 예: 배가 툭툭 끊어지듯이 움직임	주의 집중을 방해한 것은 무엇인가? 예: 통증, 과거나 미래에 대한 생각
	전	후		

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

PART 4. 삶은 계속된다 : 미래를 바라보기

이번 회기 우리의 목표

- 현재와 미래 상황을 긍정적인 관점으로 조망한다.
- 프로그램 전과 비교하여 달라진 점을 돌이켜보고, 나의 대처능력에 대한 자신감을 갖는다.

어디까지 왔나요?

트라우마 이해하기	통제능력 회복하기	지금 여기로 돌아오기	미래를 바라보기
--------------	--------------	----------------	-------------

죽음은 항상 삶에 넘실댄다.

우리는 끊임없이 무언가를 잃고, 떠나야 하고, 양보해야 하고, 헤어져야 하며 포기해야 한다.
삶은 계속해서 변하고, 우리는 신뢰했던 사람을 떠나야 하고, 변화에 맞서야 한다.

하지만 우리가 항상 패배하는 것만은 아니다. 승리할 때도 있다.
거듭되는 변화를 통해서 삶은 우리에게 우리의 존재를 활짝 펼치고
성장할 수 있는 기회를 제공한다.

- 베레나 카스트, 《애도》

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

여섯 번째 안정화: 자원 강화

- 자원 강화는 힘들고 괴로운 기억이나 감정, 생각이 떠오를 때, 과거에 긍정적으로 행동했던 나의 모습을 떠올리거나 역할모델, 혹은 상징물을 떠올려서 스스로에게 격려의 메시지를 보내는 기법입니다.
- 이 기법은 현재와 미래를 긍정적으로 조망하고, 자신의 대처능력에 대한 자신감을 갖는 데 도움이 됩니다.

미래(혹은 현재나 과거)의 어떤 문제를 해결하고 싶나요?

어떤 능력, 기술, 혹은 자원이 이 문제를 해결하는 데 필요할까요?

예: 자신감, 강함, 용기, 희망, 여유, 확신, 자기주장, 유연함, 감정조절, 안정감

지금까지 살아오면서 가장 _____하게 느끼고, 행동했던 적이 언제였나요?

그 경험의 상황과 감정을 생생히 떠올리며 집중해 봅시다. 그 당시의 자신이 지금의 나에게 얘기를 해준다면, 뭐라고 할 것 같나요?

내가 아는 사람 중 누가 가장 _____한 특성을 지녔나요?

그 사람에 대하여 생생히 떠올리며 집중해 봅시다. 그 사람이 지금의 나에게 격려의 말을 해준다면, 뭐라고 할 것 같나요?

어떤 이미지(혹은 상징물)가 그것을 잘 나타내나요? (예: 바위, 십자가, 나무, 염주 등)

그 상징물을 볼 때, 자신에게 뭐라고 하고 싶나요?


변화된 나를 발견하기

지난 4주 동안 나의 신체를 안정시키고 통제감을 회복하기 위한 안정화 기법을 배워 보았습니다. 4주간 나의 불편감 점수와 우울 및 불안 점수가 어떻게 변화했는지 그래프로 그려 봅시다.

불편감 점수



우울 및 불안 점수



프로그램 참여 이전과 불편감이 크게 달라지지 않아 실망스러울 수도 있습니다. 그러나 과거에 비해 지금의 나는 불안하고 긴장되는 마음을 편안하게 만들 수 있는 기법들을 알고 있다는 점에서 분명히 다릅니다. 회복될 것이라는 믿음을 가지고 기법들을 지속적으로 사용한다면, 시간이 흐름에 따라 점차 변화된 나를 느낄 수 있을 것입니다.



우리가 함께한 지난 4주간의 여정을 통해 나의 몸에 대한 조절을 회복할 수 있는 작은 변화의 씨앗이 시작되었기를 바랍니다. 이후로도 지속될 여러분의 삶을 응원합니다.

날짜 20 년 월 일

현재 경험하고 있는 불편감은 0~100점 중 어느 정도 수준인가요? 점

귀하의 상태를 가장 잘 나타낸다고 생각되는 문항을 골라 O 표시해 주십시오.

Q 01 나는 긴장감 또는 “정신적 고통”을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 02 나는 즐겨오던 것들을 현재도 즐기고 있다.

0	1	2	3
똑같이 즐긴다.	많이 즐기지는 못한다.	단지 조금만 즐긴다.	거의 즐기지 못한다.

Q 03 나는 무언가 무서운 일이 일어날 것 같은 느낌이 든다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	조금 있지만 걱정하지 않는다.	있지만 그렇게 나쁘지는 않다.	매우 분명하고 기분이 나쁘다.

Q 04 나는 사물을 긍정적으로 보고 잘 웃는다.

0	1	2	3
나는 항상 그렇다.	현재는 그다지 그렇지 않다.	거의 그렇지 않다.	전혀 아니다.

Q 05 마음속에 걱정스러운 생각이 든다.

0	1	2	3
거의 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 그렇다.

Q 06 나는 기분이 좋다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	자주 그렇다.	가끔 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 07 나는 편하게 긴장을 풀 수 있다.

0	1	2	3
항상 그렇다.	대부분 그렇다.	대부분 그렇지 않다.	전혀 그렇지 않다.

Q 08 나는 기력이 떨어진 것 같다.

0	1	2	3
전혀 아니다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 09 나는 초조하고 두렵다.

0	1	2	3
전혀 아니다	가끔 그렇다	자주 그렇다	매우 자주 그렇다.

Q 10 나는 나의 외모에 관심을 잃었다.

0	1	2	3
여전히 관심이 있다.	전과 같지는 않다.	이전보다 확실히 관심이 적다.	확실히 잃었다.

Q 11 나는 가만히 있지 못하고 안절부절못한다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	자주 그렇다.	매우 그렇다.

Q 12 나는 일들을 즐거운 마음으로 기대한다.

0	1	2	3
내가 전에 그랬던 것처럼 그렇다.	전보다 조금 덜 그렇다.	전보다 확실히 덜 그렇다.	전혀 그렇지 않다.

Q 13 나는 갑자기 당황스럽고 두려움을 느낀다.

0	1	2	3
전혀 그렇지 않다.	가끔 그렇다.	꽤 자주 그렇다.	거의 항상 그렇다.

Q 14 나는 좋은 책 또는 라디오, 텔레비전을 즐길 수 있다.

0	1	2	3
자주 즐긴다.	가끔 즐긴다.	거의 못 즐긴다.	전혀 못 즐긴다.

