


Kako se lepijo površine med seboj?


s povečanjem stične površine





površina Post-it lepila


Kako se lepijo površine med seboj?

s povečanjem stične površine










okončina gecka

Kako se lepijo površine med seboj?


preko izločanja smol, sladkorjev, ...



okončina muhe




Osnovne sile



V molekularnem svetu prevladujejo interakcije na osnovi **elektrostatskih sil**.








Elektroni: nosilci elektrostatskih interakcij

• Elektroni imajo negativen naboj.


 So zelo lahki delci, zato so porazdeljeni okoli mnogo težjih jeder s pozitivnim nabojem. Elektroni tvorijo elektronske oblake/orbitale.



 V molekuli dveh različnih atomov prevzame eno jedro v povprečju več elektronov kot drugo. Razmakneta se težišči negativnega in pozitivnega naboja. Nastane fiksen električni dipol.




• Težišča nabojev se razmaknejo tudi pod vplivom zunanjih električnih polj. Tako nastanejo *inducirani električni dipoli*, njihova jakost je odvisna od polarizabilnosti molekule (α).




Kako daleč sežejo interakcije?

• Električna (Coulombova) interakcija med dvema nabojema



$$W \propto e_1 e_2 \frac{1}{r}$$


• Električna interakcija med nabojem in dipolom



$$W \propto e_1 u_2 \frac{\cos(\varphi)}{r^2}$$
$$u_2 = e_2 d$$

Kako daleč sežejo interakcije?

• Interakcija med dvema dipoloma




$$W \propto u_1 u_2 \frac{cos \dots}{r^3}$$

Van der Waalsove interakcije


• Dipolne interakcije na osnovi polariziranih elektronskih oblakov

Dva dipola



$$W \propto \frac{1}{r^6 kT}$$

• Dipol + induciran dipol



$$W \propto -\frac{\alpha}{r^6}$$

• Dva inducirana dipola

$$\alpha$$
 γ α


$$W \propto -\frac{\alpha^2}{r^6}$$

• Ne pozabimo vedno prisotnega odboja pri majhnih razdaljah (*izključitveno načelo*: dva elektrona ne moreta biti na istem mestu ob istem času)


Kvantno-mehanske interakcije

Interakcije na osnovi *elektronskih parov*, v katerem se dva elektrona nahajata z različnimi lastnostmi (spinom).

• Kovalentna in koordinativna vez co-valence; atoma si delita elektronski par



hemoglobin




Kvantno-mehanske interakcije

Interakcije na osnovi *elektronskih parov*, v katerem se dva elektrona nahajata z različnimi lastnostmi (spinom).

• Kovalentna in koordinativna vez co-valence; atoma si delita elektronski par

Vodikova vez

- H tvori vez med dvema paroma elektronov
- pogoj za to je elektronegativnost donorja protona
- struktura proteinov, DNA, polisaharidov, ...




Kako močne so posamezne vezi?

• V molekularnem svetu primerjamo energije interakcij s termično energijo:

pri $T = 310 \text{ K } (37^{\circ}\text{C}) \text{ je } kT = 0.0267 \text{ eV}$


| interakcija | energija | | razmerje proti kT |
|------------------|----------|-------------|-------------------|
| | kJ/mol | eV | kT |
| kovalentna | 200–900 | 2–9 | 80–350 |
| ionska | 400–800 | 4–8 | 150–300 |
| van der Waalsova | 2-velika | 0.02-velika | 1–veliko |
| vodikova | 5–25 | 0.05–0.25 | 2–10 |






Agregacija proteinov v fibrile

Množica
patofizioloških problemov
povezanih z agregacijo




Vdor ogljikove nanocevke v membrano


Množica novih nanomaterialov z nepredvidljivimi vplivi




"Raztapljanje" polimernega nanodelca v membrani




Hidrofobna "interakcija" sestavi




Van der Waalsove interakcije <u>agregirajo</u>




Vodikove vezi stabilizirajo




Ioni v raztopini <u>senčijo</u> interakcije dolgega dosega



Ionske in dipolne interakcije prestrukturirajo





Fluktuacijske sile <u>razmikajo</u>






Mikroskopija na atomsko silo (AFM) - slepi s paličico vidi






Kakšne so sile vezi med proteini in v proteinih?



Optična pinceta - slap nas ne pusti iz stržena





Kako vlečejo molekularni motorji?

miozin, aktin, ATP

