

夏日炎炎 慎防熱傷害

熱傷害



熱傷害是指身體在**高溫環境下無法有效調節體溫**所引起的急性疾病。常見類型包括**熱痙攣**、**熱衰竭**和**熱中暑**，其中熱中暑為最嚴重形式，**不當處理可能導致器官衰竭甚至死亡**。

常見的熱傷害

熱痙攣

症狀:流汗、
身體局部抽筋



熱衰竭

症狀:大量流
汗、體溫升高
(低於40度)
、心跳加快



熱中暑

症狀:、意識模糊
不清、體溫升高
(超過40度)、呼吸
困難、昏迷、抽搐



急救三步驟

散熱



補水



就醫



預防三要訣

保持
涼爽



補充
水分



提高
警覺



資料來源:衛生福利部【高溫?熱傷害?你需要知道的事】

補充小知識

吹冷氣也會中暑?

當從戶外高溫進入冷氣房內或久坐冷氣房內到高溫戶外也會有發生中暑的狀況，原因是溫度落差劇烈導致體液不平衡導致發生【中暑】

如何預防?

- 1.冷氣強度不要低於26度
- 2.出去冷氣房時先穿外套
- 3.多補充水分

更多熱危害預防知識





夏日中暑症狀有數，戶外平安執勤有術！


- 隨著氣溫的升高，在戶外執行勤務時要如何避免中暑呢？



「使用國家標準檢驗合格防曬或涼感產品」：
選防曬係數高(SPF 30以上)，具UVA (以★或PA+表示)防禦效果產品



「補充水分」：
每15~20分飲水一次每次飲水150~200cc



「挑選具商品檢驗及完整標示的太陽眼鏡」：護眼防曬係數 (E-SPF) 係數越大效果越佳。



「身體降溫散熱」：
不定時至陰涼通風處卸下易致身體悶熱物品，如：安全帽及長袖防曬衣物

- 戶外應提高警覺，尤其妊娠肥胖、近期缺乏熱暴露，或是消化性潰瘍、內分泌失調、無汗症及腎疾病及服用體溫調節藥患者。



頭暈/頭痛



皮膚燙/體溫高



噁心/嘔吐



肌肉痛/抽筋



心跳加速

若出現以上症狀



先讓身體降溫，飲用加少許鹽的冷水或稀釋的電解質飲料

★ 若還是出現體溫持續上升、嘔吐、或意識持續不清，請以最快速度就醫。



更多熱危害資訊
請參考2021.06
OHS月刊