

Syntaks og semantik

Lektion 9

15 marts 2007

Syntaks vs. semantik

Tilgange

Anvendelser

Semantik

- 1 Syntaks vs. semantik
- 2 Forskellige tilgange til semantik
- 3 Anvendelser

Syntaks: Læren om sprogs *form*

- hvordan *ser* et lovligt program *ud*?
- beskriv byggesten (*alfabet*) og hvordan de kan sættes sammen (*grammatik, automat* etc.)

Semantik: Læren om sprogs *betydning*

- hvordan *opfører* et givet program sig?
- beskriv *betydningen* af byggesten og hvordan betydningen af sammensætninger af byggesten fås ud fra de enkelte betydninger

3 / 26

- **denotationel** semantik
 - beskriv et programs betydning som funktion fra *input* til *output*
 - *Hvad* laver det her program?
- **operationel** semantik
 - beskriv et programs betydning som *transitionssystem*
 - *Hvordan* udføres det her program?
- **aksiomatisk** semantik
 - beskriv et program ved *præ-* og *post-betingelser*
 - *Hvilke egenskaber* har det her program?
- (**algebraisk** semantik: variant af aksiomatisk semantik)

4 / 26

- **præcis beskrivelse** af programmeringssprog
 - “rettesnor” til implementation
 - **automatisk generering** af compilere og fortolkere
 - **automatisk verifikation** af programmer
 - det kan være *dyrt* at finde fejl i et program ved aftestning
- ⇒ heller finde fejl *før*

5 / 26

Bims

Transitionssystemer

Aud: big-step

Derivationstræer

Aud: small-step

Egenskaber

Bud: big-step

Operationel semantik

- 4 Abstrakt syntaks for **Bims**
- 5 Transitionssystemer
- 6 Big-step-semantik for aritmetiske udtryk (uden variable)
- 7 Derivationstræer
- 8 Small-step-semantik for aritmetiske udtryk (uden variable)
- 9 Egenskaber
- 10 Big-step-semantik for boolske udtryk (uden variable)

6 / 26

$n \in \mathbf{Num}$ – Numeraler

$x \in \mathbf{Var}$ – Variable

$a \in \mathbf{Aud}$ – Aritmetiske udtryk

$b \in \mathbf{Bud}$ – Boolske udtryk

$S \in \mathbf{Kom}$ – Kommandoer

$S ::= x := a \mid \text{skip} \mid S_1; S_2 \mid \text{if } b \text{ then } S_1 \text{ else } S_2$
 $\mid \text{while } b \text{ do } S$

$b ::= a_1 = a_2 \mid a_1 < a_2 \mid \neg b_1 \mid b_1 \wedge b_2 \mid (b_1)$

$a ::= n \mid x \mid a_1 + a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 - a_2 \mid (a_1)$

basiselementer

sammensatte elementer

umiddelbare bestanddele

7/26

Definition 3.2: Et **transitionssystem** er en tripel (Γ, \rightarrow, T) , hvor delene er

- ① Γ : en mængde af **konfigurationer** (eller **tilstande**)
- ② $\rightarrow \subseteq \Gamma \times \Gamma$: **transitions-relationen**
- ③ $T \subseteq \Gamma$: mængden af **slut-konfigurationer**

– en *orienteret graf*

Det forudsættes desuden at slutkonfigurationerne er **terminale**, dvs. ikke har nogen udgående transitioner:

for ethvert $\gamma \in T$ findes der ingen $\gamma' \in \Gamma$ med $\gamma \rightarrow \gamma'$.

Operationel semantik = at oversætte et *program* til et *transitionssystem*:

- konfigurationer = programtilstande
- transitioner = programskridt

8/26

Eksempel: En operationel semantik for *endelige automater*:

Givet en NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$:

- konfigurationer: tilstand i Q plus tilbageværende del af inputstrengen
dvs. $\Gamma = Q \times \Sigma^*$ (*uendeligt mange konfigurationer!*)
- slutkonfigurationer: sluttilstand i F plus tom streng
dvs. $T = \{(q, \varepsilon) \mid q \in F\}$
- transitioner: at læse et tegn (eller ε) og gå i en anden tilstand
dvs. $(q, aw) \rightarrow (q', w)$ hver gang $q' \in \delta(q, a)$, og for alle $w \in \Sigma^*$

M accepterer en streng w hvis og kun hvis der findes $\gamma \in T$ således at $(q_0, w) \xrightarrow{*} \gamma$.

9/26

Eksempel: En operationel semantik for *kontekstfrie grammatikker*:

Givet en CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$:

- konfigurationer: strenge af variable og terminaler:
 $\Gamma = (V \cup \Sigma)^*$
- slutkonfigurationer: strenge af terminaler:
 $T = \Sigma^*$
- transitioner: derivationsskridt!
 $uAv \Rightarrow uwv$ hvis $A \rightarrow w$ er i R

G genererer en streng $w \in T$ hvis og kun hvis $S \xRightarrow{*} w$.

Definition 3.11: Lad $(\Gamma, \Longrightarrow, T)$ være et transitionssystem.

Transitionsaflukningen i k skridt \xRightarrow{k} er defineret induktivt ved

$$\begin{aligned} \gamma &\xRightarrow{0} \gamma \quad \text{for alle } \gamma \\ \gamma &\xRightarrow{n+1} \gamma' \quad \text{hvis der findes } \gamma'' \text{ for hvilket } \gamma \Longrightarrow \gamma'' \xRightarrow{n} \gamma' \end{aligned}$$

Vi skriver $\gamma \xRightarrow{*} \gamma'$ hvis der findes et k så $\gamma \xRightarrow{k} \gamma'$.

– dvs. $\gamma \xRightarrow{k} \gamma'$ hvis der findes en *transitionsfølge*

$$\gamma \Longrightarrow \gamma_1 \Longrightarrow \gamma_2 \Longrightarrow \dots \Longrightarrow \gamma_{k-1} \Longrightarrow \gamma'$$

– vi har allerede brugt aflukningen $\xRightarrow{*}$ adskillige gange!

11 / 26

Aritmetiske udtryk uden variable:

$$\mathbf{Aud:} \quad a ::= n \mid a_1 + a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 - a_2 \mid (a_1)$$

hvor n er et **numeral** (talord) (en *streng*!), *ikke et tal*

- numeraler skrives 42, tal skrives 42
- *værdien* af 42 er 42
- vi har en *semantisk funktion* $\mathcal{N} : \mathbf{Num} \rightarrow \mathbb{Z}$ som giver værdien af en numeral

Big-step-semantik: udtryk evalueres i **ét hug**

- transitioner fra *udtryk* til *værdier*
- f.x. en transition $(\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1}) \rightarrow 42$

12 / 26

$$[\text{plus}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow v_1 \quad a_2 \rightarrow v_2}{a_1 + a_2 \rightarrow v} \quad \text{hvor } v = v_1 + v_2$$

$$[\text{minus}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow v_1 \quad a_2 \rightarrow v_2}{a_1 - a_2 \rightarrow v} \quad \text{hvor } v = v_1 - v_2$$

$$[\text{mult}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow v_1 \quad a_2 \rightarrow v_2}{a_1 * a_2 \rightarrow v} \quad \text{hvor } v = v_1 \cdot v_2$$

$$[\text{parent}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow v_1}{(a_1) \rightarrow v_1}$$

$$[\text{num}_{\text{bss}}] \quad n \rightarrow v \quad \text{hvis} \quad \mathcal{N}[[n]] = v$$

13 / 26

$$[\text{minus}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow v_1 \quad a_2 \rightarrow v_2}{a_1 - a_2 \rightarrow v} \quad \text{hvor } v = v_1 - v_2$$

præmis

transitionsregel

konklusion

sidebetingelse

$$[\text{num}_{\text{bss}}] \quad n \rightarrow v \quad \text{hvis} \quad \mathcal{N}[[n]] = v$$

aksiom (transitionsregel uden præmis)

14 / 26

$$[\text{plus}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow v_1 \quad a_2 \rightarrow v_2}{a_1 + a_2 \rightarrow v} \quad \text{hvor } v = v_1 + v_2$$

$$[\text{minus}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow v_1 \quad a_2 \rightarrow v_2}{a_1 - a_2 \rightarrow v} \quad \text{hvor } v = v_1 - v_2$$

$$[\text{mult}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow v_1 \quad a_2 \rightarrow v_2}{a_1 * a_2 \rightarrow v} \quad \text{hvor } v = v_1 \cdot v_2$$

$$[\text{parent}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow v_1}{(a_1) \rightarrow v_1}$$

$$[\text{num}_{\text{bss}}] \quad n \rightarrow v \quad \text{hvis} \quad \mathcal{N}[\![n]\!] = v$$

Transitionssystemet (Γ, \rightarrow, T) :

- $\Gamma = \mathbf{Aud} \cup \mathbb{Z}$, $T = \mathbb{Z}$
- \rightarrow består af præcis de transitioner som kan udledes af aksiomerne ved brug af et endeligt antal transitionsregler

15/26

At konstruere et **derivationstræ** for udtrykket $(\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1})$:

$$(\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1}) \rightarrow ?$$

At konstruere et **derivationstræ** for udtrykket $(\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1})$:

$$\frac{(\underline{2} + \underline{4}) \rightarrow ? \quad (\underline{6} + \underline{1}) \rightarrow ?}{(\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1}) \rightarrow ?}$$

17/26

At konstruere et **derivationstræ** for udtrykket $(\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1})$:

$$\frac{\frac{\underline{2} + \underline{4} \rightarrow ?}{(\underline{2} + \underline{4}) \rightarrow ?} \quad \frac{\underline{6} + \underline{1} \rightarrow ?}{(\underline{6} + \underline{1}) \rightarrow ?}}{(\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1}) \rightarrow ?}$$

18/26

At konstruere et **derivationstræ** for udtrykket $(\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1})$:

$$\begin{array}{c}
 \underline{2} \rightarrow 2 \quad \underline{4} \rightarrow 4 \qquad \underline{6} \rightarrow 6 \quad \underline{1} \rightarrow 1 \\
 \hline
 \underline{2} + \underline{4} \rightarrow 6 \qquad \underline{6} + \underline{1} \rightarrow 7 \\
 \hline
 (\underline{2} + \underline{4}) \rightarrow 6 \qquad (\underline{6} + \underline{1}) \rightarrow 7 \\
 \hline
 (\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1}) \rightarrow 42
 \end{array}$$

19/26

At konstruere et **derivationstræ** for udtrykket $(\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1})$:

$$\begin{array}{c}
 \underline{2} \rightarrow 2 \quad \underline{4} \rightarrow 4 \qquad \underline{6} \rightarrow 6 \quad \underline{1} \rightarrow 1 \\
 \swarrow \quad \searrow \qquad \swarrow \quad \searrow \\
 \underline{2} + \underline{4} \rightarrow 6 \qquad \underline{6} + \underline{1} \rightarrow 7 \\
 \uparrow \qquad \qquad \uparrow \\
 (\underline{2} + \underline{4}) \rightarrow 6 \qquad (\underline{6} + \underline{1}) \rightarrow 7 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 (\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1}) \rightarrow 42
 \end{array}$$

derivationstræer:

- aksiomer i bladene
- knude k har sønner p_1, p_2, \dots, p_n hvis og kun hvis der er en transitionsregel

$$\frac{p_1, p_2, \dots, p_n}{k}$$

20/26

Small-step-semantik: udtryk evalueres **et skridt ad gangen**

- transitioner fra *udtryk* til *udtryk* og fra *udtryk* til *værdier*
- f.x.

$$\begin{aligned}(\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1}) &\Rightarrow (\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1}) \\&\Rightarrow (\underline{2} + \underline{4}) * (\underline{6} + \underline{1}) \\&\Rightarrow (\underline{6}) * (\underline{6} + \underline{1})\end{aligned}$$

- transitionssystem (Γ, \Rightarrow, T) :
 - $\Gamma = \mathbf{Aud}' \cup \mathbb{Z}$, $T = \mathbb{Z}$
 - \Rightarrow defineret ved transitionsregler (*coming up!*)

Aritmetiske udtryk uden variable, men *med værdier*:

$$\mathbf{Aud}' : \quad a ::= n \mid v \mid a_1 + a_2 \mid a_1 * a_2 \mid a_1 - a_2 \mid (a_1)$$

hvor $n \in \mathbf{Num}$ er et numeral og $v \in \mathbb{Z}$ en værdi

21 / 26

$$[\text{plus-1}_{\text{sss}}] \quad \frac{a_1 \Rightarrow a'_1}{a_1 + a_2 \Rightarrow a'_1 + a_2}$$

$$[\text{plus-2}_{\text{sss}}] \quad \frac{a_2 \Rightarrow a'_2}{a_1 + a_2 \Rightarrow a_1 + a'_2}$$

$$[\text{plus-3}_{\text{sss}}] \quad v_1 + v_2 \Rightarrow v \quad \text{hvor } v = v_1 + v_2$$

$$[\text{mult-1}_{\text{sss}}] \quad \frac{a_1 \Rightarrow a'_1}{a_1 * a_2 \Rightarrow a'_1 * a_2}$$

$$[\text{mult-2}_{\text{sss}}] \quad \frac{a_2 \Rightarrow a'_2}{a_1 * a_2 \Rightarrow a_1 * a'_2}$$

$$[\text{mult-3}_{\text{sss}}] \quad v_1 * v_2 \Rightarrow v \quad \text{hvor } v = v_1 \cdot v_2$$

22 / 26

$$\begin{array}{lcl}
[\text{sub-1}_{\text{sss}}] & \frac{a_1 \Rightarrow a'_1}{a_1 - a_2 \Rightarrow a'_1 - a_2} & \\
[\text{sub-2}_{\text{sss}}] & \frac{a_2 \Rightarrow a'_2}{a_1 - a_2 \Rightarrow a_1 - a'_2} & \\
[\text{sub-3}_{\text{sss}}] & v_1 - v_2 \Rightarrow v \text{ hvor } v = v_1 - v_2 & \\
[\text{parent-1}_{\text{sss}}] & \frac{a_1 \Rightarrow a'_1}{(a_1) \Rightarrow (a'_1)} & \\
[\text{parent-2}_{\text{sss}}] & (v) \Rightarrow v & \\
[\text{num}_{\text{sss}}] & n \Rightarrow v \text{ hvis } \mathcal{N}[[n]] = v &
\end{array}$$

23 / 26

Sætning: Vores big-step- og small-step-semantikker for **Aud** er ækvivalente: Givet $a \in \mathbf{Aud}$ og $v \in \mathbb{Z}$, da har vi $a \rightarrow v$ hvis og kun hvis $a \xRightarrow{*} v$. *(Bevis næste gang)*

Definition: En operationel semantik givet ved et transitionssystem (Γ, \rightarrow, T) kaldes **deterministisk** hvis $\gamma \rightarrow \gamma_1$ og $\gamma \rightarrow \gamma_2$ medfører $\gamma_1 = \gamma_2$ for alle $\gamma \in \Gamma$ og $\gamma_1, \gamma_2 \in T$ (!). Semantikken kaldes **deterministisk på lang sigt** hvis $\gamma \xrightarrow{*} \gamma_1$ og $\gamma \xrightarrow{*} \gamma_2$ medfører $\gamma_1 = \gamma_2$ for alle $\gamma \in \Gamma$ og $\gamma_1, \gamma_2 \in T$.

Sætning 3.13 / 3.15 : Vores big-step-semantik for **Aud** er **deterministisk**. Vores small-step-semantik for **Aud** er **deterministisk på lang sigt**. *(Bevises senere)*

Opgave π : Vores small-step-semantik for **Aud** er *ikke deterministisk*. Lav den om så den er!

24 / 26

Boolske udtryk uden variable:

Bud: $b ::= a_1 = a_2 \mid a_1 < a_2 \mid \neg b_1 \mid b_1 \wedge b_2 \mid (b_1)$

- transitionssystem (**Bud** $\cup \{tt, ff\}, \rightarrow_b, \{tt, ff\}$)
- tt = sandt, ff = falsk
- \rightarrow_a er transitioner fra **Aud**-transitionssystemet

$$[\text{ligmed-1}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow_a v_1 \quad a_2 \rightarrow_a v_2}{a_1 = a_2 \rightarrow_b tt} \quad \text{hvis } v_1 = v_2$$

$$[\text{ligmed-2}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow_a v_1 \quad a_2 \rightarrow_a v_2}{a_1 = a_2 \rightarrow_b ff} \quad \text{hvis } v_1 \neq v_2$$

$$[\text{størreend-1}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow_a v_1 \quad a_2 \rightarrow_a v_2}{a_1 < a_2 \rightarrow_b tt} \quad \text{hvis } v_1 < v_2$$

$$[\text{størreend-2}_{\text{bss}}] \quad \frac{a_1 \rightarrow_a v_1 \quad a_2 \rightarrow_a v_2}{a_1 < a_2 \rightarrow_b ff} \quad \text{hvis } v_1 \not< v_2$$

25 / 26

$$[\text{ikke-1}_{\text{bss}}] \quad \frac{b \rightarrow_b tt}{\neg b \rightarrow_b ff}$$

$$[\text{ikke-2}_{\text{bss}}] \quad \frac{b \rightarrow_b ff}{\neg b \rightarrow_b tt}$$

$$[\text{parent-b}_{\text{bss}}] \quad \frac{b_1 \rightarrow_b v}{(b_1) \rightarrow_b v}$$

$$[\text{og-1}_{\text{bss}}] \quad \frac{b_1 \rightarrow_b tt \quad b_2 \rightarrow_b tt}{b_1 \wedge b_2 \rightarrow_b tt}$$

$$[\text{og-2}_{\text{bss}}] \quad \frac{b_1 \rightarrow_b ff}{b_1 \wedge b_2 \rightarrow_b ff}$$

$$[\text{og-3}_{\text{bss}}] \quad \frac{b_2 \rightarrow_b ff}{b_1 \wedge b_2 \rightarrow_b ff}$$

26 / 26