Átomos de Rydberg interactuando dentro de una cavidad óptica

Andrea Fernanda Rodríguez Rojas

«Universidad Nacional Autónoma de México»

Índice general

1 Introducción ... 3
1.1. Motivación ... 3
1.2. Objetivo ... 3
1.3. Estructura de la tesis ... 3
2 Fundamentos teóricos ... 4
2.1. Interacción luz-materia ... 4
2.1.1. Átomo de dos niveles y la aproximación de onda rotante (RWA) ... 4
2.1.2. Cuantización del campo: Modelo de Jaynes-Cummings ... 4
2.1.3. Dressed states y fenómeno Autler Townes ... 4
2.2. Entornos disipativos ... 4
2.2.1. Operador densidad y pérdida de coherencia ... 4
2.2.2. Ecuación maestra de Lindblad ... 4
2.3. Interacciones interatómicas y bloqueo de Rydberg ... 4
3 Formulación del sistema ... 5
3.1. Descripción del sistema físico ... 5
3.1.1. Construcción del Hamiltoniano ... 6
Dinámica de la cavidad y el campo de bombeo, Energía atómica y acoplamiento átomo--láser, Acoplamiento interatómiico y términos de interacción
3.1.2. Incorporación de la disipación y decaimiento ... 8
3.2. Implementación numérica ... 8
3.2.1. Paquetería OpenKet ... 9
Definición simbólica del espacio de Hilbert y operadores, Generación de EDOs y proyección de ecuación maestra, Integración temporal en GSL
3.2.2. Definición y extracción de observables físicos ... 10
Dinámica de poblaciones de los niveles atómicos, Número de fotones dentro de la cavidad
4 Calibración del modelo y dinámica de sistemas de referencia ... 12
4.1. Oscilaciones de Rabi en un átomo de dos niveles ... 12
4.2. Inyección y disipación de fotones en una cavidad vacía ... 14
4.3. Átomo de tres niveles ... 15
4.3.1. Desdoblamiento *vacuum Rabi* en régimen de acoplamiento fuerte ... 16
4.3.2. Interferencia cuántica y EIT ... 17
4.3.3. Eliminación adiabática del estado intermedio ... 19
Átomo aislado con dos campos clásicos en el espacio libre, Átomo acoplado a la cavidad óptica, AC Stark Shift
5 Dinámica de excitación colectiva y bloqueo de Rydberg ... 24
5.1. Dinámica colectiva ... 24
5.2. Bloqueo de Rydberg en la cavidad ... 26
6 Conclusiones ... 27
Bibliografía ... 28

1 INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

1.2. Objetivo

1.3. Estructura de la tesis

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Interacción luz-materia

2.1.1. *Átomo de dos niveles y la aproximación de onda rotante (RWA)*

2.1.2. *Cuantización del campo: Modelo de Jaynes-Cummings*

2.1.3. *Dressed states y fenómeno Autler Townes*

2.2. Entornos disipativos

2.2.1. *Operador densidad y pérdida de coherencia*

2.2.2. *Ecuación maestra de Lindblad*

2.3. Interacciones interatómicas y bloqueo de Rydberg

3 FORMULACIÓN DEL SISTEMA

En el presente capítulo se establece la formulación matemática del sistema bajo estudio, que consiste en dos átomos de cuatro niveles en cascada interactuando dentro de una cavidad óptica, realizando la construcción del Hamiltoniano total como la suma de las contribuciones de los Hamiltonianos de los subsistemas que lo componen e incluyendo las aportaciones energéticas individuales y los acoplamientos entre los subsistemas, y formulando finalmente los mecanismos disipativos que dictan la interacción del sistema con su entorno. El objetivo es obtener una descripción analítica que dicte la física de las simulaciones numéricas posteriores.

Debido a que la complejidad de los sistemas cuánticos de muchos niveles dificulta la búsqueda de soluciones analíticas exactas, esta investigación utiliza un enfoque computacional para la resolución del modelo que a continuación se formula. En la Sección 3.2. de este capítulo se detallan las técnicas numéricas utilizadas para resolver la ecuación maestra de Lindblad, describiendo el algoritmo de la simulación y las herramientas computacionales empleadas para la obtención de las propiedades físicas del sistema.

3.1. Descripción del sistema físico

El sistema que se estudia en este trabajo está conformado por dos átomos idénticos de cuatro niveles, confinados dentro de una cavidad óptica de un solo modo permitido. Los niveles de energía de los átomos se encuentran en configuración de cascada, y como los siguientes estados:

- $|g\rangle$: estado base
- $|e\rangle$: primer estado excitado
- $|s\rangle$: segundo estado excitado
- $|p\rangle$: estado altamente excitado (Rydberg)

Para la dinámica del sistema se usan dos campos externos: un láser de prueba cuya naturaleza es un bombeo que inyecta fotones a la cavidad a frecuencia ω_p y es considerado cuántico, y un láser de control clásico de intensidad constante y frecuencia ω_c que acopla los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$. La cavidad, a su vez, acopla la transición entre los niveles $|g\rangle$ y $|e\rangle$. La configuración descrita anteriormente queda representada en la Fig. 3.1. No existe ningún campo externo que acople directamente los niveles $|s\rangle$ y $|p\rangle$, pero la dinámica de este último nivel estará únicamente determinada por las interacciones interatómicas, que se modelan a través de términos de interacción de tipo dipolar y de tipo de intercambio.



Fig. 3.1

Diagrama de la interacción de un átomo de cuatro niveles con un campo de prueba con frecuencia ω_p que acopla los niveles $|g\rangle \to |e\rangle$ y un campo de control con frecuencia ω_c que acopla $|e\rangle \to |s\rangle$, así como decaimientos espontáneos γ_s y γ_e entre los niveles $|s\rangle \to |e\rangle$ y $|e\rangle \to |g\rangle$, respectivamente.

3.1.1. *Construcción del Hamiltoniano*

A partir de la dinámica descrita anteriormente, se construye el operador Hamiltoniano total ($\hat{H}$) del sistema. Este operador es el responsable de la evolución unitaria del mismo y se descompone como la suma de la energía de la cavidad, y las contribuciones individuales de cada átomo y de interacción entre ellos y con los campos externos.

Bajo la aproximación de onda rotante (RWA), $\hat{H}$ queda escrito como:

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}} + \hat{H}_{\text{atomos}} + \hat{H}_{\text{interaccion}} + \hat{H}_{\text{DR}} + \hat{H}_{\text{EE}}. \tag{3.1}$$

A continuación, se detalla el significado físico de cada uno de estos términos.

3.1.1.a *Dinámica de la cavidad y el campo de bombeo*

El campo EM de la cavidad se modela como un oscilador armónico cuántico. El Hamiltoniano libre de la cavidad, en un marco de referencia que rota a la frecuencia del láser de prueba (bombeo), queda escrito como:

$$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\Delta_p\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \tag{3.2}$$

donde $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$ son los operadores de creación y aniquilación de fotones, respectivamente, y $\Delta_p = \omega_p - \omega_{eg}$ es la desintonía (*detuning*) entre la frecuencia del campo de prueba y la distancia entre los niveles $|g\rangle$ y $|e\rangle$.

Luego, la inyección de fotones al sistema de la cavidad se describe mediante el Hamiltoniano de bombeo:

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = \hbar\Omega_p(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \tag{3.3}$$

donde Ω_p representa la intensidad (frecuencia de Rabi) del campo de prueba.

3.1.1.b *Energía atómica y acoplamiento átomo-láser*

La interacción de los átomos con los campos EM, dado por $\hat{H}_{\text{interaccion}}$ consta de dos partes: el acoplamiento cuántico con el modo de la cavidad y el acoplamiento clásico con el láser de control. Para el átomo k-ésimo, con $k = 1, 2$, se tiene:

$$\hat{H}_{\text{interaccion},k} = \hbar g\left(\sigma_{ge}^{(k)}\hat{a}^\dagger + \sigma_{eg}^{(k)}\hat{a}\right) - \hbar\frac{\Omega_c}{2}\left(\sigma_{es}^{(k)} + \sigma_{se}^{(k)}\right). \tag{3.4}$$

Aquí, g es la constante de acoplamiento átomo-cavidad, que dicta el intercambio de excitaciones entre la cavidad y la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, mientras que Ω_c es la intensidad del láser de control clásico aplicado a la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, y $\sigma_{ij}^{(k)}$ el operador $|i\rangle\langle j|$ del átomo k.

El Hamiltoniano libre para los dos átomos ($\hat{H}_{\text{atomos}} = \hat{H}_{A1} + \hat{H}_{A1}$) está dado por la suma de las energías de cada nivel atómico:

$$\hat{H}_{A,k} = E_g\sigma_{gg}^{(k)} + E_e\sigma_{ee}^{(k)} + E_s\sigma_{ss}^{(k)} + E_p\sigma_{pp}^{(k)} \tag{3.5}$$

donde las energías relativas de los niveles atómicos dependen de las desintonías del sistema (Δ_p, Δ_c), siendo $\Delta_c = \omega_c - \omega_{se}$ la desintonía entre la frecuencia del campo de control y la distancia entre los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$, y

- $E_g = 0$ (nivel de referencia)
- $E_e = E_g + \hbar\Delta_p$
- $E_s = E_e + \hbar\Delta_c$
- $E_p = E_s + \hbar$

3.1.1.c *Acoplamiento interatómiico y términos de interacción*

Cuando dos átomos se encuentran a distancias cortas, la interacción dipolo-dipolo provoca un desplazamiento en los niveles de energía [1]. Para describir correctamente el sistema, es necesario recurrir a dos mecanismos de interacción interatómica.

El primer término, $\hat{H}_{\text{DR}}$ (dipolar resonante), describe el intercambio resonante de excitaciones en la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$. Ocurre cuando los átomos están en niveles que permiten transferencia de energía interna, es decir, que una excitación salte de un átomo a otro de manera no radiativa:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{DR}} &= \hbar\frac{\Omega_{12}}{R^3}\left({\sigma_{ge}^{(1)}}^\dagger \otimes \sigma_{ge}^{(2)} + \sigma_{ge}^{(1)} \otimes {\sigma_{ge}^{(2)}}^\dagger\right) \\ &= \hbar\frac{\Omega_{12}}{R^3}(|eg\rangle\langle ge| + |ge\rangle\langle eg|)\end{aligned} \tag{3.6}$$

donde Ω_{12} es la fuerza de interacción del intercambio y R la distancia interatómica.

El segundo término, $\hat{H}_{\text{EE}}$ (estados excitados), es muy importante para este trabajo, ya que modela la fuerte interacción inducida cuando los átomos alcanzan niveles superiores. Aunque estos niveles no estén poblados, su existencia aún distorsiona los niveles del estado base [2]:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{EE}} &= \hbar\frac{C_3}{R^3}\left(\sigma_{sp}^{(1)} + {\sigma_{sp}^{(1)}}^\dagger\right) \otimes \left(\sigma_{sp}^{(2)} + {\sigma_{sp}^{(2)}}^\dagger\right) \\ &= \hbar\frac{C_3}{R^3}(|ps\rangle\langle sp| + |sp\rangle\langle ps|) + |ss\rangle\langle pp| + |pp\rangle\langle ss|)\end{aligned} \tag{3.7}$$

donde $C_3 \propto d^2$, siendo d el momento dipolar eléctrico de la transición, que representa la fuerza de interacción que acopla los estados doblemente excitados.

Físicamente, esta interacción provoca un desplazamiento simétrico $\Delta E = \pm\frac{C_3}{R^3}$ en los niveles de energía del estado colectivo [1]. Si este desplazamiento es mucho mayor que la frecuencia de Rabi ($C_3 \gg \Omega_c$), el sistema sale de resonancia [3] y la absorción del segundo fotón se vuelve energéticamente prohibida, dando lugar al fenómeno de bloqueo de excitación, que se manifiesta como una supresión de los estados doblemente excitados $|ss\rangle$ y $|pp\rangle$.

3.1.2. *Incorporación de la disipación y decaimiento*

Debido a que el sistema es abierto, ya que los espejos de la cavidad no son perfectos y los átomos intercatúan con el entorno, es necesario incluir los procesos de pérdida de fotones de la cavidad y el decaimiento atómico espontáneo.

Estas pérdidas de energía se introducen utilizando el formalismo de la Ecuación Maestra de Lindblad[1] para la matriz densidad $\hat{\rho}$:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{h}\left[\hat{H}, \hat{\rho}\right] + \kappa\mathcal{L}[\hat{a}] + \sum_{j=1,2}\left(\frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}^{(j)}\right] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{es}^{(j)}\right]\right) + \frac{\gamma_{12}}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}^{(1)} + \sigma_{ge}^{(2)}\right] \quad 3.8$$

donde el superoperador de Lindblad $\mathcal{L}$ se define como $\mathcal{L}\left[\hat{\mathcal{O}}\right] = 2\hat{\mathcal{O}}\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}^\dagger - \hat{\mathcal{O}}^\dagger\hat{\mathcal{O}}\hat{\rho} - \hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}^\dagger\hat{\mathcal{O}}$

El término proporcional a κ modela la fuga de fotones a través de los espejos de la cavidad, mientras que los términos con γ_e y γ_s representan el decaimiento espontáneo individual de cada átomo en las transiciones $|e\rangle \leftrightarrow |g\rangle$ y $|s\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, respectivamente.

Cuando la distancia entre los átomos es menor que la longitud de onda de la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, los átomos pueden emitir fotones de manera correlacionada y actúan como un sistema colectivo, generando efectos de superrradiancia o subradiancia en el sistema [4]. Esto se incluye mediante un término de decaimiento colectivo, γ_{12}, el cual actúa sobre el operador de salto conjunto $\left(\sigma_{ge}^{(1)} + \sigma_{ge}^{(2)}\right)$.

3.2. Implementación numérica

Para el sistema propuesto en este trabajo, el espacio de Hilbert total se construye como el producto tensorial de los subespacios individuales:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo1}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo2}}. \quad 3.9$$

Dado que cada átomo posee 4 niveles de energía, y el espacio de Fock de la cavidad debe ser truncado un número máximo de fotones, $N_{\max}$, la dimensión total del espacio de Hilbert es $D = 4^2 N_{\max}$. Por lo tanto, la matriz densidad $\hat{\rho}(t)$ contiene $D = (16N_{\max})^2$ elementos[2].

Para un truncamiento típico de $N_{\max} = 10$, el sistema requiere la resolución simultánea de $(160)^2 = 25,600$ ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) acopladas y con coeficientes complejos. Además, a medida que se incrementa el truncamiento $N_{\max}$ para

[1] Con el objetivo de mantener simple y general la ecuación maestra, en todas las simulaciones descritas en esta tesis se utlizaron unidades naturales, tal que $\hbar = 1$.

[2] En realidad, la dimensión final es $2D$, debido que cada elemento de la matriz densidad tiene una parte real y una parte imaginaria, que se operan como elementos independientes.

obtener resultados más precisos, la dimensión del espacio de Hilbert crece exponencialmente, lo que hace que la solución analítica sea inaccesible.

Por tanto, se hace necesario recurrir a métodos numéricos para resolver la dinámica del sistema. Sin embargo, aún así resolverlo directamente usando solamente un lenguaje interpretado como Python resulta lento y poco eficiente, por lo que se opta por una alternativa numérica más optimizada.

3.2.1. *Paquetería OpenKet*

Para la resolución numérica de la ecuación maestra de Lindblad se utilizó OpenKet, una paquetería desarrollada en Python y especializada en la manipulación de objetos cuánticos en notación de Dirac. La ventaja más importante de OpenKet es que permite definir el problema del sistema cuántico en lenguaje simbólico utilizando la notación de Dirac, y luego traducirlo a objetos numéricos listos para ser resueltos utilizando librerías como SciPy (de Python) o GSL (de C).

El flujo de trabajo en OpenKet se dividió en tres etapas descritas a continuación.

3.2.1.a *Definición simbólica del espacio de Hilbert y operadores*

Esta etapa consistió en construir las expresiones algebráicas que describen al sistema.

Primero, se definieron simbólicamente los estados base de cada subsistema mediante objetos tipo `Ket` y `Bra`, utilizando la notación de Dirac. La base ortonormal completa se generó con el producto tensorial de las bases individuales: $\{|i\rangle_{\mathrm{A1}} \otimes |j\rangle_{\mathrm{A2}} \otimes |N\rangle_{\mathrm{cav}}\}$, donde $i, j \in \{g, e, s, p\}$ y $N \in \{0, 1, 2, ..., N_{\max}\}$. De ahora en adelante, al elemento de la base completa lo denotaremos simplemente como $|l_1 l_2 n\rangle$, donde l_1 y l_2 es el nivel del átomo 1 y 2, respectivamente, y n el número de fotones dentro de la cavidad.

Luego, se instanciaron los operadores de creación ($\hat{a}^\dagger$) y aniquilación ($\hat{a}$), así como los operadores de transición atómica $\sigma_{ij}^{(k)} = |i\rangle_k\langle j|$. Y gracias a la capacidad de OpenKet de manejar objetos simbólicos, se pudo escribir el Hamiltoniano total $\hat{H}$ y los superoperadores de disipación $\mathcal{L}\left[\hat{\mathcal{O}}\right]$ de forma idéntica a sus expresiones analíticas (presentadas en la sección anterior), manteniendo las constantes de acoplamiento, desintonías y tasas de decaimiento como parámetros libres que se pueden modificar fácilmente para explorar diferentes regímenes del sistema.

3.2.1.b *Generación de EDOs y proyección de ecuación maestra*

Una vez definido el sistema en términos de objetos simbólicos, se utilizó la función `build_ode` de OpenKet para traducir la ecuación maestra de Lindblad a un sistema de EDOs acopladas. Esta función toma la expresión algebráica de $\dot{\hat{\rho}}$, calcula los conmutadores y productos de operadores, y proyecta el resultado sobre la base completa del espacio de Hilbert. Posteriormente, OpenKet genera de forma automática un archivo de código en lenguaje C que contiene el sistema de EDOs acopladas explícitamente desarrollado, y adicionalmente se genera un diccionario de mapeo (escrito en lenguaje Python), que vincula las variables simbólicas de Python con los índices del arreglo numérico en C.

3.2.1.c *Integración temporal en GSL*

Finalmente, se obtiene la evolución temporal del sistema a partir de un estado inicial puro, expresado simbólicamente y que es mapeado a una expresión numérica trabajable usando el diccionario creado en el paso anterior. Para este trabajo se estableció que el sistema inicia en el estado base absoluto, es decir, sin fotones en la cavidad y ambos átomos en su estado base $|g\rangle$:

$$\hat{\rho}(t_{=0}) = |gg0\rangle\langle gg0|. \tag{3.10}$$

La integración temporal se ejecutó a través del uso de la función `gsl_main`, la cual genera la función `main` de C para obtener el archivo final listo para ser compilado y ejecutado, utilizando la biblioteca *GNU Scientific Library (GSL)*. GSL aplica algoritmos de integración de paso adaptativo para resolver el sistema de EDOs de manera más precisa, y los resultados de la integración se exportaron a archivos de formato HDF5 para su posterior análisis.

3.2.2. ***Definición y extracción de observables físicos***

La matriz de densidad $\hat{\rho}(t)$ resultante de la integración numérica contiene toda la información estadística del sistema; sin embargo, para poder exprimir su sentido físico, es necesario traducirla a magnitudes físicas medibles calculando los valores esperados de los observables.

En OpenKet, el cálculo de un observable $\left\langle\hat{\mathcal{O}}\right\rangle = \mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}\right)$ se realiza definiendo primero el operador simbólico $\hat{\mathcal{O}}$ correspondiente, para así luego extraer su valor numérico en cada instante de tiempo usando las funciones `trace` y `sub_qexpr`. La función `sub_qexpr` mapea cada elemento del operador densidad $\hat{\rho}_{n,m} = \langle n|\hat{\rho}|m\rangle$, obtenidos tras evaluar analíticamente la traza $\mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}\right)$, hacia sus correspondientes índices en el arreglo numérico unidimensional resuelto por el integrador, utilizando el diccionario generado durante la compilación.

Para el análisis de la dinámica del sistema de estudio, se definieron los siguientes observables.

3.2.2.a *Dinámica de poblaciones de los niveles atómicos*

Para estudiar el fenómeno de bloqueo y la distribución de excitaciones, se calculó la probabilidad de encontrar al par de fotones en cada uno de los 16 estados atómicos posibles. El operador de proyeccion para el estado conjunto $|ij\rangle$, donde el átomo 1 está en el estado $|i\rangle$ y el átomo 2 en el $|j\rangle$, se define como $\mathcal{P}_{ij} = \sigma_{ii}^{(1)} \otimes \sigma_{jj}^{(2)} \otimes \mathbb{I}_{\mathrm{cav}}$.

La evolución temporal de la población está dada por:

$$\mathcal{P}_{ij}(t) = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}(t)\mathcal{P}_{ij}\right]. \tag{3.11}$$

3.2.2.b *Número de fotones dentro de la cavidad*

La respuesta de la configuración de dos átomos altera el estado del campo EM en la cavidad. Para cuantificar este efecto, se evaluó el número medio de fotones utilizando el operador de número $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, por lo tanto,

$$\left\langle \hat{N} \right\rangle (t) = \mathrm{Tr}\left[\hat{\rho}(t)\hat{a}^\dagger \hat{a}\right]. \tag{3.12}$$

Este observable permite constrastar la absorción y emisión de luz entre los átomos y la cavidad en el régimen de átomos independientes frente al de fuerte interacción interatómica, sirviendo así como evidencia del comportamiento colectivo del sistema.

4 CALIBRACIÓN DEL MODELO Y DINÁMICA DE SISTEMAS DE REFERENCIA

Antes de estudiar la dinámica acoplada de dos átomos interaccionando, es importante establecer la validez del método numérico implementado y definir las bases físicas que rigen el sistema principal. En este capítulo, se utiliza la paquetería OpenKet para analizar fenómenos cuánticos bien conocidos analíticamente. Dicha discusión se divide en dos etapas.

Primero, en las primeras dos secciones se aíslan los subsistemas más elementales: el átomo de dos niveles y el modo de cavidad disipativo, esto con el objetivo de garantizar que los términos del Hamiltoniano y los superoperadores de pérdida funcionan de manera precisa.

Posteriormente, en la Sección 4.3., se introduce un único átomo de cuatro niveles en la cavidad. A través del análisis de las poblaciones atómicas y del campo intracavidad, se caracterizarán fenómenos de interferencia cuántica como el desdoblamiento *vacuum Rabi*, el efecto Autler-Townes y la Transparencia Inducida Electromagnética (EIT). Esto nos permite obtener sistemas de referencia para lograr identificar la fenomenología nueva causada en nuestro sistema de interés al introducir un segundo átomo en el Capítulo 5.

4.1. Oscilaciones de Rabi en un átomo de dos niveles



Fig. 4.1

Diagrama de la interacción de un átomo de dos niveles en cuasiresonancia con un campo electromagético, con desintonía Δ.

El sistema cuántico de interacción luz-materia más elemental es un átomo de dos niveles (Fig. 4.1), interactuando con un campo electromagnético clásico. De acuerdo con la teoría clásica de interacción, ignorando efectos de decaimiento y bajo la aproximación de onda rotante (RWA), la probabilidad de encontrar al átomo en el estado excitado evoluciona en el tiempo y está dada analíticamente por la fórmula de Rabi [5, cap.4]:



Fig. 4.2

Evolución temporal de la probabilidad de excitación $P_e(t)$ para un átomo de dos niveles interactuando con un campo clásico, partiendo del estado base $|g\rangle$. Los marcadores cuadrados representan los resultados obtenidos numéricamente usando la integración de la ecuación maestra (ec. 4.16) con OpenKet, mientras que las líneas continuas corresponden a la solución analítica de la ec. 4.13. Se observan tres valores de desintonía: total resonancia $\Delta = 0.0$ (verde), y fuera de resonancia $\Delta = 2.0$ (morado), $\Delta = 4.0$ (naranja). El tiempo está normalizado respecto a la frecuencia de Rabi Ω_c, cuyo valor es $\Omega_c = 2.0$.

$$P_e(t) = \frac{\Omega_c^2}{\Omega_R^2} \sin^2\left(\frac{\Omega_R}{2} t\right) \tag{4.13}$$

donde Ω_c es la frecuencia de Rabi que caracteriza la intensidad de acomplamiento entre los niveles $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, y $\Omega_R = \sqrt{\Omega_c^2 + \Delta^2}$ es la frecuencia de Rabi generalizada, la cual depende de la desintonía Δ entre la frecuencia del láser y la frecuencia de transición atómica.

Para poder simular este sistema, se truncó el espacio de Hlbert a un sistema sin cavidad y de un solo átomo, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{átomo1}}$, del que se consideraron únicamente sus primeros dos niveles, aislando los términos correspondientes en el Hamiltoniano general (ec. 3.1). Así, los Hamiltonianos utilizado son

$$\hat{H}_{\text{atomos}} = \hbar \Delta \sigma_{gg} \tag{4.14}$$

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = -\frac{\hbar}{2} \Omega_c (\sigma_{eg} + \sigma_{ge}) \tag{4.15}$$

y, debido a que no se consideraron efectos de decaimiento, la ecuación maestra de Lindblad se reduce simplemente a la ecuación de Von Neumann:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar} \left[\hat{H}_{\text{atomos}} + \hat{H}_{\text{interaccion}}, \hat{\rho}\right] \tag{4.16}$$

con condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |g\rangle\langle g|$.

Como se observa en la Fig. 4.2, la integración numérica es bastante precisa con la solución analítica para todos los regímenes de desintonía evaluados. En el caso de total resonancia $\Delta = 0.0$, el sistema oscila perfectamente entre los valores 0 y 1 a una frecuencia dada puramente por Ω_c.

Al introducir desintonía no nula ($\Delta = 2.0$ y $\Delta = 4.0$), se observan dos efectos explicados por la teoría semiclásica [5, cap.4]: por un lado, la amplitud máxima de excitación es menor, disminuyendo drásticamente la probabilidad de que el átomo se encuentre excitado; y, por otro lado, la frecuencia de las oscilaciones aumenta conforme el sistema oscila a la frecuencia de Rabi generalizada Ω_R.

Esto valida que OpenKet logra simular correctamente los efectos de desintonía en el acoplamiento átomo-láser.

4.2. Inyección y disipación de fotones en una cavidad vacía

Ahora, el siguiente paso para la calibración del modelo es la implementación de términos no unitarios, es decir, la inyección y pérdida de excitaciones en un sistema abierto. Para ello, se realizó la simulación de un modo de cavidad en ausencia de átomos.

La dinámica de este sistema se rige por la *competencia* entre el bombeo externo (con intensidad Ω_p) que inyecta fotones al modo de la cavidad, y la tasa de decaimiento κ que modela la fuga de los fotones a través de los espejos.

Nuevamente, reducimos el espacio de Hilbert, pero ahora a un sistema de la cavidad sin átomos, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}}$, por lo que los términos sobrevivientes del Hamiltoniano de la ec. 3.1 son:

$$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\Delta\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \tag{4.17}$$

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = i\hbar\Omega_p\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right) \tag{4.18}$$

donde Δ en este contexto corresponde a la desintonía entre la frecuencia del láser de bombeo y la resonancia de la cavidad, por lo que la ecuación maestra que describe el proceso de esta subsección es:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}}, \hat{\rho}\right] + \frac{\kappa}{2}\mathcal{L}[\hat{a}] \tag{4.19}$$

y se usaron las condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |0\rangle\langle 0|$.

Analíticamente, el número medio de fotones dentro de la cavidad $\langle N\rangle(t)$ evoluciona hacia un estado estacionario dado por el balance entre la ganacia de fotones y la pérdida de estos. Si el sistema parte del vacío cuántico, la solución analítica establece que el campo dentro de la cavidad evoluciona como un estado coherente $|\alpha(t)\rangle$ [5, cap.8], cuya amplitud compleja está descrita por:

$$\alpha(t) = \alpha_{\text{ss}}\left(1 - e^{-(\frac{\kappa}{2}+i\Delta)t}\right) \tag{4.20}$$

donde $\alpha_{\text{ss}} = \frac{\Omega_p}{\frac{\kappa}{2}+i\Delta}$ es la amplitud del campo en el límite $t \to \infty$ [6, cap.7]. Por lo tanto, el número medio de fotones se calcula como $\langle N\rangle(t) = |\alpha(t)|^2$.



Fig. 4.3

Evolución temporal del número medio de fotones $\langle N \rangle$ en una cavidad bombeada con disipación, en calidad de resonancia $\Delta = 0$. Los marcadores cuadrados representan la simulación numérica obtenida de alimentar a OpenKet con la ec. 4.19, partiendo del estado de vacío $|0\rangle$, mientras que la línea continua representa la solución analítica dada por la ec. 4.20. El tiempo está normalizado respecto a la frecuencia de Rabi Ω_p. Los valores de los parámetros usados son: $\Omega_p = 1.0$, $\kappa = 1.0$, $N_{\max} = 15$, dando un valor de $|\alpha_{\text{ss}}|^2 = 4$.

Luego, para caracterizar la espectroscopía del sistema, se simuló su dinámica hasta alcanzar el estado estacionario ($t \to \infty$) para un barrido de valores de desintonía Δ. Como se muestra en la Fig. 4.4, el número medio de fotones dentro de la cavidad $\langle N \rangle_{\text{ss}}$ muestra una directa dependencia con respecto a Δ.



Fig. 4.4

Espectro de trasmisión de la cavidad vacía en el estado estacionario. Se grafica el número de fotones $\langle N \rangle_{\text{ss}}$ en función de la desintonía del campo de bombeo Δ. La curva describe una distrución Lorentziana, con un máximo de transmisión en resonancia perfecta $\Delta = 0$. La desintonía está normalizada respecto a la disipación κ. Los valores de los parámetros usados son $\Omega_p = 1.0$, $\kappa = 1.0$, $N_{\max} = 10$.

El perfil de la curva obtenida corresponde a una Lorentziana centrada en $\Delta = 0$, característica de una cavidad óptica [7, cap.1]. Es decir, la máxima inyección de fotones ocurre cuando el láser de bombeo y el modo de la cavidad están perfectamente sincronizados. Además, conforme aumenta la magntud de desintonía, $|\Delta| > 0$, la probabilidad de que un fotón ingrese a la cavidad disminuye de manera significativa.

El análisis de este fenómeno se vuelve importante para el del sistema posterior, ya que la modificación de esta curva al introducir la presencia de átomos será una evidencia del acoplamiento luz-materia del régimen de electrodinámica cuántica de cavidades.

4.3. Átomo de tres niveles

Ahora que hemos explicado la dinámica de los sistemas aislados, se procede a estudiar la respuesta de un único átomo de tres niveles ($|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$) dentro de la cavidad óptica bombeada. En esta configuración en cascada, al modo de la cavidad se le aplica un barrido de desintonía del láser de prueba, Δ_p, acoplando la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, y considerando que el láser de control y la transición superior $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ están en perfecta resonacia ($\Delta_c = 0$), como se muestra en la Fig. 4.5.



Fig. 4.5

Diagrama de la interacción de un átomo de tres niveles con un campo electromagético y en cuasiresonancia con la cavidad, con desintonía Δ_p.

La reducción del espacio de Hilbert para este sistema ahora solamente descarta la presencia del segunto átomo, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo1}}$, y en el Hamiltoniano se eliminan los términos relacionados con las interacciones interatómicas, por lo que queda como la suma de los Hamiltonianos considerados en Sección 4.1. y Sección 4.2. (ec. 4.14, ec. 4.15, ec. 4.17 y ec. 4.18):

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{atomos}} + \hat{H}_{\text{interaccion}} + \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}} \tag{4.21}$$

y a $\hat{H}_{\text{interaccion}}$ se le agrega el término de acoplamiento átomo-cavidad, reposicionando al láser de control Ω_c para aplicarse a los niveles $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$:

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = \hbar g\big(\sigma_{ge}\hat{a}^\dagger + \sigma_{eg}\hat{a}\big) - \frac{\hbar}{2}\Omega_c(\sigma_{se} + \sigma_{es}). \tag{4.22}$$

Luego, la ecuación maestra de Lindblad considera los efectos de disipación de la cavidad (κ) y decaimiento de los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$ (γ_e y γ_s, respectivamente):

$$\dot{\hat{\rho}} = -i\big[\hat{H}, \hat{\rho}\big] + \frac{\kappa}{2}\mathcal{L}[\hat{a}] + \frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\big[\sigma_{ge}\big] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}[\sigma_{es}] \tag{4.23}$$

Para analizar esta dinámica, se simuló el sistema utilizando la ec. 4.23 hasta alcanzar su estado estacionario, con condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |00\rangle\langle 00|$, y se realizó un barrido de la desintonía del bombeo, Δ_p, para observar el comportamiento de los estados excitados y la población de fotones en la cavidad.

La dinámica se dividirá en dos tipos de análisis, dados por la presencia o ausencia del láser de control clásico en la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, como a continuación se detalla.

4.3.1. *Desdoblamiento* vacuum Rabi *en régimen de acoplamiento fuerte*

Debido a que la constante de acoplamiento átomo-cavidad es mayor que las tasas de disipación ($g > \kappa, \gamma_e$), el sistema se encuentra en el régimen de acomplamiento fuerte.



Fig. 4.6

(a) Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de ocupación del primer estado excitado P_e (rosa) y en el segundo estado excitado P_s (beige); en función de la desintonía del láser de prueba Δ_p, para un átomo de cuatro niveles sometido a un láser de control apagado, donde se muestra un desdoblamiento *Vacuum-Rabi* [8]. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.1$, $\Omega_c = 0.0$, $g = 3.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.01$, $N_{\max} = 5$.

Cuando el láser de control está apagado, $\Omega_c = 0$, el sistema se reduce a un átomo de dos niveles interactuando con la cavidad, descrito por el modelo de Jaynes-Cummings [5, cap.4]. Debido al desdoblamiento *Vacuum-Rabi* [6, cap.11] ocasionado por el fuerte acoplamiento, los niveles de energía $|g\rangle$ y $|e\rangle$ se modifican y se convierten en los polaritones $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|g1\rangle \pm |e0\rangle$; así, el láser de prueba resuena ahora en estos dos eigenestados desplazados con el nuevo sistema átomo-cavidad formado. Como es de esperarse, la población del nivel superior $|s\rangle$ permanece en cero, ya que no existe ningún campo externo que acople el estado.

En la cavidad, la presencia del átomo destruye su resonancia central absorbiendo gran cantidad fotones eficientemente, por lo que dispersa y absorbe los fotones inyectados por el bombeo, e impide que la luz se acumule en la cavidad. La transmisión solamente se recupera en los valores de desintonía que corresponden a los eigenestados de los polaritones, lo que genera un espectro de doble pico.

4.3.2. *Interferencia cuántica y EIT*

A diferencia del sistema de *dos* niveles anterior, la presencia de más de una fuente de excitación permite que surjan fenómenos de interferencia cuántica y coherencia atómica, tales como el desdoblamiento de Autler-Townes y la Transparencia Inducida Electromagnética (EIT) [9]. En la figura Fig. 4.7 se muestra una alteración en la estructura de los niveles atómicos, como consecuencia de dichos fenómenos.



Fig. 4.7

(a) Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de ocupación del primer estado excitado P_e (rosa) y en el segundo estado excitado P_s (beige); en función de la desintonía del láser de prueba Δ_p, para un átomo de cuatro niveles sometido a un láser de control de gran intensidad en la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, que presenta EIT en resonancia $\Delta_p = 0$ y desdoblamiento de Autler-Townes en el estado $|e\rangle$, así como un pico de excitación máxima en el estado $|s\rangle$ debido a una transición resonante de dos fotones. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.1$, $\Omega_c = 2.0$, $g = 3.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.01$, $N_{\max} = 5$.

Al activar el láser de control, el fuerte acoplamiento entre los estados $|e\rangle$ y $|s\rangle$ provoca la formación de los *dressed states*, forzando al átomo a oscilar rápidamente entre ellos. Los estados originales se mezclan para formar dos nuevos eigenestados $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e\rangle \pm |s\rangle)$ del Hamiltoniano, cuyas energías se encuentran desplazadas una cantidad proporcional a $\pm\left(\frac{\Omega_c}{2}\right)$, generando un desdoblamiento de Autler-Townes [10].

Además, la probabilidad de encontrar al átomo en el estado intermedio $|e\rangle$ decae a cero en $\Delta_p = 0$ como consecuencia de la interferencia cuántica destructiva. Las amplitudes de probabilidad de los dos caminos de excitación $|g\rangle \to |e\rangle$ (directo) y $|g\rangle \to |e\rangle \to |s\rangle \to |e\rangle$ (inducido por el láser de control) se encuentran desfasadas por 180°, cancelándose entre sí. Debido a ello, el átomo no puede absorber fotones de la cavidad en ese estado y se vuelve transparente (EIT).

Por otro lado, la población del estado superior, P_s, muestra un pico máximo exactamente en el punto de transparencia de P_e. Aunque el estado $|e\rangle$ está bloqueado por la interferencia destructiva, el sistema en conjunto cumple la condición de resonancia para una transición simultánea de dos fotones [11], uno dado por la cavidad y otro por el láser de control, por lo que el electrón es transferido de forma directa desde el estado base $|g\rangle$ hasta el estado superior $|s\rangle$, formando un *dark state*.

A diferencia de la configuración Λ en que los dos estados base suelen ser estables, en sistemas cascada el estado $|s\rangle$ decae emitiendo un fotón, lo que destruye la coherencia y diluye la transparencia [10]. Sin embargo, como $\gamma_s \ll 1$ (i.e. asumimos un modelo de átomos de Rydberg), el estado altamente excitado $|s\rangle$ tiene un tiempo de vida suficiente

para sentir el bloqueo antes de que el átomo caiga espontáneamente, permitiendo que la coherencia sobreviva, por lo tanto que existan *dark states* metaestables y una transparencia casi total [12].

En la cavidad, la curva muestra también una estructura de tres picos. Los dos picos anchos de los laterales corresponden al acoplamiento de la luz con los *dressed states*. Y el tercero, donde antes había un valle de máxima absorción en $\Delta_p = 0$, ahora corresponde a un máximo de transmisión. Esto confirma macroscópicamente la existencia del *dark state* donde el átomo pierde su capacidad de absorción en la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$. Al volverse ópticamente transparente, el átomo deja de disipar la energía de la cavidad, permitiendo que el bombeo externo lo llene nuevamente de manera eficiente.

El análisis del capítulo anterior nos permitió establecer una base constructiva de los fenómenos dados con átomos en cavidades. Sin embargo, en experimentos reales como los reportados por [13], la excitación directa desde el estado base $|g\rangle$ hasta un estado altamente excitado de Rydberg $|s\rangle$ presenta dificultades técnicas, donde generalmente este proceso requiere láseres de alta potencia y frecuencias específicas, lo que puede resultar en una implementación experimental complicada.

Para superar esta limitación, se recurre a excitaciones de múltiples fotones, en donde se acopla el estado base $|g\rangle$ con el estado de Rydberg $|s\rangle$ a través de un estado intermedio $|e\rangle$, utilizando dos láseres en configuración cascada. Sin embargo, el costo de esta técnica es el rápido decaimiento espontáneo asociado al nivel $|e\rangle$ (γ_e), el cual destruye la coherencia del sistema antes de que las interacciones interatómicas de Rydberg puedan presentarse. En este capítulo, se implementa la técnica de eliminación adiabática para suprimir dicha decoherencia, estudiaremos diversos fenómenos relacionados con esta técnica y, finalmente, se analizará el fenómeno de bloqueo de excitación en el sistema acoplado de dos átomos de cuatro niveles.

4.3.3. *Eliminación adiabática del estado intermedio*

La estrategia usada para poblar de manera coherente el estado de Rydberg $|s\rangle$ sin tener pérdidas radiativas del nivel intermedio $|e\rangle$, consiste en operar al sistema en un régimen de desintonía muy grande (*large detuning*) [CITAR AKI].



Fig. 4.8

Diagrama de la interacción de un átomo de tres niveles con desintonías Δ_p y Δ_c con los niveles atómicos.

El esquema físico, mostraso en la Fig. 4.8, se configuró tal que ambos láseres tengan una desintonía idéntica, Δ, pero de signo opuesto respecto al nivel $|e\rangle$, es decir, $\Delta = \Delta_p = -\Delta_c$, de manera que la transición de dos fotones $|g\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ mantenga la resonancia exacta. Esta aproximación de eliminación adiabática es válida solamente en

el régimen de *large detuning* donde la desintonía es mucho mayor que las tasas de disipación del sistema ($\Delta \gg \kappa, \gamma_e, \gamma_s$). Así, el nivel intermedio $|e\rangle$ se vuelve virtual y su función es solamente mediar la transición, por lo que su población es despreciable. Matemáticamente, esto permite que el átomo se comporte como un sistema de dos niveles $|g\rangle$, $|s\rangle$.

Dado que los campos EM intensos inducen desplazamientos de energía en los niveles de energía atómicos (*AC Stark shift*) [CITAR AKI - cohen atom photom], el sistema sufre una perturbación adicional. El estado base $|g\rangle$ y el de Rydberg $|s\rangle$ son afectados por corrimientos proporcionales a $S_g = \frac{\Omega_p^2}{4\Delta}$ y $S_s = \frac{\Omega_c^2}{4\Delta}$, respectivamente, lo que lleva a una pérdida de resonancia en la transición de dos fotones. Por ello, en la simulación numérica se tiene que aplicar una compensación de dichos desplazamientos ajustando las frecuencias de los láseres, tales que

$$\Delta_p = \Delta + S_g, \tag{4.24}$$

$$\Delta_c = -\Delta + S_s. \tag{4.25}$$

Para exponer numéricamente estos efectos, se simuló en OpenKet la dinámica de un solo átomo de tres niveles ($|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$) bajo dos configuraciones: primero, un átomo aislado interactuando con dos campos clásicos en el espacio libre; y segundo, un átomo dentro de la cavidad óptica acoplada a un campo de bombeo.

4.3.3.a *Átomo aislado con dos campos clásicos en el espacio libre*

El primer caso corresponde a un átomo aislado ($\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{átomo1}}$), donde un láser de prueba (clásico y débil) acopla la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, y un láser de control (clásico y fuerte) acopla la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$. El Hamiltoniano de interacción semiclásico para este sistema es:

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = -\frac{\hbar}{2}\{\Omega_p(\sigma_{ge} + \sigma_{eg}) + \Omega_c(\sigma_{es} + \sigma_{se})\} \tag{4.26}$$

y la ecuación maestra de Lindblad con términos de decaimiento para el nivel intermedio $|e\rangle$ y el estado de Rydberg $|s\rangle$:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{\text{atomos}} + \hat{H}_{\text{interaccion}}, \hat{\rho}\right] + \frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}\right] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}[\sigma_{es}]. \tag{4.27}$$

Como el sistema se encuentra fuertemente desintonizado, la teoría de perturbaciones explica que el átomo oscila entre los estados de los extremos, con una frecuencia de Rabi efectiva de dos fotones [CITAR AKI] dada por:

$$\Omega_{\text{eff}} \approx \frac{\Omega_p \Omega_c}{2\Delta} = 0.05 \tag{4.28}$$



Fig. 4.9

Evolución temporal de las poblaciones atómicas en el régimen de eliminación adiabática. Se observa que la población del estado intermedio P_e (rosa) permanece en cero a lo largo de la evolución, mientras que el átomo muestra oscilaciones de Rabi entre el estado base $|g\rangle$ y el estado de Rydberg $|s\rangle$ (beige), comportándose como un sistema de dos niveles efectivo. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $\Delta = 100.0$, $\gamma_e = 0.0$, $\gamma_s = 0.0$.

Veamos en la Fig. 4.9 que, a pesar de que existe un acoplamiento entre los estados $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ y $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ de manera directa, el estado intermedio $|e\rangle$ no presenta población significativa, lo que demuestra físicamente que el electrón no transita por ese estado. Este resultado confirma que el sistema atómico se ha reducido a un modelo de dos niveles con probabilidad de excitación $P_s(t) = \sin^2\left(\frac{\Omega_{\text{eff}}}{2}t\right)$.

4.3.3.b *Átomo acoplado a la cavidad óptica*

Una vez que se ha validado la eliminación adiabática en el átomo aislado, ahora se introduce el modo de la cavidad ($\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{átomo1}} \otimes \hat{H}_{\text{cavidad}}$). En esta configuración, la cavidad reemplaza al láser de prueba clásico, acomplando la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ con un acoplamiento de Jaynes-Cummings g, y es alimentado por el láser de prueba externo de intensidad Ω_p. El láser intenso de control que acopla $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ se mantiene sin cambios. Por lo tanto, el Hamiltoniano total y la ecuación maestra de Lindblad para este sistema son los mismos que los usados en ec. 4.21 y ec. 4.23, respectivamente, pero con los términos de interacción y disipación correspondientes a esta nueva configuración.

Debido a que el nivel $|e\rangle$ está suprimido adiabáticamente, la interacción efectiva ya no ocurre entre el átomo de dos niveles aislado y el modo de la cavidad, sino que ahora el modo de la cavidad interactúa con la transición de dos fotones $|g\rangle \leftrightarrow |s\rangle$. El sistema se reduce a un modelo de Jaynes-Cummings efectivo con una frecuencia de acoplamiento dada por [CITAR AKI]:

$$g_{\text{eff}} \approx \frac{g\Omega_c}{2\Delta} \tag{4.29}$$

Para los parámetros usados, este acomplamiento es $g_{\text{eff}} = 1.5\kappa$, lo que coloca al sistema en el régimen de acoplamiento fuerte cooperativo. Se simuló la respuesta estacionaria conforme el barrido de δ_p alrededor de la desintonía $\Delta = 100$.



Fig. 4.10

(a) Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de excitación atómica del nivel intermedio P_e (rosa) y el nivel de Rydberg P_s (beige), para el sistema átomo-cavidad bajo eliminación adiabática, en función de la variación δ de la desintonía alrededor de $\Delta_p = 100$. Se exhibe un desdoblamiento asimétrico de los estados luz-materia. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $N_{\max} = 3$.

Como se observa en Fig. 4.10, el estado intermedio permanece suprimido a lo largo del barrido, lo que confirma que, incluso en el régimen de acoplamiento fuerte con la cavidad ($g > \kappa$), el sistema de 3 niveles continúa comportándose efectivamente como uno de dos niveles; y el electrón no experimenta las pérdidas asociadas a γ_e.

Sin embargo, se puede notar claramente la nueva presencia de dos picos de resonancia asimétricos y desplazados del origen, causado por los ya conocidos polaritones del desdoblamiento *Vacuum Rabi* efectivo [CITAR AKI] y los corrimientos Stark inducidos por la grande desintonía. Por un lado, el láser de control fuerte desplaza el nivel $|s\rangle$ una cantidad de $S_s = 1.0\kappa$; y por otro lado, las fluctuaciones del vacío en la cavidad empujan al nivel $|g\rangle$, desplazando la resonancia efectiva una cantidad $S_g = \frac{g^2}{\Delta} = 2.25\kappa$

La desalineación de la energía entre la cavidad y el átomo *vestido* por el láser ($S_s \neq S_g$) rompe la degeneración de dichos polaritones [CITAR AKI], generando una asimetría en la amplitud de los picos. El pico izquierdo ($\delta_p/\kappa \approx -0.5$) se encuentra más cerca de la resonancia atómica desplazada, por lo que tiene mayor carácter de excitación material (polaritón tipo atómico), y que se refleja en una alta probabilidad de encontrar al átomo en el estado $|s\rangle$ con un menor número de fotones en la cavidad. De forma inversa, el pico derecho ($\delta_p/\kappa \approx 2.5$) tiene un mayor carácter fotónico (polaritón tipo luz), maximizando la transmisión dentro de la cavidad mientras que el nivel de excitación del átomo decrece.

Analíticamente, la separación entre los polaritones [CITAR AKI] está descrita por la diferencia de los corrimientos y el acoplamiento efectivo:

$$d_{1\mathrm{at}} = \sqrt{\left(S_s - S_g\right)^2 + 4g_{\mathrm{eff}}^2} \approx 3.25\kappa \tag{4.30}$$

La contracción mostrada en la Fig. 4.10 es causada por la disipación κ que tiende a jalar las resonancias hacia el centro [CITAR AKI].

Finalmente, debido al fuerte acoplamiento del láser de control, la resonancia efectiva de dos fotones es desplazada y ya no se encuentra en el origen $\delta_p = 0$ [CITAR AKI]. Mientras que la frecuencia de resonancia intrínsieca de la cavidad permanece sin alteraciones, el desplazamiento S_s hace que el sistema híbrido deba compensar esa energía extra, moviendo el centro del espectro hacia la derecha, por lo que la resonancia se encuentra en $\delta_p \approx 1$.

4.3.3.c *AC Stark Shift*

5 DINÁMICA DE EXCITACIÓN COLECTIVA Y BLOQUEO DE RYDBERG

5.1. Dinámica colectiva

El siguiente paso es introducir un segundo átomo idéntico en la cavidad óptica.En esta sección, asumiremos que la distancia nuclear entre ambos átomos es lo suficientemente grande para que cualquier interacción directa (dipolo-dipolo o Van der Waals) sea nula ($\Omega_{12} = C_3 = 0$). Así, la única vía de comunicación entre los átomos es el campo electromagnético compartido por la cavidad.

En un modelo semiclásico, dos átomos que son independientes absorben y emiten luz de forma no correlacionada [CITAR AKI]. Sin embargo, de acuerdo con el modelo de Tavis-Cummings [CITAR AKI] (que representa la generalización del modelo de Jaynes-Cummings para un modelo de dos átomos idénticos acoplados a un modo de cavidad), el sistema no interactúa con los átomos individualmente, sino con un momento dipolar colectivo. Cuando están dentro del volumen de una cavidad en acoplamiento fuerte, el sistema no puede distinguir qué átomo específico ha absorbido o emitido un fotón; los dos átomos en el estado base $|gg\rangle$ absorben un fotón de forma no localizada, formando una excitación simétrica llamada estado superradiante de Dicke:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|sg\rangle + |gs\rangle) \tag{5.31}$$

La consecuencia de esto es que la fuerza de acoplamiento efectiva entre el par de átomos y la cavidad se multiplican por un factor $\sqrt{N_{\text{at}}}$, donde N_{at} es el número de átomos. Por tanto, en el caso específico de dos átomos $N_{\text{at}} = 2$, se esperaría que el desdoblamiento de los polaritones se amplifique un factor de $\sqrt{2} \approx 1.41$.

Por otro lado, la superposición antisimétrica y ortogonal $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|sg\rangle - |gs\rangle)$, llamado estado subradiante, posee un momento dipolar neto igual a cero [CITAR AKI], por lo que la cavidad no puede acceder a él (es decir, es oscuro a la luz de la cavidad) y la dinámica se restringe únicamente al ocasionado por el estado superradiante $|+\rangle$.

Ahora que hemos introducido el segundo átomo, el espacio de Hilbert utilizado ya no está truncado y corresponde exactamente al discutido en la Sección 3.2., dado por la ec. 3.9, así como la ecuación maestra de Lindblad de la ec. 3.8 utilizando el Hamiltoniano total (ec. 3.1). Para visualizar la dinámica de la superposición coherente, se realizó un barrido de la sonda δ_p de la sección anterior, pero ahora sobre la base extendida a dos átomos.



Fig. 5.1

Espectroscopía del sistema de dos átomos acoplados a la cavidad en ausencia de interacción de Rydberg ($C_3 = 0$). **(a)** Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de encontrar una sola excitación P_s (beige), que corresponde a $P_{sg} + P_{gs}$, y probabilidad de excitacion doble P_{ss} (verde). Se observa una separación de las resonancias más estrecha en comparación con el caso de un solo átomo. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $C_3 = 0$, $N_{\max} = 3$.

Al analizar la separación entre los picos de transmisión, se esperaría que el desdoblamiento de los picos medido en la sección anterior (3.09κ) se incremente por el factor $\sqrt{2}$, dando como resultado $d_{2\text{at}} \approx 4.35\kappa$. Sin embargo, la espectroscopía de la Fig. 5.1 muestra una separación de 5.6κ, que representa un factor de ensanchamiento de ~1.81.

Esta diferencia es causada por los corrimientos Stark colectivos del sistema, ya que el campo vacío de la cavidad induce un desplazamiento en el nivel $|g\rangle$. Al introducir el segundo átomo en la cavidad, ambos átomos contribuyen de forma simultánea a este corrimiento cuando el sistema se encuentra en el estado $|gg\rangle$. Por tanto, el desplazamiento se duplica [CITAR AKI] $2S_g = 2\frac{g^2}{\Delta} = 4.5\kappa$, mientras que el desplazamiento de $|s\rangle$ se mantiene igual $S_s = 1.0\kappa$ ya que el estado superradiante contiene una excitación compartida.

Así, finalmente obtenemos analíticamente la distancia de los picos como:

$$d_{2\text{at}} = \sqrt{\left(2S_g - S_s\right)^2 + 4\left(\sqrt{2}g_{\text{eff}}\right)^2} \approx 5.5\kappa \tag{5.32}$$

Por otro lado, la Fig. 5.1 también muestra que, al no existir interacción entre los átomos, el sistema es capaz de absorber dos fotones a la vez; la curva verde muestra que el estado doblemente excitado $|ss\rangle$ tiene una probailidad de $P_{ss} \approx 0.25$ en el pico izquierdo. Por lo tanto, se confirma que los átomos operan de forma independiente entre sí.

5.2. Bloqueo de Rydberg en la cavidad

6 CONCLUSIONES

Parte 0.6

BIBLIOGRAFÍA

[1] P. Pillet *et al.*, «Controllable interactions between Rydberg atoms and ultracold plasmas», *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 194, n.º 1, p. 12066, nov. 2009, doi: 10.1088/1742-6596/194/1/012066.

[2] C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, y G. Grynberg, Eds., *Atom-photon interactions: basic processes and applications*. en A Wiley-Interscience publication. New York, NY: Wiley, 2008. doi: 10.1002/9783527617197.

[3] T. Vogt, M. Viteau, A. Chotia, J. Zhao, D. Comparat, y P. Pillet, «Electric-Field Induced Dipole Blockade with Rydberg Atoms», *Physical Review Letters*, vol. 99, n.º 7, p. 73002, ago. 2007, doi: 10.1103/PhysRevLett.99.073002.

[4] H.-P. Breuer y F. Petruccione, *The theory of open quantum systems*. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2002.

[5] C. C. Gerry y P. Knight, *Introductory quantum optics*. Cambridge, UK New York: Cambridge University Press, 2005.

[6] D. F. Walls y G. J. Milburn, *Quantum optics*, 2nd ed. Berlin: Springer, 2008.

[7] H. J. Carmichael, *Statistical Methods in Quantum Optics 1*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1999. doi: 10.1007/978-3-662-03875-8.

[8] M. Mücke *et al.*, «Electromagnetically induced transparency with single atoms in a cavity», *Nature*, vol. 465, n.º 7299, pp. 755-758, jun. 2010, doi: 10.1038/nature09093.

[9] M. Fleischhauer, A. Imamoglu, y J. P. Marangos, «Electromagnetically induced transparency: Optics in coherent media», *Reviews of Modern Physics*, vol. 77, n.º 2, pp. 633-673, jul. 2005, doi: 10.1103/RevModPhys.77.633.

[10] S. Khan, V. Bharti, y V. Natarajan, «Role of dressed-state interference in electromagnetically induced transparency», *Physics Letters A*, vol. 380, n.º 48, pp. 4100-4104, dic. 2016, doi: 10.1016/j.physleta.2016.10.030.

[11] V. Bharti, A. Wasan, y V. Natarajan, «Wavelength mismatch effect in electromagnetically induced absorption», *Physics Letters A*, vol. 380, n.º 31–32, pp. 2390-2394, jul. 2016, doi: 10.1016/j.physleta.2016.05.038.

[12] J. Gea-Banacloche, Y.-q. Li, S.-z. Jin, y M. Xiao, «Electromagnetically induced transparency in ladder-type inhomogeneously broadened media: Theory and experiment», *Physical Review A*, vol. 51, n.º 1, pp. 576-584, ene. 1995, doi: 10.1103/PhysRevA.51.576.

[13] A. Gaëtan *et al.*, «Observation of collective excitation of two individual atoms in the Rydberg blockade regime», *Nature Physics*, vol. 5, n.º 2, pp. 115-118, feb. 2009, doi: 10.1038/nphys1183.