

Raport z Analizy Statystycznej

Bayesowska analiza przeżycia róż: ocena skuteczności związków chemicznych w badaniu głównym



Wersja dokumentu	1.0
Data	27 czerwca 2026
Autorzy	Julia Czyż, Urszula Skuńczyk, Paulina Włodarczyk
Afiliacja	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej
Odniesienie do SAP	Plan Analizy Statystycznej, wersja 1.1

Spis treści

1	Streszczenie	2
2	Dane i przetwarzanie danych	2
2.1	Źródło danych	2
2.2	Przetwarzanie danych	2
2.3	Charakterystyka danych	2
3	Specyfikacja modelu	3
3.1	Model Weibulla	3
3.2	Rozkłady a priori	4
3.3	Ustawienia MCMC	4
4	Diagnostyka zbieżności łańcuchów MCMC	4
4.1	Wykresy przebiegu łańcuchów (trace plots)	5
4.2	Autokorelacja wewnątrz łańcuchów	5
4.3	Wykresy rang	5
5	Wyniki analizy głównej	8
5.1	Ocena dopasowania modelu – posterior predictive check	8
5.2	Rozkłady a posteriori parametrów modelu	9
5.3	Pierwszorzędowy punkt końcowy: ranking związków	10
5.4	Drugorzędowe punkty końcowe: prawdopodobieństwa przeżycia	11
5.4.1	Przeżycie przez typowy czas podróży ($t = 10$ dni)	11
5.4.2	Przeżycie przez maksymalny czas podróży ($t = 22$ dni)	11
6	Analiza wrażliwości	12
7	Dyskusja	12
7.1	Zasadność wyboru rozkładu Weibulla	12
7.2	Wpływ rozkładów a priori	13
7.3	Ograniczenia analizy	13
7.4	Dodatkowe uwagi	14
8	Wnioski	14

1 Streszczenie

Niniejszy raport przedstawia wyniki bayesowskiej analizy przeżycia przeprowadzonej w celu identyfikacji związku chemicznego, który zapewni najdłuższy czas przeżycia kwiatu podczas transportu morskiego. Analizie z wykorzystaniem parametrycznego modelu Weibulla poddano 1920 jednostek eksperymentalnych (róż). Do dopasowania modelu wykorzystano pakiet **brms** [1]. W wyniku analizy stwierdzono, że związkiem chemicznym najefektywniej wydłużającym czas przeżycia kwiatu jest związek 6 – *Essence of Epiphaneia*, dla którego mediana a posteriori wyniosła: 20,5 dnia (95% CrI: [19,7; 21,3]). Prawdopodobieństwo przeżycia kwiatu przez typowy czas podróży (10 dni) wynosi dla tego związku 97,1%, natomiast dla maksymalnego czasu podróży (22 dni) – 38,7%. Wszystkie łańcuchy MCMC osiągnęły zbieżność zgodnie z przyjętymi kryteriami.

2 Dane i przetwarzanie danych

2.1 Źródło danych

Dane do analizy głównej pochodziły z pliku `roses_analysis2_final.csv`. Schemat eksperymentu, definicje zmiennych oraz procedury przetwarzania danych zostały szczegółowo opisane w Planie Analizy Statystycznej (sekcje 2–3).

2.2 Przetwarzanie danych

Surowe dane o charakterze longitudinalnym przekształcono do postaci, w której dla każdej jednostki eksperymentalnej zachowano wyłącznie ostatni zarejestrowany pomiar czasu przeżycia (`time`). Ze względu na specyfikę implementacji modelu Weibulla w pakiecie **brms**, która uniemożliwia wprowadzenie obserwacji z czasem przeżycia równym 0, w przypadku takich jednostek za wartość zmiennej `time` przyjęto 0,5 dnia.

2.3 Charakterystyka danych

Zgodnie z założeniami w SAP (sekcja 2.5) dotyczącymi dostępności materiału eksperymentalnego, finalny zbiór danych obejmował pomiary dla 1920 jednostek eksperymentalnych, rozmieszczonych równomiernie w 48 komórkach eksperymentalnych (12 związków $\times$ 2 gatunki $\times$ 2 ogrody), po 40 kwiatów na każdą komórkę oraz 160 kwiatów dla każdego związku. Statystyki opisowe dla analizowanych związków zestawiono w Tabeli 1. Globalny odsetek obserwacji cenzurowanych wyniósł 1,9% (36 jednostek), a najwyższy odsetek cenzurowania zaobserwowano dla związku 6, dla którego wyniósł on 12,5%.

Tabela 1: Charakterystyka zbioru danych badania głównego według związku.

ID	Nazwa związku	n	Liczba zdarzeń	Cenzur.	Cenzur. (%)	Mediana KM (dni)
1	Distilled Water (kontrola)	160	160	0	0,0%	9,0
4	Concentrate of Caducues	160	160	0	0,0%	18,0
5	Distillate of Discovery	160	157	3	1,9%	20,0
6	Essence of Epiphanea	160	140	20	12,5%	17,0
7	Four in December	160	155	5	3,1%	12,5
8	Granules of Geheref	160	159	1	0,6%	20,0
9	Kar-Hamel Mooh	160	160	0	0,0%	15,0
11	Noospherol	160	160	0	0,0%	20,0
12	Oil of John's Son	160	160	0	0,0%	19,5
13	Power of Perlimpinpin	160	160	0	0,0%	20,0
14	Spirit of Scienza	160	154	6	3,8%	16,5
15	Zest of Zen	160	159	1	0,6%	17,0
Łącznie		1920	1884	36	1,9%	–

3 Specyfikacja modelu

Pełna specyfikacja modelu określona została w SAP (sekcja 5). Poniżej zaś przedstawiono skrótowy opis modelu na potrzeby niniejszego raportu.

3.1 Model Weibulla

Czas przeżycia T_i każdej i -tej róży modelowano parametrycznie przy użyciu rozkładu Weibulla:

$$T_i \sim \text{Weibull}(k, \lambda_i), \quad S(t \mid k, \lambda_i) = \exp\left[-\left(\frac{t}{\lambda_i}\right)^k\right] \quad (1)$$

Oczekiwany czas przeżycia modelowano na skali logarytmicznej:

$$\log \mathbb{E}[T_i] = \beta_0 + \alpha_{c(i)} + \gamma_{s(i)} + \delta_{g(i)} \quad (2)$$

gdzie β_0 to wyraz wolny, $\alpha_{c(i)}$ to efekt stały związku c ($\alpha_1 = 0$ dla grupy kontrolnej), $\gamma_{s(i)}$ to efekt stały gatunku ($\gamma_1 = 0$ dla gatunku referencyjnego) oraz $\delta_{g(i)}$ to efekt stały ogrodu ($\delta_1 = 0$ dla ogrodu referencyjnego). Dla rozkładu Weibulla oczekiwany czas przeżycia wynosi $\mathbb{E}[T_i] = \lambda_i \cdot \Gamma(1 + \frac{1}{k})$ [2], stąd parametr skali dla związku c (przyjmując referencyjne poziomy gatunku i ogrodu) wyznaczany jest jako $\lambda_c = \exp(\beta_0 + \alpha_c) / \Gamma(1 + \frac{1}{k})$ [3].

Uśredniając po próbkach z rozkładu a posteriori, otrzymujemy estymowaną medianę czasu przeżycia dla związku c . Górny indeks (s) oznacza wartość parametru w s -tej iteracji MCMC (łącznie próbek a posteriori $S = 4000$):

$$\widehat{\text{Me}}_c = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \lambda_c^{(s)} \cdot (\ln 2)^{\frac{1}{k}^{(s)}}, \quad \lambda_c^{(s)} = \frac{\exp(\beta_0^{(s)} + \alpha_c^{(s)})}{\Gamma(1 + \frac{1}{k}^{(s)})} \quad (3)$$

Efekty α_c interpretowane są jako logarytm ilorazu średnich czasów przeżycia: $\exp(\alpha_c)$ jest czynnikiem, o jaki zmienia się czas przeżycia kwiatu pod wpływem związku c względem grupy kontrolnej $c=1$.

3.2 Rozkłady a priori

Kalibracji rozkładów a priori dokonano na podstawie danych pilotażowych (szczegóły w SAP sekcja 5.3). W wyniku tego procesu otrzymano następujące informacyjne rozkłady a priori dla parametrów modelu:

$$k \sim \text{Gamma}(15,466; 3,544) \quad (4)$$

$$\beta_0 \sim \mathcal{N}(2,918; 0,362) \quad (5)$$

$$\alpha_c, \gamma_s, \delta_g \sim \mathcal{N}(0; 0,24) \quad (6)$$

3.3 Ustawienia MCMC

Model dopasowano wykorzystując cztery niezależne łańcuchy Markowa. Zgodnie z przyjętymi w SAP założeniami (sekcja 7.1) dla każdego łańcucha wykonano 2000 iteracji, w tym 1000 iteracji przypadających na fazę rozgrzewania (ang. *warmup*). W wyniku dopasowania uzyskano łącznie 4000 próbek z rozkładu a posteriori. Jako backend próbkowania wykorzystano pakiet `cmdstanr` [4], który w porównaniu z domyślnym backendem `rstan` zapewnia szybszą kompilację modelu oraz dostęp do aktualnych optymalizacji algorytmu próbkowania.

4 Diagnostyka zbieżności łańcuchów MCMC

Zbieżność łańcuchów oceniono na podstawie statystyki $\hat{R}$ oraz efektywnej liczebności próby (Bulk-ESS i Tail-ESS) zgodnie z kryteriami [5]: $\hat{R} < 1,01$, Bulk-ESS > 400 , Tail-ESS > 400 (szczegóły w SAP sekcja 7.2). Wyniki diagnostyki dla wszystkich parametrów modelu zestawiono w Tabeli 2.

Wszystkie parametry modelu spełniły przyjęte kryteria zbieżności, przy czym maksymalna wartość $\hat{R}$ wyniosła 1,0023 (dla α_8), minimalna wartość Bulk-ESS wyniosła 1080 (dla β_0), a minimalna wartość Tail-ESS wyniosła 1791 (dla β_0). Wyniki te świadczą o braku problemów ze zbieżnością łańcuchów, prawidłowym ich mieszaniu oraz efektywnym próbkowaniu z rozkładu a posteriori.

Tabela 2: Diagnostyka zbieżności łańcuchów MCMC.

Parametr	Opis	$\hat{R}$	Bulk-ESS	Tail-ESS
k	Parametr kształtu	1,0012	2912	2679
β_0	Wyraz wolny (Intercept)	1,0018	1080	1791
α_4	Concentrate of Caducues	1,0010	1396	2196
α_5	Distillate of Discovery	1,0014	1306	2141
α_6	Essence of Epiphaneia	1,0018	1409	2265
α_7	Four in December	1,0012	1380	2123
α_8	Granules of Geheref	1,0023	1372	2558
α_9	Kar-Hamel Mooh	1,0012	1283	2101
α_{11}	Noospherol	1,0011	1375	1949
α_{12}	Oil of John's Son	1,0013	1384	2137
α_{13}	Power of Perlimpinpin	1,0019	1413	2321
α_{14}	Spirit of Scienza	1,0014	1295	2188
α_{15}	Zest of Zen	1,0012	1385	2222
γ_s	Gatunek 2 (<i>T. hybrid</i>)	1,0003	2940	2696
δ_g	Ogród 2	0,9999	3677	3029

4.1 Wykresy przebiegu łańcuchów (trace plots)


Rycina 1 przedstawia przebiegi czterech łańcuchów Markowa dla wybranych parametrów modelu: parametru kształtu k , wyrazu wolnego β_0 , efektu najlepszego związku α_6 oraz efektu związku o najmniejszym wpływie α_9 . Łańcuchy prawidłowo oscylują wokół stałej wartości („włochata gąsienica”), mieszając się ze sobą.

4.2 Autokorelacja wewnątrz łańcuchów


Rycina 2 przedstawia wykresy autokorelacji kolejnych próbek dla tych samych parametrów przy opóźnieniach (lag) od 1 do 20. Szybki zanik autokorelacji potwierdza wysoką efektywność próbkowania i tłumaczy wysokie wartości ESS uzyskane dla wszystkich parametrów.

4.3 Wykresy rang


Rycina 3 przedstawia wykresy rozkładu rang (ang. *rank overlay plots*) [5] dla wybranych parametrów. Rangi próbek z poszczególnych łańcuchów rozkładają się równomiernie wokół wartości oczekiwanej (50), bez wyraźnej dominacji któregoś z łańcuchów. Świadczy to o dobrej zbieżności próbkowania i właściwym mieszaniu łańcuchów dla wszystkich analizowanych parametrów.



Rycina 1: Wykresy przebiegu łańcuchów dla wybranych parametrów modelu (k , β_0 , α_6 , α_9).



Rycina 2: Wykresy autokorelacji (ACF) dla wybranych parametrów modelu.




Rycina 3: Wykresy rang dla wybranych parametrów modelu.

5 Wyniki analizy głównej

5.1 Ocena dopasowania modelu – posterior predictive check

W celu oceny adekwatności dopasowania modelu Weibulla do danych przeprowadzono posterior predictive check. Dla każdego z analizowanych związków zestawiono bayesowskie krzywe przeżycia a posteriori z empirycznym estymatorem Kaplana-Meiera wyznaczonym z danych. Graficzne podsumowanie porównania przedstawia Rycina 4.



Rycina 4: Posterior predictive check: bayesowskie krzywe przeżycia a posteriori (fioletowe pasma) nałożone na estymator Kaplana-Meiera (czarna linia schodkowa). Uporządkowane według otrzymanego rankingu związków.

W przypadku związków 4 (*Concentrate of Caducues*) oraz 15 (*Zest of Zen*) zaobserwowano niemalże idealną zgodność estymatora KM z krzywą przeżycia a posteriori na całej długości przedziału.

Dla związków 1 (*Distilled Water*), 5 (*Distillate of Discovery*) oraz 14 (*Spirit of Scienza*) odnotowano niewielkie, lokalne odchylenia estymatora KM poza granice 95% CrI, ograni-

czone do krótkiego przedziału czasowego i o małej amplitudzie, co uznano za dopasowanie akceptowalne.

Dla związków 11 (*Noospherol*), 8 (*Granules of Geheref*), 12 (*Oil of John's Son*), 13 (*Power of Perlimpinpin*) oraz 9 (*Kar-Hamel Mooh*) estymator KM przebiega wyraźnie powyżej krzywej przeżycia a posteriori w środkowej fazie obserwacji, co może sugerować systematyczną tendencję modelu Weibulla do niedoszacowania przeżycia w tym przedziale czasowym dla wspomnianych grup.

Odwrotną tendencję zaobserwowano dla związków 6 (*Essence of Epiphaneia*) oraz 7 (*Four in December*), dla których estymator KM przebiega wyraźnie poniżej krzywej przeżycia a posteriori na przedziale 5–20 dni, co wskazuje na zawyżenie czasu przeżycia przez model Weibulla w tych grupach.

Największe zastrzeżenie z punktu widzenia głównego celu analizy stanowi przeszacowanie czasu przeżycia przez model dla związków 6 (*Essence of Epiphaneia*) oraz 7 (*Four in December*), co zostało szerzej omówione w sekcji poświęconej dyskusji.

5.2 Rozkłady a posteriori parametrów modelu

W Tabeli 3 przedstawiono średnie a posteriori oraz 95% przedziały wiarygodności dla wszystkich parametrów modelu.

Tabela 3: Podsumowanie rozkładów a posteriori parametrów modelu.

Parametr	Opis	Średnia a posteriori	95% CrI
k	Parametr kształtu	4,395	[4,243; 4,547]
β_0	Wyraz wolny	2,199	[2,159; 2,239]
α_4	Concentrate of Caducues	0,686	[0,633; 0,737]
α_5	Distillate of Discovery	0,771	[0,719; 0,822]
α_6	Essence of Epiphaneia	0,811	[0,760; 0,866]
α_7	Four in December	0,584	[0,532; 0,638]
α_8	Granules of Geheref	0,728	[0,676; 0,781]
α_9	Kar-Hamel Mooh	0,434	[0,382; 0,484]
α_{11}	Noospherol	0,752	[0,698; 0,805]
α_{12}	Oil of John's Son	0,717	[0,665; 0,768]
α_{13}	Power of Perlimpinpin	0,704	[0,650; 0,756]
α_{14}	Spirit of Scienza	0,666	[0,614; 0,716]
α_{15}	Zest of Zen	0,650	[0,598; 0,702]
γ_s	Gatunek 2 (<i>T. hybrid</i>)	0,026	[0,005; 0,048]
δ_g	Ogród 2	0,004	[-0,017; 0,025]

Estymowany parametr kształtu $k = 4,395$ (95% CrI: [4,243; 4,547]) potwierdza narastający charakter hazardu ($k > 1$), zgodny z biologicznym procesem pogarszania się kondycji

kwiatów w czasie. Wszystkie efekty związków $\alpha_c > 0$ oraz żaden z przedziałów wiarygodności nie zawiera 0, oznacza to, że każda z badanych substancji istotnie wydłuża czas przeżycia kwiatów w porównaniu z grupą kontrolną. W przypadku najlepszego związku *acceleration factor* $\exp(\alpha_c)$ wynosi $\exp(0,811) \approx 2,25$, co oznacza, że owy związek wydłuża oczekiwany czas przeżycia 2,25-krotnie względem kontroli. Efekt gatunku ($\gamma_s = 0,026$) jest niewielki, lecz istotny, natomiast efekt ogrodu ($\delta_g = 0,004$; CrI zawiera zero) jest pomijalny.


5.3 Pierwszorzędowy punkt końcowy: ranking związków

Pierwszorzędowym punktem końcowym był ranking związków według mediany czasu przeżycia wyznaczonej z rozkładu a posteriori. Wyniki przedstawiono w Tabeli 4 oraz na Rycinie 5.

Tabela 4: Ranking związków według mediany czasu przeżycia a posteriori wraz z prawdopodobieństwami przeżycia dla typowego ($t = 10$ dni) i maksymalnego ($t = 22$ dni) czasu podróży.

Ranga	ID	Nazwa związku	Mediana (dni)	95% CrI (dni)	$\hat{S}(10)$	$\hat{S}(22)$
1	6	Essence of Epiphaneia	20,5	[19,7; 21,3]	97,1%	38,7%
2	5	Distillate of Discovery	19,7	[18,9; 20,4]	96,5%	32,2%
3	11	Noospherol	19,3	[18,6; 20,1]	96,2%	29,1%
4	8	Granules of Geheref	18,8	[18,2; 19,6]	95,8%	25,5%
5	12	Oil of John's Son	18,6	[18,0; 19,4]	95,6%	23,7%
6	13	Power of Perlimpinpin	18,4	[17,7; 19,1]	95,3%	21,9%
7	4	Concentrate of Caducues	18,1	[17,4; 18,8]	95,0%	19,4%
8	14	Spirit of Scienza	17,7	[17,0; 18,4]	94,5%	16,7%
9	15	Zest of Zen	17,4	[16,8; 18,1]	94,1%	14,7%
10	7	Four in December	16,3	[15,7; 17,0]	92,2%	7,7%
11	9	Kar-Hamel Mooh	14,0	[13,5; 14,6]	85,5%	0,7%
–	1	Distilled Water (kontrola)	9,1	[8,74; 9,48]	35,0%	< 0,1%

W rankingu pierwsze miejsce zajął związek 6 (*Essence of Epiphaneia*) z estymowaną medianą czasu przeżycia 20,5 dnia (95% CrI: [19,7; 21,3]). Przedział wiarygodności związku 6 częściowo zachodzi na przedział związku 5 (*Distillate of Discovery*, mediana 19,7 dnia, 95% CrI: [18,9; 20,4]), który zajął drugie miejsce, co wskazuje na pewną niepewność w jednoznacznym rozstrzygnięciu przewagi jednego z nich nad drugim. Kolejność związków na pozycjach 3–7 (mediana w zakresie 18,1–19,3 dnia) jest obarczona jeszcze większą niepewnością ze względu na szeroko nakładające się przedziały wiarygodności. Wszystkie badane substancje wykazały istotnie dłuższy czas przeżycia w porównaniu z grupą kontrolną (*Distilled Water*, mediana 9,1 dnia).



Rycina 5: Ranking związków według mediany czasu przeżycia a posteriori. Punkty: mediana; odcinki poziome: 95% CrI; linia przerywana: mediana grupy kontrolnej (9,1 dnia).

5.4 Drugorzędowe punkty końcowe: prawdopodobieństwa przeżycia

5.4.1 Przeżycie przez typowy czas podróży ($t = 10$ dni)

Dla podróży trwającej typowo 10 dni wszystkie badane substancje zapewniają stosunkowo wysokie prawdopodobieństwo przeżycia kwiatu (Tabela 4). Dla związku 6 sklasyfikowanego na pierwszym miejscu w rankingu prawdopodobieństwo to wyniosło aż 97,1%. Nawet dla najsłabszego spośród ocenianych związków – 9 (*Kar-Hamel Mooh*) wartość ta wyniosła 85,5%. W porównaniu z grupą kontrolną ($\hat{S}(10) = 35,0\%$) zastosowanie któregośkolwiek ze związków zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia kwiatu o co najmniej 50,5 punktu procentowego.

5.4.2 Przeżycie przez maksymalny czas podróży ($t = 22$ dni)

Dla maksymalnego spodziewanego czasu podróży wynoszącego 22 dni zróżnicowanie między związkami jest zdecydowanie większe. Żaden z badanych związków nie osiąga progu 50% prawdopodobieństwa przeżycia; najwyższą wartość odnotowano dla związku 6 ($\hat{S}(22) = 38,7\%$). Dla związku 9 (*Kar-Hamel Mooh*) oraz grupy kontrolnej prawdopodobieństwo przeżycia kwiatu jest bliskie zeru (odpowiednio 0,7% i $<0,1\%$). Wyniki te wskazują, że

w najbardziej pesymistycznym scenariuszu czasowym szanse na utrzymanie kwiatu w dobrej kondycji pozostają niskie nawet przy zastosowaniu najskuteczniejszego preparatu.

6 Analiza wrażliwości

Zgodnie z SAP (sekcja 6) przeprowadzono analizę wrażliwości polegającą na dopasowaniu modelu z analogicznymi słabo informacyjnymi rozkładami a priori:

$$k \sim \text{Gamma}(2; 0,5) \quad (7)$$

$$\beta_0 \sim \mathcal{N}(0; 1) \quad (8)$$

$$\alpha_c, \gamma_s, \delta_g \sim \mathcal{N}(0; 1) \quad (9)$$

Porównanie median a posteriori efektów związków w kolejności rankingowej między modelem głównym a modelem dopasowanym z rozkładami słabo informacyjnymi przedstawiono w Tabeli 5. Zachowana jest pełna zgodność rankingu, a wyniki są niemalże identyczne dla obu modeli. Jedyna zauważalna różnica dotyczy grupy kontrolnej (9,1 oraz 8,7 dnia), co wynika z wpływu rozkładu a priori parametru β_0 skalibrowanego na danych pilotażowych. Otrzymane wyniki analizy wrażliwości potwierdzają, że przyjęte rozkłady a priori dla modelu głównego nie zdominowały finalnych wniosków z analizy.

Tabela 5: Porównanie median czasu przeżycia: model główny vs. model wrażliwości.

ID	Nazwa związku	Mediana – model główny (dni)	Mediana – model wrażliwości (dni)
6	Essence of Epiphaneaia	20,5	20,6
5	Distillate of Discovery	19,7	19,8
11	Noospherol	19,3	19,4
8	Granules of Geheref	18,8	18,9
12	Oil of John's Son	18,6	18,7
13	Power of Perlimpinpin	18,4	18,5
4	Concentrate of Caducues	18,1	18,1
14	Spirit of Scienza	17,7	17,8
15	Zest of Zen	17,4	17,5
7	Four in December	16,3	16,4
9	Kar-Hamel Mooh	14,0	14,1
1	Distilled Water (kontrola)	9,1	8,7

7 Dyskusja

7.1 Zasadność wyboru rozkładu Weibulla

Zasadność wyboru modelu Weibulla potwierdzona została w analizie głównej, w której estymowana wartość parametru kształtu wyniosła $k = 4,395$ (95% CrI: [4,243; 4,547]), która dostarcza informacji na temat narastającego w czasie ryzyka obumarcia kwiatu, co jest biologicznie wiarygodne dla omawianego procesu starzenia się ciętych kwiatów.

Posterior predictive check (Rycina 4) wykazał zróżnicowanie w dokładności dopasowania modelu do danych. Dla związków 4 oraz 15 zaobserwowano niemal idealną zgodność między krzywą Kaplana-Meiera a krzywą przeżycia a posteriori. Dla części związków (8, 9, 11, 12, 13) model Weibulla konsekwentnie zaniżał prawdopodobieństwo przeżycia w środkowej fazie obserwacji, podczas gdy dla związków 6 i 7 przewidywał prawdopodobieństwo przeżycia wyższe niż obserwowane empirycznie. Szczególną uwagę należy zwrócić na związek 6 (*Essence of Epiphaneia*), dla którego różnica między medianą KM (17 dni) a medianą a posteriori (20,5 dnia) wyniosła aż 3,5 dnia. Rozbieżność ta wynikać może po części z najwyższego w badaniu odsetka obserwacji cenzurowanych (12,5%), który zmniejsza ilość informacji dostępnej do estymacji metodą Kaplana–Meiera i zwiększa niepewność wyznaczenia mediany przeżycia. Model bayesowski, wykorzystując dodatkowo informację zawartą w rozkładzie a priori oraz założenia parametryczne rozkładu Weibulla, dał wyższe oszacowanie mediany, które może lepiej odzwierciedlać rzeczywisty czas przeżycia w tej grupie.

7.2 Wpływ rozkładów a priori

Rozkłady a priori parametrów modelu skalibrowano na podstawie danych pilotażowych. Przy liczbie grup wynoszącej $n = 160$ obserwacji wkład rozkładów a priori w rozkład a posteriori był relatywnie niewielki, ponieważ głównym źródłem informacji w procesie estymacji były dane obserwacyjne. Przeprowadzona analiza wrażliwości wykazała, że zastąpienie rozkładów informacyjnych słabo informacyjnymi skutkuje różnicami median nie przekraczającymi 0,1 dnia dla wszystkich związków, z wyjątkiem grupy kontrolnej (9,1 vs. 8,7 dnia), co wynika z wpływu rozkładu a priori wyrazu wolnego β_0 na estymację bazowego czasu przeżycia. Kolejność rankingu ze względu na medianę przeżycia została w pełni zachowana.

7.3 Ograniczenia analizy

Należy wskazać kilka ograniczeń niniejszej analizy. Po pierwsze, badanie obejmowało wyłącznie dwa ogrody, a efekt lokalizacji, z której kwiaty pochodziły, okazał się pomijalny ($\delta_g = 0,004$; CrI zawiera zero), jednak przy większej liczbie ogrodów wnioski w tym zakresie mogłyby być bardziej wiarygodne. Po drugie, jednostkom z zarejestrowanym czasem przeżycia równym 0 przypisano wartość 0,5 dnia, co wynikało z ograniczeń technicznych implementacji modelu Weibulla, natomiast liczba takich obserwacji była marginalna i można przyjąć, że nie wpłynęła istotnie na wyniki. Po trzecie, model parametryczny zakłada określoną formę funkcji przeżycia – choć założenie rozkładu Weibulla jest dobrze uzasadnione, nie weryfikowano żadnych alternatywnych specyfikacji (np. log-normalnej). Ostatnie, a zarazem najważniejsze ograniczenie stanowi materiał doświadczalny. Ze względu na dostępność do celów eksperymentalnych wykorzystano róże,

podczas gdy przedmiotem zainteresowania jest czarny tulipan. Założono, że oba gatunki wykazują podobną wrażliwość na badane substancje oraz zbliżoną dynamikę procesu starzenia, jednak założenie to nie zostało empirycznie zweryfikowane. Potencjalne różnice międzygatunkowe mogą wpływać na trafność sformułowanej rekomendacji.

7.4 Dodatkowe uwagi

Wyniki analizy wskazują, że dla typowego czasu żeglugi (10 dni) różnice między pierwszymi siedmioma związkami w rankingu są znikome (prawdopodobieństwo przeżycia wynosi od 95,0% do 97,1%), a użycie któregośkolwiek niemal gwarantuje zachowanie świeżości transportowanego kwiatu. Przewaga związku 6 ujawnia się wyraźnie dopiero przy ryzyku przedłużenia czasu trwania rejsu do 22 dni: $\hat{S}(22) = 38,7\%$ wobec 32,2% dla drugiego w rankingu związku 5. W kontekście finalnej decyzji logistycznej warto zatem uwzględnić potencjalne dodatkowe czynniki takie jak koszt preparatu, czy jego dostępność. Biorąc pod uwagę zawyżenie czasu przeżycia przez model dla związku 6 oraz nakładające się przedziały wiarygodności dla czołowych pozycji rankingu, związku 5 (*Distillate of Discovery*) oraz 11 (*Noospherol*) stanowią wartościowe alternatywy, dla których model konsekwentnie zaniżał prawdopodobieństwo przeżycia, a zatem rzeczywiste działanie tych preparatów może być lepsze niż wskazują estymowane wartości.

8 Wnioski

W oparciu o przeprowadzoną analizę sformułować można następujące wnioski:

1. Wszystkie badane substancje istotnie wydłużają czas przeżycia kwiatów w porównaniu z wodą destylowaną.
2. Pierwsze miejsce w rankingu ze względu na medianę czasu przeżycia 20,5 dnia (95% CrI: [19,7; 21,3]) zajął **związek 6 (*Essence of Epiphaneia*)**, którego zastosowanie 2,25-krotnie wydłuża czas przeżycia względem grupy kontrolnej.
3. Przy typowym czasie podróży (10 dni) związek 6 zapewnia prawdopodobieństwo przeżycia na poziomie 97,1%, a każda z badanych substancji charakteryzuje się wartością $\hat{S}(10) > 85\%$.
4. Przy maksymalnym czasie podróży (22 dni) najwyższe prawdopodobieństwo przeżycia wynosi 38,7% (związek 6). Żadna z substancji nie zapewnia ponad 50% szans na zachowanie świeżości kwiatu.
5. Analiza wrażliwości potwierdziła, że zastąpienie skalibrowanych na danych pilotażowych rozkładów a priori rozkładami słabo informacyjnymi nie wpłynęło na kolejność związków w utworzonym rankingu, ani w istotny sposób na różnice w estymowanych wartościach median. Wnioski płynące z analizy oparte są przede wszystkim na informacji zawartej w danych obserwacyjnych.

6. Rekomendowanym związkiem do transportu czarnego tulipana jest związek 6 – *Essence of Epiphaneia*. W przypadku przewidywanego czasu podróży nie przekraczającego 10 dni prawie wszystkie substancje stanowią bezpieczną alternatywę, jednak zakładając potencjalne wydłużenie czasu żeglugi do 22 dni, związek 6 wykazuje wyraźną przewagę nad pozostałymi preparatami.

Bibliografia

- [1] P.-C. Bürkner, “brms: An R Package for Bayesian Multilevel Models Using Stan,” *Journal of Statistical Software*, t. 80, nr 1, s. 1–28, 2017. DOI: [10.18637/jss.v080.i01](https://doi.org/10.18637/jss.v080.i01)
- [2] Stan Development Team, *Stan User’s Guide: Survival Models*, dostęp: 26.06.2026, 2026. URL: <https://mc-stan.org/docs/stan-users-guide/survival.html>
- [3] P.-C. Bürkner, *Parameterization of Response Distributions in brms*, dostęp: 26.06.2026, 2024. URL: https://cran.r-project.org/web/packages/brms/vignettes/brms_families.html
- [4] J. Gabry, R. Česnovar, A. Johnson i S. Bröder, *cmdstanr: R Interface to CmdStan*, R package version 0.9.0, 2025. URL: <https://mc-stan.org/cmdstanr/>
- [5] A. Vehtari, A. Gelman, D. Simpson, B. Carpenter i P.-C. Bürkner, “Rank-Normalization, Folding, and Localization: An Improved $\hat{R}$ for Assessing Convergence of MCMC,” *arXiv preprint arXiv:1903.08008*, 2019, dostęp: 18.05.2026. URL: <https://arxiv.org/abs/1903.08008>