

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 55kg
- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.9°C

■ 요약

66세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있으며, 잦은 설사, 무한, 전신 무력감, 기억력 감퇴 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 177cm, 체중은 55kg, BMI는 17.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 4시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 환자는 복만, 복통 (강도 1/5), 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 소화기 증상을 호소한다. 또한, 수족냉증을 동반한다.

【과거력】

과거력으로 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하고, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 하며, 소화불량을 호소하고, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 없다 (0/5).
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥