

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 78세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 64kg
- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 60/분, 체온 36.3°C

■ 요약

78세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한이 시작되었으며, 수면 부족과 장시간 앉아있는 생활 습관이 악화 요인으로 작용한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 64kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 3시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 주된 증상으로는 복만 및 복통(3/5)이 있으며, 수면 부족과 장시간 앉아있는 습관이 증상 악화에 영향을 미치는 것으로 보인다. 감기 증상으로는

발열은 없으나 저체온을 보이며, 오한을 호소한다. 기침은 간헐적으로 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색의 소변을 주간 4회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(2/5)와 중도각성(1/5)을 호소한다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력감을 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 36.3°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 이유 없는 멍이 관찰되며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 작다(小).
- 설태: 백태가 얇게(薄) 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 83세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 83kg
- 활력징후: BP 106/79 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.8°C

■ 요약

83세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 과거 35갑년의 흡연력이 있으며, 변비, 다한, 어지러움, 이명, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 수족냉증 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 83kg, BMI는 27.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 및 복만/복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 발생한 기능성 소화불량으로 악화 중인 상태이다. 주 증상으로 복만/복통(4/5)을 호소하며, 구역/구토 증상을 동반한다. 스트레칭 시 증상 완화가 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 35갑년의 흡연력이 있다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황갈색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고(0/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 주로 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다. 통증 양상은 특별히 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/79 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.8°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없고 멍은 정상적으로 든다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 끼어있고 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 77kg
- 활력징후: BP 132/89 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.6°C

■ 요약

65세 여성 환자로 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 과거 고혈압 가족력, 잦은 음주, 흡연력이 있으며, 저체온, 무한, 수족냉증, 건망, 의욕 저하를 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 154cm, 체중은 77kg, BMI는 32.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 3일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 6개월 이상 지속된 소화불량을 호소하며, 구역/구토, 신물, 구고 등의 증상이 나타난다. 요통은 경미하며(통증 강도 1/10), 발열은 없으나 저체온 경향을 보인다. 콧물, 기침, 재채기, 코막힘, 코 가려움 등의 비염 증상은 나타나지

않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

잦은 음주를 하며, 흡연은 하루 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 복만/복통 1/5, 구역/구토 (습열), 신물 (간/식), 구고 (열)
- 대변: 1회/일, 황색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간, 얕음, 기상시 피곤함, 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)
- 한열: 열감/더위탐, 수족냉증, 온수 선호
- 땀: 무한 (전신, 땀흘린후 상쾌)
- 통증: 요통 (1/10)
- 정신/정서: 건망, 의욕 낮음, 스트레스 대처력 좋음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 132/89 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 부종 없음, 피부 건조, 가려움 호소, 사지무력감 없음
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 대/태
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 52kg
- 활력징후: BP 148/90 mmHg, 맥박 107/분, 체온 36.9°C

■ 요약

73세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있으며, 기름진 음식, 음주, 스트레스에 의해 악화됨. 잦은 묽은 변, 다한, 이명, 난청, 사지무력감을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 52kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1년 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 비를 맞은 후 발열이 시작된 이후 기능성 소화불량 증상이 지속적으로 나타나고 있다. 환자는 복만 및 복통(3/5)을 호소하며, 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 증상을 동반한다. 증상은 기름진 음식 섭취, 음주,

스트레스에 의해 악화되는 경향을 보이며, 현재까지 호전과 악화를 반복하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압으로 진단받은 과거력이 있으며, 현재 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 당뇨 및 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도 수준이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 오심 증상이 있다.
- 대변: 1일 2-3회, 황갈색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 2회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 특히 야간에 도한이 나타난다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 양호하나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/90 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 36.9°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 67세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 61kg
- 활력징후: BP 159/95 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.5°C

■ 요약

67세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 야근 후 피로 누적으로 감기 증상과 함께 소화불량 증상 발현. 고혈압, 수족냉증, 안면 부종, 무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 61kg, BMI는 19.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야근이 2일간 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상에서 1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 보인다. 무거운 짐을 들거나 과로할 경우, 습한 환경에 노출될 경우 증상이 악화된다. 충분한 수면을 취하거나 온찜질을

하면 증상이 완화된다. 소화불량 증상으로는 구역감, 신물, 구고, 부패취 등이 나타나며, 수족냉증을 동반한다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 159/95 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 55kg
- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 101/분, 체온 37.3°C

■ 요약

52세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 추운 날씨 노출 후 증상 발현. 과로 및 스트레스 시 악화, 안정 및 스트레칭 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 55kg, BMI는 19.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 11도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 54분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량으로 내원하였으며, 증상은 호전 중이다. 과로와 스트레스 시 증상이 악화되며, 안정 및 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 구역/구토, 신물, 구고,

부패취, 수족냉증 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 35개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다. 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색 변을 보며, 성상은 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 1회 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 37.3℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 사지무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태이며, 니태(膩苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:36:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 78kg
- 활력징후: BP 172/100 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.1°C

■ 요약

73세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 증상 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 78kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 복만/복통 (4/5), 구역/구토, 신물, 구고, 부패취, 수족냉증 등의 증상을 호소한다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1년 전 수영 후 감기 증상과 함께 소화불량이 시작되었으며, 이후 증상이 지속적으로 악화되었다. 무거운 짐을 들거나 습한 환경에 노출 시 증상이 악화된다고 한다. 현재 기능성 소화불량 증상 외에 요통 (4/10)을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량과 오심/구토 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 172/100 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 부종은 없다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 백태이며, 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 59세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 78kg
- 활력징후: BP 103/68 mmHg, 맥박 69/분, 체온 37.6°C

■ 요약

59세 남성, 6개월 전부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 감기 간호 후 유사 증상 발현. 구역, 신물, 구고, 부패취, 수족냉증 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 78kg, BMI는 30.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 2일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 감기 간호 후 발생한 소화불량을 호소한다. 증상은 서서히 악화되었으며, 구역, 신물, 구고, 부패취 등의 증상을 동반한다. 특히 수족냉증을 함께 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은 색의 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/68 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 37.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 절로 멍이 드는 경우가 있다. 피부 건조도는 정상이지만 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 55kg
- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.9°C

■ 요약

66세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있으며, 잦은 설사, 무한, 전신 무력감, 기억력 감퇴 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 177cm, 체중은 55kg, BMI는 17.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 4시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 환자는 복만, 복통 (강도 1/5), 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 소화기 증상을 호소한다. 또한, 수족냉증을 동반한다.

【과거력】

과거력으로 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하고, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 하며, 소화불량을 호소하고, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 없다 (0/5).
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥