

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:38:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 49세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 82kg
- 활력징후: BP 165/103 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.6°C

■ 요약

49세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력상 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있으며, 흡연력이 있고, 폐경 상태임. 수면의 질 저하와 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 82kg, BMI는 29.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 요통이 발생하여 점차 악화되는 경과를 보이고 있다. 통증은 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상을 띠며, 오래 서 있을 경우 악화된다고 호소한다. 또한 복만/복통 (3/5)을 동반하며, 구역/구토, 신물, 구고,

부패취, 수족냉증 등의 소화불량 증상을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압의 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통 (3/5), 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (4/5), 중도각성 (3/5)이 있다.
- 한열: 오한/추위를 타며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한이며, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다. 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 165/103 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움 (3/5)을 느낀다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 회태와 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세