

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:38:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 70kg
- 활력징후: BP 155/92 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.1°C

■ 요약

16세 남성 환자로, 1주일 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 흑색변, 혈뇨, 잦은 소변, 무한, 오한, 수족냉증, 피로감, 흑색의 안색 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 171cm, 체중은 70kg, BMI는 23.9이다.

【주소증】

1주일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻐뻐하고 아팠다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 잠을 잘못 잔 후 요통이 발생하여 점차 심해지는 양상으로, 통증은 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상으로 나타난다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역감, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으며, 기억력과 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/92 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.1°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명은 0/5, 난청은 2/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크다.
- 설태: 회색의 두꺼운 설태가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허