

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 79kg
- 활력징후: BP 136/83 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.2°C

■ 요약

54세 여성 환자로 1개월 이상-3개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원. 계단에서 미끄러진 후 통증 시작. 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압 등의 기저질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 79kg, BMI는 32.0이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 자통의 양상으로 나타나며, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 무거운 물건을 들 때 악화되고, 안정 시 완화된다. 동반 증상으로 복만, 복통, 구역감, 신물, 구고, 부패취

등이 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압 등의 현병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재 Menopause 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다. 구역감, 신물, 구고, 부패취가 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (5/5)를 호소하며, 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 자통의 양상을 보인다. 야간에 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕은 보통 수준이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/83 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.2℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감은 없으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 이묘창백산, 칠묘창백산
- 나이/성별: 57세 / 남
- 신장/체중: 185cm / 74kg
- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.5°C

■ 요약

57세 남성, 이사 중 허리를 삐끗한 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 당뇨, 흡연 과거력 있으며, 기름진 음식 섭취 및 장시간 앉아있을 때 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 185cm, 체중은 74kg, BMI는 21.6이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 통증 강도는 1/10이며, 자통, 야간통, 유주통의 양상을 보인다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였다. 통증은 자통의 형태로 나타나며, 밤에 심해지는 경향이 있다. 또한, 통증 부위가 이동하는 유주통의 양상도 보인다. 기름진 음식을 섭취하거나 장시간 앉아있을 경우 통증이

악화되며, 안정을 취하거나 수면을 취할 경우 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 35개피/일 정도이다. 운동강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량으로 복만/복통이 1/5 정도 있다. 구역감, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 정도 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 자통, 야간통, 유주통의 양상으로 나타난다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.5℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조한 편이다. 사지 무력감은 없다. 이명은 2/5 정도이며, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 느끼지 않는다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 84세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 47kg
- 활력징후: BP 104/75 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.1°C

■ 요약

84세 남성 환자로, 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원. 기존 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압 병력 있으며, 수면 부족, 음주, 장시간 앉기 등이 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 47kg, BMI는 14.5이다.

【주소증】

1주-1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 통증이 지속되고 있으며, 통증 양상은 자통(刺痛)과 유사하고 야간에 심해지는 경향을 보인다. 또한, 통증 부위가 이동하는 유주통(遊走痛)의 양상도 나타난다. 수면 부족,

음주, 장시간 앉기 등의 요인에 의해 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다. 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 나타난다. 수족냉증을 동반한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 깊은 잠을 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 자통, 야간통, 유주통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋다고 말한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/75 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.1℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 양허형 (陽虛型) → 팔미지황원
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 66kg
- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.7°C

■ 요약

44세 여성 환자로 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원함. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 과로 시 증상 악화, 온찜질 시 완화되는 양상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 66kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 증상이 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 통증은 자통(刺痛)과 유사하며 야간에 심해지고, 움직일 때 통증 부위가 변하는 유주통(遊走痛)의 양상도 나타난다. 오래

서 있을 경우 통증이 심해지며, 과로 시에도 악화되는 경향을 보인다. 온찜질을 하면 통증이 다소 완화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압의 기왕력이 있으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심, 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 땀이 나는 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 자통(刺痛), 야간통(夜間痛), 유주통(遊走痛), 중통(重痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/72 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.7℃, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태가 두껍게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 홍맥(洪脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 홍삭(洪數)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:38:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 육미지황원
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 72kg
- 활력징후: BP 108/79 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.6°C

■ 요약

55세 남성 환자로, 이사 중 허리를 삐끗한 후 2-3일 전부터 요통을 호소하며 내원함. 과거력상 고혈압, 당뇨 가족력이 있으며, 찬바람과 수면부족 시 악화되고 따뜻하게 하거나 온찜질 시 완화됨. 잦은 음주와 흡연력이 있고, 녹색변, 혈뇨, 수면장애, 야간 도한, 사지무력감, 홍설, 백태, 침맥, 대맥, 활맥을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 72kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 이후 요통이 발생하였으며, 통증은 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상을 보인다.

오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 찬바람에 노출되거나 수면이 부족할 경우 증상이 심해지고 따뜻하게 하거나 온찜질을 하면 증상이 완화된다고 한다. 통증 강도는 3/10으로 보고되었다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 5개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 있다. 수족냉증을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색변을 본다.
- 소변: 붉은 색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 좋지 않으며, 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상을 보인다. 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/79 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대(Enlarged)
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:38:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 소적건비환
- 나이/성별: 59세 / 남
- 신장/체중: 188cm / 85kg
- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.8°C

■ 요약

59세 남성 환자로, 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기저질환이 있으며, 스트레스와 과로 시 증상 악화를 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 188cm, 체중은 85kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 증상이 악화되는 양상을 보이고 있다. 통증은 자통(刺痛)의 양상으로 나타나며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 또한, 통증 부위가 이동하는 유주통(遊走痛)의

양상을 보이며, 오래 서 있을 경우 증상이 악화된다고 호소한다. 스트레스와 과로 시 통증이 심해지며, 휴식과 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하루 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 보통이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 12회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 12시간으로 길지만, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통은 자통(刺痛)의 양상으로 나타나며, 강도는 1/10이다. 야간에 심해지고, 오래 서 있을 경우 악화된다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 스트레스와 과로 시 증상이 악화된다. 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.8℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크고 두껍다.
- 설태: 황색의 니태(膩苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:38:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕
- 나이/성별: 49세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 82kg
- 활력징후: BP 165/103 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.6°C

■ 요약

49세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력상 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압이 있으며, 흡연력이 있고, 폐경 상태임. 수면의 질 저하와 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 82kg, BMI는 29.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 요통이 발생하여 점차 악화되는 경과를 보이고 있다. 통증은 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상을 띠며, 오래 서 있을 경우 악화된다고 호소한다. 또한 복만/복통 (3/5)을 동반하며, 구역/구토, 신물, 구고,

부패취, 수족냉증 등의 소화불량 증상을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압의 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통 (3/5), 구역/구토, 신물, 구고, 부패취 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (4/5), 중도각성 (3/5)이 있다.
- 한열: 오한/추위를 타며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한이며, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다. 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 165/103 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움 (3/5)을 느낀다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 회태와 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:38:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 59세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 68kg
- 활력징후: BP 116/65 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.3°C

■ 요약

59세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 빠긋한 후 증상 발현. 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압 병력 있으며, 매일 음주 습관이 있음. 흑색변, 전신 부종, 사지 무력감, 이명, 어지러움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 68kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 빠긋하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 이사 도중 허리를 빠긋한 후 요통이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 통증은 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상을 보이며, 오래 서있을 때 심해지고 온찜질이나 수면 시 완화된다. 환자는 오한을 느끼며, 요통

외에 소화불량 증상으로 복만, 복통, 구역감, 신물, 구고, 부패취, 수족냉증을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압으로 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약)

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상 호소.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색변을 보임.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 5시간 수면, 수면의 질 저하, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀을 보통 정도로 흘리며, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 높고 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/65 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:38:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 서근산, 독활탕
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 70kg
- 활력징후: BP 155/92 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.1°C

■ 요약

16세 남성 환자로, 1주일 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 주소로 내원함. 흑색변, 혈뇨, 잦은 소변, 무한, 오한, 수족냉증, 피로감, 흑색의 안색 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 171cm, 체중은 70kg, BMI는 23.9이다.

【주소증】

1주일 전부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻐뻐하고 아팠다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 잠을 잘못 잔 후 요통이 발생하여 점차 심해지는 양상으로, 통증은 자통, 야간통, 유주통, 중통의 양상으로 나타난다. 오래 서 있으면 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역감, 신물, 구고, 부패취 등의 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으며, 기억력과 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/92 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.1°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명은 0/5, 난청은 2/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크다.
- 설태: 회색의 두꺼운 설태가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허