

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:37:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 오적산
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 79kg
- 활력징후: BP 136/83 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.2°C

■ 요약

54세 여성 환자로 1개월 이상-3개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원. 계단에서 미끄러진 후 통증 시작. 이상지질혈증, 당뇨, 고혈압 등의 기저질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 79kg, BMI는 32.0이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 계단에서 미끄러진 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 자통의 양상으로 나타나며, 야간에 심해지는 경향을 보인다. 무거운 물건을 들 때 악화되고, 안정 시 완화된다. 동반 증상으로 복만, 복통, 구역감, 신물, 구고, 부패취

등이 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨, 고혈압 등의 현병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재 Menopause 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다. 구역감, 신물, 구고, 부패취가 동반된다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (5/5)를 호소하며, 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 자통의 양상을 보인다. 야간에 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕은 보통 수준이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/83 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.2℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감은 없으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 띈다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대(Enlarged)하다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색