

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:18:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 36세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 63kg
- 활력징후: BP 100/70 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.9°C

■ 요약

36세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 과로 및 수면 부족 후 증상 발현, 고혈압 및 이상지질혈증 기저 질환 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 177cm, 체중은 63kg, BMI는 20.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 4일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 스트레스에 의해 악화되고 휴식에 의해 완화된다. 복만/복통은 2/5 정도로 나타난다.

【과거력】

고혈압 및 이상지질혈증으로 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 다한이 나타나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었고, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/70 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질과 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥