

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:18:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 89kg
- 활력징후: BP 115/61 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.2°C

■ 요약

75세 남성 환자로 2-3주 전부터 알레르기비염 증상과 저체온, 심한 콧물, 잦은 기침, 재채기, 코막힘, 코가려움 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 89kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 2일 전부터 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상(심한 콧물, 잦은 기침, 재채기, 코막힘, 코가려움)을 호소한다. 특히 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 불가능하다고 한다. 재채기는

발작 수준으로 만성적이며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느낀다고 한다. 환자는 또한 발열은 없으나 저체온을 보이며, 오한 증상은 없다고 한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 주로 장시간 앉아있는 생활을 하며, 기름진 음식을 즐겨 섭취한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙적이다. 소화 상태에 대한 특별한 언급은 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/61 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.2°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 01:18:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 65kg
- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.5°C

■ 요약

22세 여성 환자로, 6개월 전부터 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며, 환절기 기온 변화로 5일 전부터 증상 악화되어 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 65kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 5일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상 (심한 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)을 호소한다. 특히 콧물이 심하여 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 어렵다고 한다. 요통은 통증 강도 4/10이며,

소화불량으로 복만/복통 (4/5)을 호소한다. 환절기 기온 변화에 따라 증상이 악화되는 경향을 보인다. 안정 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 중 정도이다. 스트레스와 수면 부족이 증상 악화 요인으로 작용하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 대변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나 얕은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/76 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움이 있다. 절로 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허