

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:24:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 83세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 67kg
- 활력징후: BP 109/74 mmHg, 맥박 64/분, 체온 38.5°C

■ 요약

83세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 발열, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 67kg, BMI는 22.9이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

1일 전 수영 후 발열(38.5°C), 콧물, 기침이 발생하였으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 콧물은 중등도이며 계속 흘러 불편감을 호소한다. 기침은 빈번하게 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 중 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이다. 소화 상태는 양호하며 오심/구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 3회 배뇨한다.
- 수면: 3시간으로 수면 시간이 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 나쁘다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/74 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 38.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 보이며 가려움이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:24:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 37세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 80kg
- 활력징후: BP 115/73 mmHg, 맥박 71/분, 체온 38.7°C

■ 요약

37세 남성 환자로, 2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 전신 근육통, 두통), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 37세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 80kg, BMI는 26.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 전신 근육통, 두통, 재채기, 요통, 복만/복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 4일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열을 느끼기 시작했으며, 이로 인해 전신 근육통과 두통이 동반되었다. 활동이 힘들어 눕고 싶다는 생각을 자주 한다. 오한이 심하여 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼며, 심할 때는 이가 부딪히기도 한다.

콧물은 경미하게 흐르며, 재채기를 자주 한다. 요통은 심하지 않으나 불편감을 느끼고, 복만감과 복통이 간헐적으로 나타난다. 증상은 과로, 습한 환경, 찬바람에 노출될 때 악화되며, 스트레칭과 따뜻하게 하면 다소 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 맑고, 주간에 6회 정도, 야간에는 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 5시간 정도로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 정도, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 식은땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이나, 의욕이 없는 상태이다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/73 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 38.7°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:24:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 82세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 47kg
- 활력징후: BP 172/103 mmHg, 맥박 78/분, 체온 39.4°C

■ 요약

82세 남성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 47kg, BMI는 18.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 심한 오한, 콧물, 잦은 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 전 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 3시간가량 지낸 후 발열 및 오한이 시작되었다.

【현병력】

내원 2-3일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼고 이가 부딪히는 증상이 있다. 콧물은 계속 흘러 불편감을 느끼며, 기침을 자주 하는 편이다. 요통, 복만/복통은 경미하다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 소화 상태는 평이하며, 오심/구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 황색, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간 정도 수면하며, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 경미하며, 강도 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 172/103 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 39.4°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 체질이다. 사지 무력감은 없다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 155cm / 82kg
- 활력징후: BP 106/60 mmHg, 맥박 73/분, 체온 38.3°C

■ 요약

75세 남성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 82kg, BMI는 34.1이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 6시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 뚜렷한 열감을 호소한다. 발열은 오르내림을 반복하는 양상을 보이며, 몸살 기운을 동반한다. 콧물은 경미하게 흐르고 기침은 간헐적으로 나타난다. 비염 증상으로는 재채기가 어쩌다 한두 번 나타나지만, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 1/10 정도로 미미하며, 소화불량

증상으로 복만 및 복통이 1/5 정도로 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 없는 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/60 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 38.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 절로 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 백태이며, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 140cm / 38kg
- 활력징후: BP 102/77 mmHg, 맥박 95/분, 체온 38.9°C

■ 요약

11세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 여 환자로 학생이다. 신장은 140cm, 체중은 38kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

한절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 저녁부터 오한과 발열이 시작되었다고 한다. 발열은 38.9°C까지 상승했으며, 몸살 기운, 전신 근육통, 두통을 동반하고, 활동하기 힘들어 누워있으려는 경향을 보인다. 오한이 심하여 따뜻한 환경에서도 추위를 느끼며, 심할 때는 이가 부딪히는 증상도 나타난다. 콧물은 중등도로 계속 흐르며, 기침을 자주 하는

편이다. 흡연은 악화 요인이며, 안정을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회, 규칙적으로 하며, 식욕은 보통이다. 소화 상태는 양호하며, 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 수면의 질은 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소에는 한열 경향이 보통이나, 현재 오한과 발열을 호소한다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으나, 강도는 1/10로 미미하며, 특별한 양상은 없다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/77 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 38.9°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피로감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.

- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 145cm / 47kg
- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.8°C

■ 요약

12세 남환, 1일 전부터 발열, 오한, 기침 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 145cm, 체중은 47kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 6시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강한 환경에 노출된 후 오한이 발생했으며, 이후 발열(37.8°C) 및 기침이 동반되었다. 오한은 심해지는 경향을 보이며, 발열로 인한 피로감을 호소한다. 콧물은 경미하게 나타나며, 잦은 기침을 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은 색/혈뇨, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 1/10
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.8°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 멍은 정상이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥, 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 66세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 47kg
- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 94/분, 체온 38.6°C

■ 요약

66세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 47kg, BMI는 19.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

영하 8도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 46분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

2-3일 전 추위에 노출된 후 발열(약 38.6°C)과 심한 오한을 동반한 감기 증상이 나타났다. 콧물은 중등도이며, 기침이 빈번하게 발생한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 3/5 강도로 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일, 소화불량, 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질은 양으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 True/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 좋으나, 건망이 있으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/89 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 38.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥, 부삭하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 94kg
- 활력징후: BP 110/77 mmHg, 맥박 103/분, 체온 38.1°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 174cm, 체중은 94kg, BMI는 31.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 7일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 증상이 발현되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되고, 스트레칭 및 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상으로는 뚜렷한 열감(약 38.1°C)과 오한이 있으며, 몸살 기운이 동반된다. 콧물은 중등도 수준으로 계속 흐르고, 기침을 자주 한다. 비염

증상으로는 재채기를 지속적으로 하는 반면, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 강도 2/10으로 나타나며, 소화불량 증상으로는 복만/복통이 2/5 정도로 나타난다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 나는 경향이 있다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/77 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 38.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 83kg
- 활력징후: BP 116/76 mmHg, 맥박 90/분, 체온 38.2°C

■ 요약

41세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기) 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 83kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

1일 전부터 감기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 감기 증상(미열, 경미한 오한, 콧물, 빈번한 기침, 빈번한 재채기)을 호소한다. 몸살 기운이 약간 있으며, 콧물은 경미하게 흐른다. 요통은 통증 강도 1/10로 미미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 1/5 정도이다. 습한 환경과 과로 시 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 온찜질 시 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 무한이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었으며, 의욕은 높고 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/76 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 38.2°C, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 41세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 79kg
- 활력징후: BP 147/91 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.9°C

■ 요약

41세 여성 환자로, 1일 전부터 오한, 발열, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 79kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

4일간 야근이 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 발현되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열(37.9°C)과 함께 오한을 호소하며, 몸살 기운과 중등도의 콧물, 간헐적인 기침을 동반한다. 찬바람과 흡연 시 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 온찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 현재 호전 중이라고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력 상 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 1/5 정도 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색이고 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(True/5), 중도각성(True/5)이 있다.
- 한열: 열감과 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통이 1/10 정도 강도로 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/91 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지무력감은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:25:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 31세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 71kg
- 활력징후: BP 156/94 mmHg, 맥박 78/분, 체온 38.1°C

■ 요약

31세 남성 환자로, 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 호소함. 과로와 수면 부족이 있었으며, 기존 이상지질혈증을 앓고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 71kg, BMI는 28.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 복만, 복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 2일간 과로와 수면 부족이 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전부터 발열이 뚜렷하게 나타나며, 38.1°C까지 상승하였다. 발열과 함께 심한 오한을 호소하며 몸이 떨릴 정도로 춥다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오고, 가끔 기침을 한다. 재채기를 빈번하게 하며, 요통은 강도

3/10 정도이다. 복만과 복통은 3/5 정도로 나타난다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 온찜질 시 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 맑으며, 주간 4회, 야간 0회 정도이다.
- 수면: 수면 시간은 12시간으로 긴 편이나, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 156/94 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 38.1℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지무력감을 호소하며, 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설이며, 크기가 크다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:26:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 66세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 54kg
- 활력징후: BP 135/89 mmHg, 맥박 55/분, 체온 37.7°C

■ 요약

66세 여성 환자로, 1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)과 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 54kg, BMI는 19.1이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 그리고 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 6일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 증상을 호소하였다. 발열은 37.4°C에서 37.9°C 사이로 측정되었으며, 심한 오한을 동반한다. 콧물은 지속적으로 흐르며, 기침 또한 빈번하게 발생한다. 소화불량으로 복만 및 복통 (3/5)을 호소한다. 습한 환경, 기름진 음식 섭취, 수면 부족 시 증상이 악화되며, 온찜질과 스트레칭 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압과 중풍 이력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 (복만/복통 3/5)을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/89 mmHg, 맥박 55회/분, 체온 37.7°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.

- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 미약하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:26:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 143cm / 49kg
- 활력징후: BP 149/97 mmHg, 맥박 82/분, 체온 38.2°C

■ 요약

13세 남학생, 1일 전부터 오한, 발열, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 49kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간 계속된 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상을 호소하였다. 발열로 인해 전신 근육통과 두통이 동반되었으며, 활동이 힘들어 눕고 싶어한다. 오한이 심하며, 몸이 떨릴 정도로 추위를 느낀다. 콧물은 중등도로 지속적으로 흐른다. 기침은 간헐적으로 나타난다. 또한 재채기를 매일 하며, 요통은 강도 2/10으로 나타났다.

소화불량으로 복만 및 복통이 2/5 정도로 발생했다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 5시간 수면, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 무한이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/97 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 38.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 부종은 없고, 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 中脈
- 맥폭(대세): 大脈
- 맥력: 無力
- 맥상: 緩脈

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:26:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 141cm / 54kg
- 활력징후: BP 116/68 mmHg, 맥박 73/분, 체온 38.9°C

■ 요약

13세 여성 환자로 1일 전부터 감기 및 비염, 요통, 소화불량 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 141cm, 체중은 54kg, BMI는 27.2이다.

【주소증】

1일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 3일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 등의 감기 및 비염 증상을 호소하였다. 발열은 38.9°C까지 상승했으며, 뚜렷한 열감이 느껴지고 피로감을 동반한다. 오한은 경미하게 나타나며 추위를 탐. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오며, 기침은 간헐적으로 나타난다. 재채기는 어쩌다 한두 번 정도 발생한다. 또한, 요통과 소화불량 증상도 함께

호소하며, 증상은 악화되는 추세이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만과 복통을 4/5 강도로 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간에 12회, 야간에 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 건망한 편이며, 스트레스 대처력은 좋다고 한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/68 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 38.9°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:26:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 76kg
- 활력징후: BP 104/72 mmHg, 맥박 88/분, 체온 37.6°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 경미한 콧물, 가끔 기침, 매일 하는 재채기, 2/10 강도의 요통, 2/5 강도의 복만/복통 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 76kg, BMI는 30.4이다.

【주소증】

1일 전부터 오한, 경미한 콧물, 가끔 기침, 매일 하는 재채기, 2/10 강도의 요통, 2/5 강도의 복만/복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 3시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨에 노출된 후 오한을 느꼈으며, 이후 경미한 콧물과 간헐적인 기침이 발생했다. 재채기는

지속적으로 나타나고 있다. 요통과 복만/복통은 경미한 수준이다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 이상지질혈증으로 약물 복용 중이며, 장시간 앉아있는 것이 악화 요인으로 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 35개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화불량이 있다. 복만/복통 2/5.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 수면시간 3시간, 얇은 잠을 자며 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 2/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/72 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 37.6℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:26:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 61kg
- 활력징후: BP 171/102 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.5°C

■ 요약

55세 남성, 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열, 콧물, 기침을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 61kg, BMI는 18.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 2시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 몸살 기운을 동반한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 4/5 정도로 불편함을 느낀다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 171/102 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소하며, 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:26:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 142cm / 30kg
- 활력징후: BP 103/64 mmHg, 맥박 80/분, 체온 38.6°C

■ 요약

10세 남환, 2-3일 전 에어컨 노출 후 오한, 발열, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 142cm, 체중은 30kg, BMI는 14.9이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 6시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 에어컨 노출 이후 오한, 발열, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 호소한다. 오한은 따뜻한 환경에서도 극심하게 느껴지며 이가 부딪힐 정도이다. 콧물은 지속적으로 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 하루 종일 지속적으로 발생한다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량은 복만/복통 3/5로 나타난다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압.

【사회력】

비음주, 비흡연, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수 1회/일, 불규칙, 복만/복통 3/5
- 대변: 변비, 녹색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 3회
- 수면: 5시간, 얕음, 기상 시 피곤함, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5
- 한열: 열감/더위탐, 열수 선호, 수족냉증 없음
- 땀: 무한, 두부, 땀 흘린 후 열감
- 통증: 요통, 통증 강도 3/10
- 정신/정서: 기억력 나쁨, 의욕 보통, 스트레스 대처력 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/64 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 38.6°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 사지 무력감 호소, 피부 건조도 정상, 가려움 없음
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:26:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 55세 / 남
- 신장/체중: 195cm / 60kg
- 활력징후: BP 100/72 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.9°C

■ 요약

55세 남성, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 195cm, 체중은 60kg, BMI는 15.8이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기)을 주소로 내원하였다. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았다.

【발병 에피소드】

6일간 야근이 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

1일 전부터 발열(37.9°C), 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 발현되었으며, 증상이 악화되는 양상이다. 콧물은 심하며 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하고, 기침과 재채기를 빈번하게 한다고 호소한다. 코막힘이나 코 가려움은 없다고

한다. 몸살 기운은 동반되지 않았다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 소화불량으로 복만감과 복통이 2/5 정도 발생한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소에는 보통이나, 현재 오한을 느끼고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/72 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.9°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이며, 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 61kg
- 활력징후: BP 171/107 mmHg, 맥박 97/분, 체온 38.4°C

■ 요약

30세 남성, 2-3일 전부터 감기 증상(오한, 심한 콧물, 가끔 기침) 및 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 61kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(오한, 심한 콧물, 가끔 기침), 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 3일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전부터 감기와 유사한 증상이 나타났다고 한다. 주 증상으로는 뚜렷한 오한, 심한 콧물, 간헐적인 기침이 있다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상이며, 휴지로 감당하기 어려울 정도라고 한다. 또한, 감기 증상과 함께 요통 및 소화불량 증상을 호소하였다. 요통은 통증 강도 1/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 1/5 정도로

나타난다. 악화 요인으로서는 과로, 무거운 짐을 드는 행위, 찬바람/냉기에 노출되는 경우이며, 특별한 완화 요인은 없다고 한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화는 보통, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질은 얕으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 현재 뚜렷한 오한을 호소한다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 171/107 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 38.4℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며, 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 85kg
- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 100/분, 체온 37.5°C

■ 요약

75세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 등을 호소함. 과로 및 수면 부족 이후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 85kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간의 과로와 수면 부족으로 인해 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 뚜렷한 열감이 느껴지며, 이로 인해 피로감과 불편감이 동반된다. 오한을 뚜렷하게 호소하며 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 몸살 기운이 동반될 수 있다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오며, 기침은 간헐적으로 발생한다. 재채기는 어쩌다 한두 번 간헐적으로 발생하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은

통증 강도 3/10이며, 상세 양상은 파악되지 않았다. 소화불량으로 복만/복통을 3/5 강도로 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 굳기이다.
- 소변: 맑은 색을 띠며, 주간 6회, 야간 3회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 질이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀이 없는 편이나, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다. 상세한 통증 양상은 파악되지 않았다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 37.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 2/5 강도로 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 50kg
- 활력징후: BP 141/92 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.8°C

■ 요약

22세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 50kg, BMI는 18.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

2일간 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전부터 오한과 함께 38.8°C의 발열이 발생하였다. 오한이 심하여 몸이 떨릴 정도이며, 콧물은 계속 흘러 불편감을 호소한다. 또한, 발작적인 기침이 나타난다. 악화요인으로 흡연과 찬바람/냉기에 노출되는 것을 꼽았으며, 식이조절 시 증상 완화를 느낀다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 35개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 불규칙하며 4회/일 정도이다. 소화 상태는 보통이며, 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 2회, 야간 2회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다. 전신에 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다. 복만/복통은 3/5 강도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/92 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.8°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하며, 멍이 잘 드는 편이다. 면색은 창백하다. 이명 강도는 5/5, 난청 5/5, 어지러움 4/5이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 59kg
- 활력징후: BP 141/97 mmHg, 맥박 79/분, 체온 38.4°C

■ 요약

45세 남성, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 지속적인 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 59kg, BMI는 16.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 전 2-3일 전 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 3시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 현재까지 증상이 지속되고 있다. 발열에도 불구하고 오한이 심하며, 몸이 떨릴 정도로 춥게 느껴진다고 호소한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 하루 종일 지속적인 기침이 있다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간, 수면의 질은 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력감을 호소한다. 기억력은 좋음.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/97 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 38.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)

- 맥상: 완맥(緩脈)

- 복합맥상: 부허맥(浮虛脈)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 139cm / 46kg
- 활력징후: BP 114/66 mmHg, 맥박 93/분, 체온 38.2°C

■ 요약

12세 남학생, 1일 전 수영 후 오한, 발열, 콧물, 기침 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 139cm, 체중은 46kg, BMI는 23.8이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 수영 후 갑작스럽게 오한, 발열, 콧물, 기침이 발생하였다. 환자는 뚜렷한 열감을 호소하며, 심한 오한으로 인해 따뜻한 환경에서도 추위를 심하게 느끼고, 이가 부딪히는 증상도 동반된다고 한다. 콧물은 지속적으로 흐르며, 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하다. 기침 또한 빈번하게 발생한다. 과로 시 증상이 악화되며, 따뜻하게

하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변 양은 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕은 저하된 상태이다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/66 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 38.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 부종은 없고, 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 185cm / 58kg
- 활력징후: BP 133/88 mmHg, 맥박 65/분, 체온 39.1°C

■ 요약

54세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 소화불량, 요통, 사지무력감을 호소한다. 과로 및 수면 부족 후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 185cm, 체중은 58kg, BMI는 16.9이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 소화불량, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

4일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 증상을 호소한다. 발열은 37.4°C에서 37.9°C 사이로 측정되며, 오한은 경미하게 나타난다. 콧물은 중등도이며, 기침과 재채기는 빈번하게

발생한다. 요통 강도는 4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소하며 강도는 4/5이다. 찬바람과 음주 시 증상이 악화되고, 휴식과 온찜질 시 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소에는 보통이나, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 감퇴되었으나, 스트레스 대처력은 좋고 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/88 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 39.1℃, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 하지 부종과 사지 무력감이 있으며, 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小(소)
- 설태: 백태, 薄苔(박태)

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 浮脈(부맥)
- 맥폭(대세): 細脈(세맥)
- 맥력: 無力(무력)
- 맥상: 緩脈(완맥)
- 복합맥상: 浮虛(부허)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:27:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 78세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 71kg
- 활력징후: BP 107/69 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.5°C

■ 요약

78세 남성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 71kg, BMI는 29.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열(37.5°C)이 시작되었으며, 이후 경미한 콧물과 간헐적인 기침이 발생하였다. 비염 증상으로 재채기가 있으며 만성적으로 나타난다. 요통과 더불어 소화불량을 호소하며, 복만감 및

복통을 동반한다. 증상은 습한 환경, 수면 부족, 과로 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/69 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 얇음
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 84세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 70kg
- 활력징후: BP 102/76 mmHg, 맥박 87/분, 체온 39.5°C

■ 요약

84세 여성 환자로, 1일 전 영하 12도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 30분간 대기한 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 70kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 12도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 30분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 추위에 노출된 후 오한, 발열(39.5°C)이 발생하였다. 오한이 심하여 몸이 떨릴 정도이며, 콧물이 계속 흘러 휴지를 자주 사용한다. 기침과 재채기를 빈번하게 한다. 요통은 경미하며(1/10), 소화불량 증상으로 복만과 복통이

간헐적으로 나타난다(1/5).

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 복만/복통 1/5 호소.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 1/10.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/76 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 39.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 멍이 잘 든다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다.
- 설태: 백태가 두껍게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 86kg
- 활력징후: BP 113/64 mmHg, 맥박 61/분, 체온 39.1°C

■ 요약

44세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 86kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 4일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상을 호소하였다. 오한이 심하며, 열이 나는데도 몸이 떨릴 정도로 춥다고 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 간헐적인 기침이 있다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타난다. 복만 및 복통은 3/5로 나타난다. 현재 호전 중이라고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로는 당뇨와 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 복만/복통이 3/5로 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 보며, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하지만, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/64 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 39.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 80kg
- 활력징후: BP 100/69 mmHg, 맥박 112/분, 체온 37.6°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 몸살 기운, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 80kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

한절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 저녁부터 오한, 발열, 몸살 기운을 느낌. 이후 콧물과 기침이 발생하였으며, 현재 호전 중이라고 진술함. 발열은 뚜렷한 열감을 동반하며, 이로 인해 피로감과 불편감을 호소함. 오한은 경미하게 추위를 느끼는 정도로, 옷을 껴입거나 이불을 덮으려고 함. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 하루종일 지속적으로

발생함. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 3/5 강도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력 없음.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 규칙적으로 하며, 소화불량으로 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통.
- 소변: 맑은 색, 주간 4회, 야간 2회.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탐. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나면 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 3/10.
- 정신/정서: 기억력은 나쁜 편이며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/69 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 37.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 0/5. 어지러움은 1/5.
- 면색: 암색.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 舌小
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 74kg
- 활력징후: BP 111/78 mmHg, 맥박 63/분, 체온 38.5°C

■ 요약

50세 남성, 2-3일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 74kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(심한 오한, 멈추지 않는 콧물, 빈번한 기침), 경미한 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 15도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 49분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 차가운 환경에 노출된 이후 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발현되었다고 한다. 오한이 심하여 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼며, 이가 부딪히는 증상도 동반된다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 한다. 기침은 빈번하게 발생한다. 요통은 강도 2/10으로

경미하며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통은 2/5 정도로 느껴진다고 한다. 수면 부족 시 증상이 악화되며, 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨 증상이 있으며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/78 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 38.5℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 니태(膩苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)이다.
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)이다.
- 맥력: 유력(有力)하다.
- 맥상: 완맥(緩脈)이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 20세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 54kg
- 활력징후: BP 108/78 mmHg, 맥박 58/분, 체온 38.1°C

■ 요약

20세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 가끔 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 54kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

한절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 금일(1일 전) 아침부터 발열(38.1°C)과 惡寒을 호소하였으며, 경미한 콧물과 간헐적인 기침이 동반되었다. 요통은 강도 1/10로 미미하게 나타난다. 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 1/5 정도로 호소한다. 증상은 현재 호전 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 중으로 유지하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 특별한 자한은 없으나, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통(1/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않으며 무기력함을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/78 mmHg, 맥박 58회/분, 체온 38.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 淡紅, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 78세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 54kg
- 활력징후: BP 118/64 mmHg, 맥박 73/분, 체온 38.1°C

■ 요약

78세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 54kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 4시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전, 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 오한이 발생했으며, 이후 발열, 콧물, 기침 등의 증상이 나타났다. 발열은 뚜렷한 열감이 느껴지며 피로감을 동반하고, 오한은 경미하게 느껴져 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 콧물은 심하며 지속적으로 흘러내려 휴지를 자주 사용하게 된다. 기침은 하루 종일 지속적으로

나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일, 불규칙하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 5시간, 수면의 질은 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 잘 흘리지 않으며, 야간/도한은 없고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 나쁘다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/64 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 38.1°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 정상 건조도를 유지하고, 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 148cm / 52kg
- 활력징후: BP 145/96 mmHg, 맥박 109/분, 체온 39.0°C

■ 요약

13세 남학생, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 흑색변, 혈뇨 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 148cm, 체중은 52kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 흑색변, 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

내원 1일 전 비를 맞은 후 발열(39.0°C)과 함께 오한을 느껴 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 가벼운 몸살 기운이 있으며, 콧물은 계속 흐르는 양상이다. 기침을 자주 하는 편이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

술은 마시지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3번 불규칙하게 하며, 특별한 소화불량 증상은 없으나 복만감이 1/5 정도 느껴진다고 한다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 정도 잠을 자지만, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5 정도이다.
- 한열: 평소 보통의 체온을 유지하나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며, 전신에 땀이 나면 열감을 동반한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/96 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 39.0°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 정상적인 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 84kg
- 활력징후: BP 107/71 mmHg, 맥박 93/분, 체온 38.0°C

■ 요약

28세 여성, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 84kg, BMI는 29.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 2-3일 전 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침 증상이 발생하였다. 발열은 최고 38.0°C까지 상승하였으나 현재는 정상 체온을 유지하고 있다. 오한은 경미하며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 빈번하게 발생한다. 또한, 요통(3/10)과 복만/복통(3/5)을 호소한다.

온찜질과 휴식 시 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 횟수는 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 7시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 탐, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되어 있다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/71 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 38.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 피부는 건조하며 각질과 가려움증이 있다. 사지무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 73kg
- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 92/분, 체온 39.3°C

■ 요약

21세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 잦은 기침을 호소하며 내원함. 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 73kg, BMI는 29.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 잦은 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 6시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 오한을 느껴 발열, 기침 등의 증상이 발생하였다고 한다. 증상은 시작 후 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 몸살 기운이 동반될 수 있다고 호소한다.

콧물은 경미하게 흐르며, 재채기는 간헐적으로 나타난다. 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 경미하며 소화불량으로 인한 복만/복통이 있다고 한다. 악화 요인으로는 스트레스, 흡연, 찬바람/냉기가 있다.

【과거력】

고혈압, 당뇨로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다. 생리주기는 30일이며 불규칙하고, 기간은 5일, 생리통은 8/10으로 심한 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회, 규칙적으로 하며, 오심/구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통이다.
- 소변: 맑고, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 평소에는 보통이나 현재 오한을 느끼며 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 없고 무기력하다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/79 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 39.3℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움증이 있다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 60kg
- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 76/분, 체온 39.1°C

■ 요약

14세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 발열, 콧물, 잦은 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 158cm, 체중은 60kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 잦은 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였으며, 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 두항부(頭項部)를 보온하지 않은 채로 외출한 이후 오한(惡寒)을 동반한 발열(發熱)이 발생하였다고 한다. 발열로 인해 피로감과 불편감을 느끼며, 체온은 39.1°C까지 상승하였다. 콧물은 경미하게 흐르며, 잦은 기침을 동반한다. 요통은 경미한 수준(2/10)이며 복만감(腹滿感) 및 복통(腹痛) 또한 호소하나 심하지 않은

정도(2/5)이다. 따뜻하게 하거나 온열 찜질을 하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 세 끼를 섭취하며, 특이 소화불량 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색 변을 보며, 묽기는 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 하루 평균 5시간 수면을 취하며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 발생하며, 중도 각성은 5회 발생한다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 나며, 발한 후 피곤함과 냉감을 느낀다. 땀은 없는 편이다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 39.1℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태, 박태(薄苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)이다.
- 맥폭(대세): 홍맥(洪脈)이다.
- 맥력: 강력(強力)하다.
- 맥상: 활맥(滑脈)이다.
- 복합맥상: 홍대(洪大)하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 61kg
- 활력징후: BP 134/82 mmHg, 맥박 66/분, 체온 39.1°C

■ 요약

47세 남성 환자로 2-3일 전부터 발열, 오한, 잦은 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 61kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 잦은 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 5시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 에어컨이 강한 환경에 노출된 후 오한을 느꼈으며, 이후 발열이 발생했다. 발열은 39.1°C까지 상승했으며, 해열제 복용 없이 자연적으로 오르내림을 반복하고 있다. 오한은 경미하게 춥다고 느껴지는 정도이며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 기침은 빈번하게 나타나며, 콧물은 경미하게 흐른다. 재채기 또한 잦은 빈도로

나타난다. 요통은 통증 강도 4/10으로 지속적으로 나타나며, 소화불량으로 인해 복만 및 복통을 호소한다. 흡연 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 충분한 수면과 식이 조절 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 35개피/일 정도이다. 운동은 중등도 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고 복만, 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감이 느껴진다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/82 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 39.1℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5 강도로 나타난다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 30세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 77kg
- 활력징후: BP 117/69 mmHg, 맥박 75/분, 체온 38.1°C

■ 요약

30세 여성, 2-3일 전 수영 후 감기 증상(콧물, 기침, 재채기) 및 경미한 오한 호소, 이상지질혈증 병력

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 77kg, BMI는 29.3이다.

【주소증】

발현 2-3일 전부터 감기 증상(콧물, 기침, 재채기)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 수영 후 감기 증상(콧물, 기침, 재채기)이 발생하였다. 콧물은 계속 흐르는 양상이며, 기침과 재채기는 빈번하게 나타난다. 경미한 오한을 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮으려고 한다. 찬바람/냉기(冷氣)에 의해 증상이 악화되는 경향이 있으며, 스트레칭(Stretching) 시 일부 완화되는 느낌을 받는다.

【과거력】

이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 5개피 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 특별한 소화 불량 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면 장애는 5점 만점에 5점, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 걸쳐 발한 후 피로감과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮은 편이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/69 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 38.1°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대/태이다.
- 설태: 백태가 끼어있고, 니태를 띤다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 63kg
- 활력징후: BP 119/65 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.7°C

■ 요약

76세 남성 환자로 1일 전 수영 후 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 63kg, BMI는 21.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 수영 후 감기 증상, 비염 증상, 요통, 소화불량 호소. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 뚜렷한 열감이 느껴지며, 이로 인해 피로감 동반. 오한은 경미하게 느껴져 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 함. 가벼운 몸살 기운이

동반될 수 있음. 콧물은 경미하게 흐르며, 휴지가 거의 필요 없거나 가끔 한두 번 닦아내는 정도. 기침은 발작적인 양상으로 나타남. 재채기는 간헐적으로 발생. 요통은 통증강도 4/10. 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5 강도로 나타남. 증상은 따뜻하게 하거나 수면을 취하면 완화되는 경향을 보임. 음주 후 증상이 악화되는 경향이 있음.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있음. 복만/복통을 호소함.
- 대변: 1회/일, 흑색, 보통.
- 소변: 맑은 색, 주간 9회, 야간 0회.
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질은 양으며, 기상 시 피로감을 느낌. 입면장애 (5/5), 중도각성 (0/5).
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이며, 수족냉증은 없음. 따뜻한 음료 선호.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낌.
- 통증: 요통 (4/10).
- 정신/정서: 기억력은 나쁘고, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/65 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰됨. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상, 가려움은 없음.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 62kg
- 활력징후: BP 169/106 mmHg, 맥박 92/분, 체온 39.4°C

■ 요약

56세 여성 환자로 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 62kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 약 2시간 동안 외부에서 활동한 후 발열 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 惡寒과 發熱이 발생하였으며, 콧물과 기침이 동반되었다. 발열로 인한 피로감을 호소하며, 37.4°C ~ 37.9°C 사이의 미열이 지속적으로 나타난다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 증상은 현재 호전 중이라고 한다. 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화 상태는 보통이다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 특별한 통증 양상은 없다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 나쁜 편이고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 169/106 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 39.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전반적으로 피로감을 호소하며, 부종은 없고 피부는 건조하며 각질이 있다. 가려움증은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:29:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 155cm / 54kg
- 활력징후: BP 138/84 mmHg, 맥박 94/분, 체온 38.2°C

■ 요약

13세 남학생 환자로, 수영 후 발현된 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)과 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 155cm, 체중은 54kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 감기, 비염, 요통 및 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 수영 후 머리를 말리지 않은 채 외출한 이후, 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 발현되었다. 발열은 38.2°C까지 상승했으며, 오한은 경미하게 느껴지는 정도이다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보이며, 기침은 하루 종일 지속된다. 재채기는 매일 반복적으로 나타난다. 요통은 통증 강도 1/10로 미미하며, 소화불량으로 인한 복만

및 복통은 1/5 정도로 경미하다. 수면 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 경미하게 나타난다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 5회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 무한이며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/84 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 38.2°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 하지 부종이 있고 멍이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크다(대/태).
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 68kg
- 활력징후: BP 146/96 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.4°C

■ 요약

19세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 복만/복통, 혈뇨 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 68kg, BMI는 24.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 복만/복통, 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

3일간 야근 후 피로 누적으로 감기 증상 발현되었다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상 호소한다. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이를 오르내리며, 오한은 경미한 수준이다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 간헐적으로 발생한다. 재채기는 빈번하게 나타난다. 찬바람에 노출 시 증상이 악화되고, 안정을 취하면 완화되는 경향을 보인다. 또한, 복만/복통과 혈뇨 증상도 함께 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통(3/5)을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 묽음/연변의 양상을 보인다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 1회 빈뇨를 호소한다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 전신에 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소하고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/96 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 건조하며 가려움이 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 대활

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 76kg
- 활력징후: BP 112/75 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.1°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 1일 전 환절기 얇은 옷차림 외출 후 몸살 기운과 함께 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 166cm, 체중은 76kg, BMI는 27.6이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 경미한 요통, 소화불량 (복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 오한과 함께 발열이 시작되었다고 호소한다. 발열로 인해 피로감을 느끼며, 심한 오한을 동반한다. 콧물은 중등도이며, 간헐적인 기침을 한다. 재채기는 지속적으로 나타나며, 요통은 경미하고,

복만감 및 복통이 느껴지나 심하지 않다. 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 10점 만점에 0점이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 규칙적이다. 소화불량을 호소하며, 복만감과 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 10점 만점에 1점이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/75 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.1℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이고, 가려움은 없다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 82세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 78kg
- 활력징후: BP 107/76 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.6°C

■ 요약

82세 남성 환자로, 2-3일 전부터 감기 및 비염 증상, 요통, 소화불량을 호소하며, 오한, 콧물, 재채기, 복만/복통 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 78kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (오한, 경미한 콧물, 간헐적 기침), 비염 증상 (재채기 발작), 요통 (통증 강도 3/10), 소화불량 (복만/복통 3/5)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 7일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 오한을 느끼며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도로 추위를 호소한다. 콧물은 경미하게

흐르며, 휴지를 가끔 닦아내는 정도이다. 기침은 간헐적으로 발생한다. 재채기는 발작 수준으로 나타나며, 만성적인 양상을 보인다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타난다. 소화불량으로 인해 복만감과 복통을 3/5 정도로 호소한다. 전반적으로 호전되는 경과를 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 2회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/76 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 부종은 없으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 84kg
- 활력징후: BP 127/81 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.1°C

■ 요약

60세 여성 환자로, 1일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침)과 어지럼증을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 有.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 84kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침) 및 어지럼증을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 2일 후 비슷한 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 오한이 뚜렷하게 느껴져 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 몸살 기운이 동반될 수 있다고 호소한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이며, 기침은 간헐적으로 나타난다. 재채기는 매일 지속적으로 나타나며,

어지럼증은 심하여 5/5 정도로 호소한다. 요통은 경미하며(1/10), 특별한 양상은 없다. 복만/복통은 1/5 정도로 경미하게 느껴진다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 4회/일로 규칙적이다.
- 대변: 1회/일, 녹색을 띠며 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이거나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 없는 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘다고 호소하며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/81 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.1℃, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 피부는 건조하다. 피로감을 호소한다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 71세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 79kg
- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 85/분, 체온 38.0°C

■ 요약

71세 여성 환자로, 1일 전 추운 날씨에 장시간 노출 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 71세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 79kg, BMI는 29.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 6도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 43분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 추운 환경에 노출된 이후 오한, 발열, 콧물, 기침 증상이 발생하였다. 발열은 38.0°C로 측정되었으며, 오한이 심하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하게 되며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 식이조절을 통해 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 4회/일 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색, 주간 12회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 열감이 느껴진다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 무기력감을 느낀다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 38.0°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감은 없다. 이명은 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 75kg
- 활력징후: BP 119/75 mmHg, 맥박 61/분, 체온 38.0°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 1일 전 영하의 추운 날씨에 장시간 노출된 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 호소하며 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 172cm, 체중은 75kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 11도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 54분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 추위에 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침 증상이 발생하였다. 발열은 뚜렷한 열감을 동반하며 피로감과 불편감을 호소한다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 몸살 기운을 함께 느낀다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오며, 기침은 간헐적으로 발생한다. 비염 증상으로 재채기를 지속적으로 하지만, 코막힘이나 코

가려움은 없다. 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다. 습한 환경과 과로 시 증상이 악화되며, 안정을 취하면 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 고강도 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다. 무한이다.
- 통증: 요통을 2/10 정도로 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/75 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 38.0℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 50kg
- 활력징후: BP 118/69 mmHg, 맥박 56/분, 체온 38.3°C

■ 요약

14세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살기운, 소화불량, 요통을 호소한다. 3일간의 과로와 수면 부족 후 증상 발현 및 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 50kg, BMI는 20.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

3일간 과로와 수면 부족이 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상을 호소하며, 증상이 점차 악화되는 추세이다. 발열은 38.3°C까지 상승했으며, 뚜렷한 오한과 몸살 기운을 동반한다. 또한, 재채기를 자주 하며, 요통과 소화불량 증상을 함께

호소한다. 특히, 복만/복통이 있으며 통증 강도는 4/5로 호소한다. 식이조절 시 증상이 완화되나 스트레스나 무거운 물건을 들 경우 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높으나, 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 복만/복통 (4/5)
- 대변: 1회/일, 황색, 보통
- 소변: 맑음, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 피로감, 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 열감/더위 탐, 열수 선호, 수족냉증 있음
- 땀: 무한, 전신 발한 후 피로감/냉함
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 건망, 스트레스 대처력 보통, 의욕 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/69 mmHg, 맥박 56회/분, 체온 38.3℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 절로 멍이 생김, 피부 건조, 가려움증 호소
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:30:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 56kg
- 활력징후: BP 146/99 mmHg, 맥박 105/분, 체온 37.5°C

■ 요약

55세 여성, 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열, 콧물, 기침을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 56kg, BMI는 19.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 약 6시간 동안 실외에 머문 후 오한과 함께 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한이 발생하며 발열이 시작되었다고 한다. 오한은 심하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이며, 발작적인 기침이 나타난다.

재채기는 간헐적으로 한두 번 정도 하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 거의 없으며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 경미하게 나타난다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 묽거나 연변이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간, 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 건망이 있는 편이고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/99 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 37.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감이 있다. 피부는 건조하며, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 57kg
- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.6°C

■ 요약

77세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 57kg, BMI는 19.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상, 비염 증상, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

2일간 야근이 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

1일 전, 야근 후 누적된 피로로 인해 감기 증상 (발열, 오한, 기침, 콧물)이 발현하였다. 발열은 38.6°C까지 상승했으며, 오한을 심하게 느껴 이불을 덮어야 할 정도라고 호소한다. 콧물은 경미하며, 기침은 발작적으로 나타난다. 요통은 4/10 강도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 증상은 오르내림을 반복하는 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일, 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 오한을 심하게 느끼며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 68kg
- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 82/분, 체온 38.3°C

■ 요약

53세 남성 환자로 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 이명, 어지러움, 사지무력감, 가려움 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 68kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다. 특히 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 이명, 어지러움, 사지무력감, 가려움 등을 호소한다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중, 7일 후 본인도 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 비염 증상을 호소한다. 또한 요통 및 복만, 복통을 동반한 소화불량 증상도 나타나고 있다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복하며,

스트레스에 의해 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며, 음주를 자주 하는 편이다. 흡연은 하루에 0개피를 피우며, 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루에 1회 불규칙하게 하며, 복만 및 복통을 다소 호소한다.
- 대변: 하루에 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)을 겪고 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다. 야간 발한은 없다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 38.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 촉/大하다.
- 설태: 백태, 膩태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 86kg
- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 99/분, 체온 39.4°C

■ 요약

73세 여성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 잦은 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 86kg, BMI는 34.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 잦은 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 잦은 기침이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보였다. 찬바람/냉기 및 습한 환경에서 증상이 악화되며, 스트레칭 및 안정 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 감기, 비염, 요통, 소화불량 증상을 호소하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량으로 복만/복통을 2/5 정도 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5를 호소하며, 기상 시 피곤함을 느낀다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 없는 편이며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처는 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 39.4°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면부종이 있고, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 66kg
- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.6°C

■ 요약

43세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 66kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 5시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열(37.6°C)이 시작되었으며, 시간이 지날수록 증상이 악화되는 양상을 보인다. 발열로 인해 피로감을 느끼며, 경미한 오한을 호소한다. 콧물은 경미하게 흐르고 기침을 자주 한다. 요통은 강도 3/10으로 나타나며, 복만감과 복통이 3/5 정도로 느껴지는 소화불량 증상을 동반한다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피, 중강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회, 밤에 1회, 황색 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 깊게 잠들지 못하고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 있다(True/5).
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하지 않고 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 끼어있고 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 39세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 55kg
- 활력징후: BP 114/66 mmHg, 맥박 69/분, 체온 37.4°C

■ 요약

39세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 39세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 55kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 잦은 기침), 비염 증상 (잦은 재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 6시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 환경에 노출된 후 오한, 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발생하였다고 한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 스트레스, 습한 환경, 기름진 음식 섭취 시 악화되고 수면 및 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다. 동반되는 비염 증상으로 잦은 재채기가 있으며, 요통 (통증 강도 4/10) 및

복만/복통 (4/5)을 동반한 소화불량을 호소한다.

【과거력】

당뇨를 진단받아 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 (4/5)이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 10시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함을 호소하며, 입면장애 0/5, 중도각성 True/5이다.
- 한열: 열감/더위탐 경향이 있으며, 열수를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (통증 강도 4/10), 복통 (4/5)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/66 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 37.4°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 29세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 60kg
- 활력징후: BP 137/87 mmHg, 맥박 95/분, 체온 38.5°C

■ 요약

29세 남성 환자로, 1일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 60kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(심한 오한, 콧물, 간헐적인 기침), 비염 증상(간헐적인 재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 6일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 오한이 매우 심하며, 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느껴 일상적인 활동이 불가능한 상태이다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 간헐적으로

발생한다. 비염 증상으로 재채기를 어쩌다 한두 번 한다. 요통은 통증 강도 2/10 정도이다. 소화불량으로 복만/복통이 2/5 정도 발생한다. 흡연이 증상을 악화시키고, 스트레칭과 온찜질이 증상을 완화시킨다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 매일 음주를 한다. 흡연량은 0개피/일이다. 운동 강도는 중강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 1회 한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 1일 2-3회, 흑색 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한이 심하고 열감을 느낀다. 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/87 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 38.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:31:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 64세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 75kg
- 활력징후: BP 132/85 mmHg, 맥박 93/분, 체온 39.1°C

■ 요약

64세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 가끔 기침, 잦은 재채기, 요통, 복만/복통, 소화불량 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 75kg, BMI는 28.9이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 가끔 기침, 잦은 재채기, 요통, 복만/복통 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 2일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열(39.1°C)과 오한을 호소하며, 몸살 기운을 동반한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 가끔 기침을 한다. 비염 증상으로 재채기를 자주 한다. 요통은 강도 4/10으로 나타났다. 복만/복통은 4/5로 불편함을 호소한다. 온찜질과

휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 132/85 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 39.1°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이다. 부종은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이며, 어지러움을 3/5 정도 느낀다. 멍이 잘 든다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 47kg
- 활력징후: BP 118/74 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.7°C

■ 요약

65세 여성 환자로, 1일 전 수영 후 발현된 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상(재채기)을 주소로 내원함. 피로감, 무력감, 피부 건조, 이명, 난청, 어지럼증, 수족냉증을 동반하며, 과거 심장병 가족력이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 47kg, BMI는 16.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고, 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 발열 시 뚜렷한 열감을 느끼며 피로감과 불편감이 동반된다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며 몸살 기운이 느껴진다.

콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 하고, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이다. 기침은 간헐적으로 발생한다. 비염 증상으로 간헐적인 재채기가 있다. 요통은 경미하며(1/10), 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 간헐적으로 나타난다(1/5).

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화 상태는 보통이다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 12시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나(0/5), 중도각성은 있다(True/5).
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 없는 편이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 전신에 땀이 난다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 전반적으로 무기력함을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/74 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.7°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 절로 멍이 드는 경향이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크다/두껍다.
- 설태: 백태, 니태.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 75kg
- 활력징후: BP 113/67 mmHg, 맥박 60/분, 체온 39.2°C

■ 요약

65세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 소화불량, 요통, 피로감을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 75kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간 야근이 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전부터 발열(39.2°C), 오한, 경미한 콧물, 발작적인 기침, 빈번한 재채기, 3/10 강도의 요통, 3/5 정도의 복만/복통을 호소한다. 환자는 습한 환경에서 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 식이 조절을 하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 3/5 정도 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나면 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/67 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 39.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 멍이 잘 든다. 부종은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크고 태가 많다.
- 설태: 백색 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 완맥, 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 60세 / 남
- 신장/체중: 188cm / 78kg
- 활력징후: BP 141/94 mmHg, 맥박 78/분, 체온 38.0°C

■ 요약

60세 남성, 2-3일 전부터 오한, 발열, 콧물, 몸살 기운을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 188cm, 체중은 78kg, BMI는 22.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 저녁부터 오한, 발열, 콧물, 기침, 몸살 기운이 나타났다고 한다. 증상은 시간이 지남에 따라 호전되는 경향을 보이나, 여전히 불편함을 호소한다. 식이 조절을 통해 증상 완화를 시도하고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 나는 경우가 있으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/94 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 38.0°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며, 가려움은 없다. 어지러움을 호소한다 (5/5).
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥, 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 83세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 64kg
- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 106/분, 체온 37.8°C

■ 요약

83세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 심한 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 64kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 심한 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었다. 발열 증상은 심하지 않으나 오한이 뚜렷하게 나타나 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물이 매우 심하며, 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이다. 콧물로 인해 코 주변 피부가 빨갛으며 집중이 불가능하다고 호소한다. 발작적인 기침이 동반된다. 요통은 경미하게

느껴지며 (1/10), 특별한 양상은 없다. 복만감과 복통이 경미하게 (1/5) 있다. 휴식을 취하면 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 없는 편이나, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 (1/10) 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다. 이명은 3/5 강도, 난청은 5/5 강도이다. 어지러움은 4/5 강도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:39

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 85세 / 남
- 신장/체중: 162cm / 55kg
- 활력징후: BP 101/78 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.1°C

■ 요약

85세 남성 환자로, 감기 증상(심한 콧물, 빈번한 기침), 오한, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 남성 환자로 현장직에 종사하고 있다. 신장은 162cm, 체중은 55kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 2일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 감기 증상과 유사한 증상이 발현되어, 현재까지 증상이 비슷하거나 오르내림을 반복하고 있다고 한다. 감기 증상으로는 발열은 없으나, 오한이 뚜렷하여 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 심한 콧물과 빈번한 기침을 호소한다. 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이

불가능하다고 한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 3/10 정도로 나타나며, 소화불량으로 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통 변을 본다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/78 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.1℃, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 백태와 니태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 84kg
- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 104/분, 체온 37.6°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 경미한 콧물, 잦은 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 84kg, BMI는 29.8이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 잦은 기침을 주소로 내원하였다. 또한, 만성적인 재채기 발작, 전신 부종, 사지무력감을 동반하고 있다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 2시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열(약 37.6°C), 뚜렷한 오한, 몸살 기운을 호소하였다. 콧물은 경미하며, 잦은 기침을 동반한다. 환자는 발열로 인한 피로감을 느끼며 불편감을 호소한다. 최근 증상 호전을 보이고 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 규칙적이다. 복만/복통은 1/5 정도이다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 보며 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 온수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/73 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 37.6°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥

- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:32:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 69kg
- 활력징후: BP 100/65 mmHg, 맥박 89/분, 체온 38.4°C

■ 요약

45세 여성 환자로, 2-3일 전부터 오한, 발열, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 69kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(오한, 발열, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 5시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 사무실에서 에어컨 노출 후 오한을 느껴 발열, 콧물, 기침이 발생하였다고 한다. 현재 호전 중이며 몸살 기운이 동반될 수 있다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 빈번하게 발생한다. 요통은 4/10 강도이며, 소화불량으로 복만/복통이 4/5 정도이다. 악화 요인으로 과로를 호소하며, 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압을 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다. 생리 주기는 불규칙하며, 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이나, 오한을 뚜렷하게 느껴 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다. 수족냉증이 있으며, 온수를 선호한다.
- 땀: 무한이며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/65 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 38.4°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도가 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 85kg
- 활력징후: BP 133/83 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.8°C

■ 요약

54세 남성 환자로 2-3일 전부터 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원. 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 85kg, BMI는 29.8이다.

【주소증】

발현 시점 2-3일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 8시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

2-3일 전 사무실에서 냉방에 노출된 이후 오한이 발생하였고, 이후 콧물, 기침이 동반되었다. 환자는 뚜렷한 오한을 호소하며, 몸살 기운이 있다고 한다. 콧물은 계속 흐르는 양상이며, 기침은 하루 종일 지속된다고 한다. 안정 및 수면 시

증상 완화 경향을 보이거나, 스트레스, 음주, 찬바람에 노출 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 특이 소화불량 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색 변을 보며, 특이사항은 없다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/83 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 강력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 부긴실하다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 78kg
- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.8°C

■ 요약

45세 여성 환자로, 1일 전부터 오한, 발열, 심한 콧물, 전신 근육통 및 두통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 78kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 심한 콧물, 전신 근육통, 두통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 저녁부터 오한, 발열이 시작되었다. 현재 38.8°C의 발열이 있으며, 심한 콧물로 인해 일상생활에 불편함을 느끼고 있다. 전신 근육통과 두통을 동반하며, 온찜질 시 증상 완화된다고 한다. 기름진 음식 섭취 및 습한 환경에서 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 특별한 소화기 문제는 없다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠이 얹고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/95 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.8°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 59kg
- 활력징후: BP 153/95 mmHg, 맥박 73/분, 체온 38.3°C

■ 요약

14세 여성 환자로 1일 전부터 발열, 오한, 기침, 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 59kg, BMI는 25.9이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

한절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 오한, 발열이 시작되었다. 발열 시 몸이 불덩이처럼 뜨겁고, 40°C 이상의 고열로 일상생활이 불가능한 상태이다. 오한이 심하여 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼며, 심지어 이가 부딪히기도 한다. 콧물은 경미하게 있으며, 콧물은 약간 흐르지만 휴지가 거의 필요 없거나 가끔 한두 번 닦아내는

정도이다. 기침은 하루종일 지속적으로 나타난다. 재채기는 어쩌다 한두 번 간헐적으로 나타난다. 코막힘이나 코
가려움은 없다. 요통은 강도 4/10으로 나타난다. 소화불량으로 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 증상은 호전 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이다. 음료는 온수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/95 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 38.3°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없다. 멍이 잘 드는 편이다. 이명
강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥, 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:26

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 147cm / 64kg
- 활력징후: BP 150/90 mmHg, 맥박 63/분, 체온 39.0°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 64kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 8시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 발생하였다. 발열은 뚜렷한 열감을 동반하며, 이로 인해 피로감과 불편감을 호소한다. 오한은 뚜렷하게 추위를 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 빈번하게 발생한다. 재채기는 매일 지속적으로 나타난다. 요통은 통증 강도 3/10이며,

소화불량으로 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다. 증상은 호전 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮고, 과로 및 장시간 앉아있는 습관이 증상을 악화시키는 요인으로 작용하며, 식이 조절 시 증상이 완화된다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 복만/복통을 3/5 정도로 느낀다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/90 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 39.0℃, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 부종은 없고 피부는 정상적인 건조도를 보인다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 84세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 54kg
- 활력징후: BP 166/101 mmHg, 맥박 51/분, 체온 38.6°C

■ 요약

84세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 몸살, 경미한 콧물, 재채기, 요통, 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 54kg, BMI는 20.1이다.

【주소증】

발현시점 2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 몸살, 경미한 콧물), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 5일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열이 시작되었으며, 몸이 불덩이처럼 뜨겁다고 호소한다. 발열은 오르내림이 있으며, 어지러움과 혼미함을 동반할 수 있어 일상생활이 불가능한 상태라고 한다. 오한은 경미하게 느껴져 옷을 껴입거나

이불을 덮으려고 한다. 가벼운 몸살 기운이 동반될 수 있다. 콧물은 경미하게 흐르며, 휴지가 거의 필요 없거나 가끔 한두 번 닦아내는 정도이다. 기침은 간헐적으로 발생한다. 비염 증상으로 재채기를 자주 한다. 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 2/10이며, 양상은 특별히 설명하지 않았다. 소화불량 증상으로 복만/복통이 2/5 정도이며, 자세한 증상은 언급하지 않았다. 음주 시 증상이 악화되고, 수면을 취하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 복만/복통 2/5
- 대변: 변비, 녹색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 5회
- 수면: 10시간, 얕음, 기상시 피곤함. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5
- 한열: 보통, 수족냉증 있음, 열수를 선호
- 땀: 무한, 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낌
- 통증: 요통 2/10
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 166/101 mmHg, 맥박 51회/분, 체온 38.6°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 1/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설

- 설태: 백태, 다테

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥, 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 64kg
- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 76/분, 체온 39.0°C

■ 요약

76세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 소화불량, 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 64kg, BMI는 19.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 소화불량, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 5도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 35분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전, 추위에 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 발현되었다고 한다. 발열은 뚜렷한 열감과 함께 피로감을 동반하며, 체온은 39.0°C로 측정되었다. 오한이 심하여 몸이 떨릴 정도로 춥다고 호소한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르며, 기침과 재채기를 빈번하게 한다. 소화불량으로 복만감과 복통(2/5)을 호소하며, 요통(2/10)도

동반된다고 한다. 증상은 호전 중이며, 기름진 음식이나 습한 환경에서 악화되고, 수면 후에는 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만감과 복통을 호소한다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 39.0℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 관찰된다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 가려움증은 없다. 이명은 2/5, 난청은 3/5 정도로 호소하며, 어지럼증은 2/5 정도이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:33:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 88kg
- 활력징후: BP 112/82 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.5°C

■ 요약

45세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다. 평소 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 잦은 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 88kg, BMI는 36.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열, 콧물, 기침 증상이 나타났다. 발열은 37.5°C까지 오르내리며 뚜렷한 열감이 느껴지고 피로감이 동반된다. 오한으로 인해 추위를 심하게 느끼며 몸살 기운이 있다. 콧물은 중등도이며 계속

흘러 불편함을 호소한다. 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 재채기는 간헐적으로 어쩌다 한두 번씩 나타나며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통 강도는 4/10이다. 평소 소화불량을 자주 느끼며, 복만 및 복통이 4/5 정도로 심하다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일이다. 운동 강도는 낮으며, 장시간 앉아있는 습관이 있고 기름진 음식을 즐겨 먹으며 수면이 부족하다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 자주 느끼고 복만감을 호소한다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 색을 띠며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 가끔 두부에 땀이 나면 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁘다고 느끼며, 의욕은 높은 편이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/82 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 많으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 작다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 69kg
- 활력징후: BP 100/78 mmHg, 맥박 68/분, 체온 37.4°C

■ 요약

51세 남성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 69kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 약 5시간 동안 야외에서 작업을 진행한 후 오한 및 발열 증상이 발현되었다고 한다.

【현병력】

환자는 금일(00일) 오전부터 발열(약 37.4°C ~ 37.9°C), 오한, 콧물, 기침 증상을 호소하였다. 발열로 인한 피로감과 전신 불편감을 느끼며, 오한으로 인해 실내에서도 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도라고 한다. 콧물은 중등도로

계속 흘러 불편함을 느끼고 있으며, 기침 또한 빈번하게 발생한다고 한다. 재채기 증상도 동반되나 코막힘이나 코가려움은 없다고 한다. 요통 증상 (3/10)과 복만/복통(3/5)을 호소한다. 증상은 특별한 악화 또는 완화 요인 없이 지속적으로 나타나거나, 약간의 호전을 보이다가 다시 악화되는 양상을 보인다고 한다.

【과거력】

기존 질환으로 이상지질혈증과 고혈압을 진단받았으며, 현재 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하고 있으며, 음주를 자주 하고 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간에 9회, 야간에 2회 정도 본다.
- 수면: 하루 평균 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면 장애는 5점 만점에 5점, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 몸에 열이 많은 편은 아니며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 가끔 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력은 보통이며, 최근 기억력이 감퇴되었음을 느끼고 의욕이 저하된 상태이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/78 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 37.4°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전반적으로 피로감을 호소하며, 하지에 부종이 있고 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조한 편이며 가려움증은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.

- 설태: 백태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 52kg
- 활력징후: BP 106/66 mmHg, 맥박 100/분, 체온 38.7°C

■ 요약

76세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 52kg, BMI는 15.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 심한 오한, 콧물, 잦은 기침, 그리고 소화불량을 주소로 내원하였다. 또한 요통을 호소하였다.

【발병 에피소드】

내원 2일 전부터 과로와 수면 부족이 지속된 후 면역력 저하로 인해 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 발열, 오한, 콧물, 기침 증상을 호소하며, 특히 콧물이 심하여 일상생활에 불편함을 느끼고 있다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상을 보이며, 기침 또한 빈번하게 발생한다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타났다. 소화불량으로 복만 및 복통을 호소하며, 복통 강도는 4/5이다. 증상은 과로 및 습한 환경에서 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피, 중등도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 묽은 변 또는 연변을 하루 2-3회 본다. 색은 황색이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 깊게 자는 편이나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다. 자한은 없다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/66 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 38.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 홍삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 78kg
- 활력징후: BP 154/96 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.4°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침, 재채기, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 78kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 잦은 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 7일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열(37.4°C), 오한, 경미한 콧물, 잦은 기침을 호소하였다. 만성적인 재채기 발작과 2/10 강도의 요통, 복만/복통(2/5)을 동반한 소화불량을 호소한다. 습한 환경에서 증상이 악화되고, 스트레칭과 식이조절 시 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연량은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이다. 복만/복통 2/5를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통
- 소변: 맑음, 주간 4회, 야간 1회
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)
- 한열: 오한/추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다. 무한이다.
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/96 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.4°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 67kg
- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 113/분, 체온 38.1°C

■ 요약

41세 남성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 콧물, 기침, 재채기, 어지럼을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 187cm, 체중은 67kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1일 전부터 오한, 콧물, 기침, 재채기, 어지럼을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 3시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강한 사무실에서 근무 후 오한이 발생했으며, 이후 콧물, 기침, 재채기 증상이 나타났다. 오한은 따뜻한 환경에서도 지속되며 심한 추위를 느끼고 이가 부딪히는 증상 동반. 콧물은 계속 흘러 불편함을 호소. 기침은

간헐적으로 발생하며, 재채기는 빈번하게 나타난다. 어지럼 증상으로 일상 생활에 어려움을 겪고 있다고 한다. 악화 요인으로는 찬바람과 과로를 언급하였으며, 안정 및 스트레칭 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 특별한 소화 불량 증상은 없다. 오심이나 구토는 호소하지 않았다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 5회 중 1회 정도 있다.
- 한열: 평소 몸이 찬 경향은 아니나, 수족냉증이 있으며 따뜻한 물을 선호한다. 오한 증상 외 발열은 없다.
- 땀: 평소 땀이 없는 편이나, 야간에 도한이 있으며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 통증 강도는 1/10로 미미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이라고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 113회/분, 체온 38.1℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰된다. 피부는 건조하지 않고, 가려움증은 없다. 사지 무력감은 호소하지 않았다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태, 후태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 71kg
- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 81/분, 체온 39.0°C

■ 요약

27세 남성, 1일 전 수영 후 오한, 발열, 콧물, 기침을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 71kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 수영 후 두발을 말리지 않은 채 외출한 이후 콧물, 발열, 오한, 기침 등의 증상이 발현되었다. 발열은 39.0°C까지 상승했으며, 오한이 심하여 따뜻한 환경에서도 추위를 느끼고 이가 부딪히는 증상이 나타난다. 콧물은 경미하며, 기침은 간헐적으로 발생한다. 요통은 통증 강도 1/10로 미미하게 나타난다. 소화불량으로 인한 복만/복통은

1/5 정도로 경미하다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 악화 요인으로는 무거운 짐을 들거나 음주, 과로 등이 있으며, 휴식을 취하면 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 잘 흘리지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 건망이 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 39.0℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 5/5이며, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 95kg
- 활력징후: BP 114/61 mmHg, 맥박 74/분, 체온 38.3°C

■ 요약

65세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 95kg, BMI는 35.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 오한, 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발현되었다고 한다. 발열로 인해 피로감과 불편감을 느끼며, 38.3°C의 체온을 보인다. 오한으로 인해 추위를 심하게 느끼며, 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보인다. 기침 또한 빈번하게 나타난다. 습한 환경에서 증상이 악화되는 경향을 보이며, 휴식과 식이 조절

시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병의 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 특별한 소화기 문제는 호소하지 않는다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하지만, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 많이 나는 편이며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁜 편이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/61 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 38.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 체질이다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:34:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 74kg
- 활력징후: BP 135/83 mmHg, 맥박 84/분, 체온 38.2°C

■ 요약

61세 남성, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 74kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 5시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열(38.2°C)이 발생하였으며, 콧물, 기침, 몸살 기운을 동반하고 있다. 발열은 오르내림이 있으며, 콧물은 심하고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 한다고 호소한다. 기침은 발작적인 양상을 보이며, 요통과 소화불량 증상도 함께 나타나고 있다. 스트레칭과 온찜질 시 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨를 진단받고 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만 및 복통을 호소한다 (4/5).
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소에는 보통의 한열 경향을 보이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며, 주로 두부에 땀이 난다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/83 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 38.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼고 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 138cm / 39kg
- 활력징후: BP 120/80 mmHg, 맥박 84/분, 체온 38.1°C

■ 요약

11세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 여성 환자로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 39kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 5도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 55분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전, 추운 날씨에 장시간 노출된 후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발생하였다. 발열은 뚜렷한 열감을 동반하며, 37.4°C ~ 37.9°C 사이의 미열이 지속된다. 오한은 심하며, 몸이 떨릴 정도로 추위를 느낀다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 발작적으로 나타난다. 비염 증상으로 간헐적인 재채기가 있으며, 요통은 경미하고

소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다. 찬바람/냉기에 노출되거나 스트레스를 받으면 증상이 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압, 당뇨

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화는 보통이다. 복만/복통 1/5 호소
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 무거움을 느낌, 입면장애 3/5, 중도각성 2/5
- 한열: 열감/더위 탐, 수족냉증은 없으며, 따뜻한 음료 선호
- 땀: 무한, 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 열감을 느낌
- 통증: 요통 (통증 강도 1/10)
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 무기력하며, 스트레스 대처력은 좋음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/80 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 38.1℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지 무력감 호소, 멍이 잘 드는 편, 부종은 없음. 피부 건조도는 정상, 가려움 없음
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 46세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 92kg
- 활력징후: BP 102/75 mmHg, 맥박 98/분, 체온 38.2°C

■ 요약

46세 남성, 2-3일 전부터 오한, 발열, 몸살기운, 흑색변, 혈뇨 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 92kg, BMI는 30.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 5도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 24분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

2-3일 전, 영하의 날씨에 장시간 노출된 후 오한, 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 함께 재채기, 요통, 소화불량 증상이 발현되었다. 환자는 발열로 인한 피로감과 불편감을 호소하며, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도라고 한다. 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되며, 스트레칭과 수면 후에는 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상과 함께 복만 및 복통이 경미하게 나타난다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/75 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 38.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 95kg
- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 108/분, 체온 37.7°C

■ 요약

50세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침, 재채기 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 95kg, BMI는 37.1이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침, 재채기를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간 계속된 야근 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 뚜렷한 열감(약 37.7°C)을 호소하며 피로감과 불편감을 동반하고 있다. 오한 증상으로 뚜렷하게 추위를 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 한다고 한다. 콧물은 경미하게 있으며, 기침과 재채기를 자주 하는 편이다. 요통은 통증 강도 2/10 정도이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다. 악화 요인으로는 수면

부족과 기름진 음식 섭취가 있으며, 수면을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피, 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 있고 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 대변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 황색의 소변을 보며, 주간 12회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나빠지며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5, 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 84세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 64kg
- 활력징후: BP 148/91 mmHg, 맥박 91/분, 체온 38.9°C

■ 요약

84세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 64kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 6도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 25분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 추위에 노출된 후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 요통, 소화불량 증상 발현되었다고 한다. 발열은 뚜렷하며 피로감을 동반하고, 오한은 경미하다. 콧물은 매우 심하여 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 간헐적인 기침을 한다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인한 복만, 복통을 호소한다. 증상은 현재 호전 중이다. 장시간

앉아있는 자세는 증상을 악화시킨다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량, 복만, 복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5회이다.
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/91 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 38.9°C, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 홍맥이다.
- 맥력: 강력하다.
- 맥상: 활맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 49kg
- 활력징후: BP 109/60 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.6°C

■ 요약

14세 여성 환자로, 1일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량 증상을 호소함. 야근 후 피로 누적으로 증상 발현되었으며, 오한, 잦은 기침, 재채기, 요통, 복만/복통 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 154cm, 체중은 49kg, BMI는 20.7이다.

【주소증】

1일 전부터 감기/급성상기도감염 증상과 더불어 요통 및 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야근이 6일간 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열은 없으나 오한을 호소하며, 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 경미하게 흐르고, 기침과 재채기를 자주 한다. 요통은 강도 3/10이며, 복만/복통은 3/5로 나타난다. 식이조절과 온찜질 시 증상이 완화된다고

한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 29일이며 불규칙하고, 생리 기간은 0일, 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 5시간 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 무기력감을 느낀다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/60 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 얇다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 136cm / 32kg
- 활력징후: BP 106/71 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.2°C

■ 요약

11세 여성 환자로, 1일 전 영하의 추운 날씨에 장시간 노출된 후 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침을 주소로 내원함. 요통 및 소화불량 증상도 함께 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 여성 환자로 학생이다. 신장은 136cm, 체중은 32kg, BMI는 17.3이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 11도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 33분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 추위에 노출된 후 발열(38.2°C)과 오한을 호소하였다. 발열로 인해 피로감과 불편감을 느끼며, 춥다고 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮으려고 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 간헐적으로 나타난다. 요통은 강도 1/10로

미미하게 나타났다. 소화불량으로 복만 및 복통을 1/5 강도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통은 1/5 정도이다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/71 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소설이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 64세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 92kg
- 활력징후: BP 106/65 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.6°C

■ 요약

64세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 92kg, BMI는 27.8이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 14도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 35분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 추위에 노출된 후 발열(37.6°C), 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상을 호소하였다. 발열은 뚜렷한 열감이 느껴지며, 이로 인해 피로감이나 불편감이 동반된다. 오한은 뚜렷하게 춥다고 느껴져 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상을 보인다. 기침은 빈번하게 발생한다. 비염 증상으로는 재채기가

간헐적으로 나타난다. 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 2/5 정도로 나타난다. 증상은 오르내림을 반복하는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 통증 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/65 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.6℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움을 호소한다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이다. 복합맥상으로 세약맥이 관찰된다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:35:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 60kg
- 활력징후: BP 115/60 mmHg, 맥박 118/분, 체온 37.8°C

■ 요약

42세 남성, 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열, 몸살 기운, 경미한 콧물, 가끔 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 60kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 몸살 기운, 경미한 콧물, 가끔 기침을 주소로 내원하였다. 또한 만성적인 재채기 발작, 3/10 강도의 요통, 3/5 정도의 복만/복통을 호소하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 2시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 惡寒, 發熱 증상이 발생하였으며, 점차 심해지는 양상이다. 휴식을 취하면 증상이 다소 완화된다고 한다. 동반되는 증상으로는 콧물, 기침, 몸살 기운이 있다. 비염 증상으로는 만성적인 재채기 발작이 있으며,

요통 및 소화불량 증상도 함께 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 2회 정도 소변을 본다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통은 3/10 정도의 강도이다. 복만/복통은 3/5 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 건망이 있고 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/60 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 37.8°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면부 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 51kg
- 활력징후: BP 114/67 mmHg, 맥박 78/분, 체온 38.0°C

■ 요약

50세 남성, 2-3일 전부터 발열, 오한, 전신 무력감 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 51kg, BMI는 16.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 오한, 발열, 몸살 기운이 시작되었다고 한다. 발열은 뚜렷한 열감이 느껴지며, 이로 인해 피로감이나 불편감이 동반된다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침을 자주 한다. 비염 증상으로는 재채기를 자주 한다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타난다.

소화불량 증상으로 복만, 복통을 3/5 정도로 호소한다. 증상은 수면 부족과 찬바람/냉기에 노출 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑고, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 야간 발한은 없다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/67 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 38.0°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 홍조를 띈다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 71kg
- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 55/분, 체온 38.0°C

■ 요약

68세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원함. 평소 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 사무직에 종사.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 71kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 3시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 에어컨이 강한 사무실에서 근무 후 오한이 발생했으며, 이후 발열(38.0°C), 콧물, 기침 증상이 나타났다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 몸살 기운을 동반한다. 악화 요인은 무거운 짐을 드는 것이며, 안정 및 스트레칭

시 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 해당 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 더운 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 55회/분, 체온 38.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하며 각질과 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 70kg
- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 70/분, 체온 38.1°C

■ 요약

48세 여성 환자로 2-3일 전부터 감기 증상 (오한, 콧물, 기침)을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 70kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (심한 오한, 콧물, 빈번한 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

4일간의 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다.

【현병력】

2-3일 전 야근 후 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 나타났으며, 따뜻하게 하면 증상이 완화되는 경향을 보인다. 발열 증상은 없으나 오한이 매우 심하여 일상 생활에 지장을 초래한다. 콧물은 계속 흘러 멈추지 않으며, 휴지를 자주 사용해야 할 정도이다. 기침은 빈번하게 발생한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만 및 복통 (2/5)을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처력은 좋으나, 무기력감을 호소한다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 38.1°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 67kg
- 활력징후: BP 119/74 mmHg, 맥박 79/분, 체온 38.2°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 2-3일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침) 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 180cm, 체중은 67kg, BMI는 20.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

환자는 4일간 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다고 진술하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 오한, 콧물, 기침 증상을 호소하였다. 오한은 뚜렷하며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다고 한다. 기침은 간헐적으로 발생한다. 또한, 요통(통증 강도 4/10)과 복만/복통(강도 4/5)을 동반한 소화불량 증상을 호소하였다. 악화 요인으로 음주, 스트레스,

장시간 앉기가 있으며, 완화 요인으로는 안정과 온찜질이 있다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 평소 운동 강도는 높다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 2회.
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 온수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10).
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/74 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 38.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 멍이 절로 생기는 증상이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이며, 어지러움을 5/5 강도로 느낀다고 한다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥, 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 63kg
- 활력징후: BP 125/60 mmHg, 맥박 69/분, 체온 38.6°C

■ 요약

43세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살기운, 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 63kg, BMI는 25.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살기운, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 발열이 시작되었으며, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운, 소화불량 증상이 동반되었다. 휴식을 취하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 한다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통(4/5)을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 횡수는 보통이다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에서 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/60 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 38.6°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 소(小)하다.
- 설태: 백태, 후태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 84kg
- 활력징후: BP 108/78 mmHg, 맥박 75/분, 체온 38.7°C

■ 요약

40세 여성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있으며, 과로 시 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 84kg, BMI는 32.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 2-3일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 6시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열(38.7°C)이 시작되었다고 호소한다. 발열은 오르내림이 있으며, 심한 오한으로 인해 따뜻한 환경에서도 추위를 느끼고 이가 부딪히는 증상이 동반된다. 콧물은 계속 흘러 휴지를 자주

사용하며, 기침 또한 빈번하게 발생한다. 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 복만/복통이 3/5 강도로 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 보며 보통의 형태이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 좋지 않고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/78 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 38.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 피부는 건조하며 각질과 가려움증이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 79kg
- 활력징후: BP 116/74 mmHg, 맥박 83/분, 체온 38.1°C

■ 요약

50세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 79kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 6일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 38.1°C의 발열과 오한을 호소하며, 콧물은 중등도로 나타난다. 기침은 간헐적으로 발생하며, 재채기는 지속적으로 나타난다. 요통은 4/10 강도로 발생하며, 소화불량과 함께 복만 및 복통이 4/5 강도로 나타난다. 찬바람/냉기에 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 얕은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5) 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 무한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 4/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/74 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 38.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 73세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 64kg
- 활력징후: BP 176/105 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.7°C

■ 요약

73세 남성 환자로, 1일 전 영하의 날씨에 장시간 노출 후 감기 증상 (오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 173cm, 체중은 64kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 15도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 21분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 금일(발현 1일) 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 호소하였다. 특히 오한이 매우 심하여 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼며, 이가 부딪히기도 한다. 기침은 하루종일 지속적으로 나타난다. 재채기는 발작

수준으로 나타난다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다. 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5 강도로 나타난다. 안정 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 5개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일, 불규칙하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비, 흑색변, 보통의 양상을 보인다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다. 극심한 오한을 호소한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에서만 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요추 부위 통증을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 176/105 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.7℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 절로 멍이 든다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 77kg
- 활력징후: BP 149/99 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.0°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상 (재채기)을 호소하며, 요통 및 소화불량 증상을 동반함. 가족력으로 고혈압, 당뇨가 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 187cm, 체중은 77kg, BMI는 22.0이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 감기에 걸린 가족을 간호하던 중, 3일 후 본인도 비슷한 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 발생하였다. 발열은 뚜렷한 열감이 느껴지며, 피로감과 불편감을 동반한다. 오한이 심하여 몸이 떨릴 정도로 춥다고 한다. 콧물이 매우 심하여 휴지로 감당하기 어려울

정도이며, 코 주변 피부가 헐고 집중이 불가능하다고 호소한다. 기침은 하루종일 지속적으로 나타난다. 재채기를 자주 하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통이 3/5 정도로 나타난다. 환자는 증상이 호전 중이라고 진술한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 중이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 12시간 수면을 취하지만 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 현재 오한이 심하다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 잘 나지 않으나, 야간/도한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/99 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 절로 멍이 든다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대/태이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 65kg
- 활력징후: BP 103/77 mmHg, 맥박 92/분, 체온 39.2°C

■ 요약

62세 여성 환자로, 2-3일 전 수영 후 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 65kg, BMI는 27.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 수영 후 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상 발현되었다. 오한은 매우 심하며, 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼고 이가 부딪히는 증상 동반되어 일상적인 활동이 불가능한 상태이다. 콧물은 중등도로 계속 흘러내리며, 기침은 빈번하게 발생한다. 비염 증상으로 재채기가 간헐적으로 나타나지만, 코막힘이나 코 가려움은 없다.

요통은 경미(1/10)하며, 소화불량으로 인한 복만/복통 또한 경미(1/5)하게 나타난다. 증상은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이며, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었고 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 소화는 보통이다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있다. 수족냉증이 있으며, 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다 (1/10).
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/77 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 39.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소

- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 155cm / 66kg
- 활력징후: BP 117/75 mmHg, 맥박 70/분, 체온 38.5°C

■ 요약

20세 남성, 1일 전부터 오한, 콧물, 기침을 호소하는 감기 환자

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 66kg, BMI는 27.5이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 10도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 26분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전, 영하의 날씨에 장시간 노출된 후 오한, 콧물, 기침 등의 증상이 발생하였다. 오한이 심하여 따뜻한 환경에서도 추위를 느끼며, 이가 부딪히는 증상도 나타난다. 콧물은 지속적으로 흘러 휴지를 자주 사용하며, 기침도 빈번하게 발생한다. 온찜질 및 따뜻하게 하는 것으로 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하고, 흡연은 하루에 0개피, 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회로 불규칙하며, 특이 소화기 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 보며 묽거나 연한 변의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 현재 오한이 심하다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 발한 정도는 무한이다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/75 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 38.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없고, 피부는 건조하다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 145cm / 41kg
- 활력징후: BP 157/97 mmHg, 맥박 50/분, 체온 37.8°C

■ 요약

13세 남학생, 1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 145cm, 체중은 41kg, BMI는 19.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 4일간 과로와 수면 부족이 지속되어 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 감기 증상으로 발열(37.8°C), 오한을 호소하며, 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 지속적으로 흐르며 휴지를 자주 사용하고, 기침은 간헐적으로 나타난다. 비염 증상으로 재채기를 매일 한다고 한다. 요통은 통증 강도 1/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통(1/5)을 호소한다. 과로와 습한 환경에서 증상이 악화되고, 온찜질과

스트레칭 시 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 평소 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통(1/5)이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통 크기이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 아고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/97 mmHg, 맥박 50회/분, 체온 37.8°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 명은 정상이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 74kg
- 활력징후: BP 110/79 mmHg, 맥박 100/분, 체온 38.8°C

■ 요약

55세 여성, 1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 74kg, BMI는 27.2이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

6일간의 과로와 수면 부족이 지속된 후 면역력 저하로 인해 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 증상을 호소하였다. 발열은 정상 체온을 유지하고 있으며, 오한은 경미하게 느껴져 옷을 껴입거나 이불을 덮으려고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오고, 기침은 하루 종일 지속된다. 재채기는 간헐적으로 발생한다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량으로 인해 복만/복통이

4/5 강도로 발생한다. 악화 요인으로는 찬바람/냉기, 수면 부족, 흡연이 있으며, 완화 요인으로는 휴식과 온찜질이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 5시간, 깊은 수면을 취하나 기상 시 피곤함을 느끼며, 입면장애는 5/5, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한/추위를 타며, 열수를 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 야간/도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처력은 보통이며, 기억력은 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/79 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 38.8°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지무력감이 있다. 피부는 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 84세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 64kg
- 활력징후: BP 111/60 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.5°C

■ 요약

84세 여성 환자로, 1일 전부터 감기 증상 (오한, 콧물, 간헐적 기침)과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 64kg, BMI는 24.7이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (오한, 콧물, 간헐적 기침)과 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 2일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 오한을 호소하며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도로 뚜렷하게 추위를 느낀다고 한다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 증상이 있다. 기침은 간헐적으로 나타난다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 3/5 강도로 호소한다. 안정 및식이조절 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다. 여성력으로는 생리주기 28일, Menopause 상태이며, 생리통은 없었다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 3/5 강도로 나타난다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통의 형태이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 1회 빈도로 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 길지만, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 음료는 온수를 선호한다.
- 땀: 무한이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 3/10 강도로 발생한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/60 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.5°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삽맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:37:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 58kg
- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.8°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 2-3일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 몸살 기운과 함께 감기 증상을 호소하며 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 158cm, 체중은 58kg, BMI는 23.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

2-3일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 오한을 느껴 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 몸살 기운과 함께 경미한 콧물과 빈번한 기침 증상을 호소한다. 증상은 현재 호전 중이다. 비염 증상으로 매일 재채기를 한다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 높음.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 뭉거나 연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에서만 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤하거나 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 기억력이 좋지 않고 무기력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/60 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.8°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움이 있다. 사지 무력감은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:38:04

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 65kg
- 활력징후: BP 127/84 mmHg, 맥박 74/분, 체온 38.5°C

■ 요약

45세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 전신 근육통, 두통을 호소하며 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 65kg, BMI는 25.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 전신 근육통, 두통을 주소로 내원하였다. 감기 증상과 비염 증상, 요통, 소화불량 증상을 동반한다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 6시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열(38.5°C), 전신 근육통 및 두통이 발생하였다고 호소한다. 오한은 심하며, 따뜻한 환경에서도 추위를 느끼고 이가 부딪히는 증상이 있다. 콧물은 중등도이며 지속적으로 흐르고, 기침은 하루 종일

지속적으로 발생한다. 재채기를 자주 하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 강도 4/10이며, 복만/복통은 4/5이다. 악화 요인은 찬바람/냉기이며, 스트레칭 시 증상 완화를 느낀다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 1회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 True/5
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀은 전신에 나며 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 땀: 무한, 전신, 땀 흘린 후 상쾌.
- 통증: 요통 (4/10).
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/84 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 38.5°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조.

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 정상.
- 설태: 백태, 니태.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:38:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 85kg
- 활력징후: BP 108/77 mmHg, 맥박 80/분, 체온 38.4°C

■ 요약

55세 여성 환자로, 2-3일 전 수영 후 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)과 비염 증상(재채기)을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 가족력(고혈압, 중풍)이 있으며, 습한 환경과 수면 부족 시 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 85kg, BMI는 33.2이다.

【주소증】

발현시점 2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)과 비염 증상(재채기)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고, 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 수영 후 감기 증상이 발생하였다고 호소한다. 주요 증상으로는 38.4°C의 발열, 오한, 심한 콧물, 잦은 기침, 재채기 등이 있다. 습한 환경과 수면 부족 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 현재 호전 중이라고 한다. 발열은

뚜렷한 열감을 동반하며, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 불가능하다고 한다. 기침은 빈번하게 발생하며, 재채기도 잦은 편이다.

【과거력】

고혈압, 당뇨로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

주간 음주를 하며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 현재는 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠이 얹고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/77 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 38.4℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:38:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 148cm / 47kg
- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.9°C

■ 요약

13세 남환, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 148cm, 체중은 47kg, BMI는 21.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열(약 37.4°C ~ 37.9°C)이 시작되었으며, 콧물이 심하게 흐르고 기침을 자주 한다고 한다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 이로 인해 코 주변 피부가 헛고 집중이 어렵다고 호소한다. 몸살 기운과 함께 요통 및 소화불량 증상도 동반되었다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만 및 복통(4/5)을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 5회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에서 나며 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 125/86 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.9°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다고 한다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하나 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀가 작다.
- 설태: 황태와 박태가 혼재되어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:38:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 79세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 73kg
- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 51/분, 체온 38.2°C

■ 요약

79세 남성 환자로, 1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 73kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 5도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 54분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 추위에 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 재채기 발작 수준의 비염 증상을 호소하였다. 또한 요통과 복만/복통을 동반한 소화불량 증상을 겪고 있다. 휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 중풍의 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 3/5.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑은 소변, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 수면 시간은 12시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 전신 발한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 51회/분, 체온 38.2°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대/태
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:38:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 60kg
- 활력징후: BP 127/86 mmHg, 맥박 93/분, 체온 38.5°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살, 소화불량 등을 호소함

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 155cm, 체중은 60kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침, 몸살, 소화불량, 요통 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열(38.5°C), 전신 근육통, 두통을 호소하였다. 활동하기 힘들고 눕고 싶어하며, 경미한 오한과 몸살 기운을 동반한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르며, 기침을 자주 한다. 재채기를 빈번하게 하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 강도 3/10으로 나타난다. 복만 및 복통은 3/5 정도로 불편감을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 12회, 야간 1회.
- 수면: 수면시간 5시간, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(True/5), 중도각성(True/5).
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한, 특히 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 3/10.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/86 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 38.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:38:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 58kg
- 활력징후: BP 109/78 mmHg, 맥박 50/분, 체온 37.7°C

■ 요약

15세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 기침, 콧물, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 58kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

3일간 과로와 수면 부족이 지속된 후 면역력 저하로 인해 증상이 발생하였다.

【현병력】

발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 뚜렷한 열감이 느껴지며 피로감과 불편감을 동반한다. 오한은 경미하게 느껴져 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침을 자주 한다. 비염 증상으로는 재채기를 간헐적으로 한다. 요통은 강도 3/10으로 나타난다. 소화불량으로 복만/복통을 3/5 정도로 호소한다. 휴식을 취하면 증상이

완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일, 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/78 mmHg, 맥박 50회/분, 체온 37.7°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 절로 멍이 드는 증상이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:38:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 84세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 84kg
- 활력징후: BP 106/74 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.9°C

■ 요약

84세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 84kg, BMI는 29.1이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 저녁부터 몸살 기운과 함께 발열, 오한, 콧물, 기침이 시작되었다고 한다. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 오르내림이 있으며, 뚜렷한 열감을 호소한다. 오한은 경미하게 느껴져 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 기침은 하루 종일 지속적으로 나타나며, 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이다.

찬바람에 노출 시 증상이 악화되며, 수면 후에는 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 0.0개피/일 정도 하였다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이며, 특이 소화불량 증상은 없고, 오심/구토 증상도 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질은 낮은 편이다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다. 기상 시 몸이 무겁다고 한다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으나 통증 강도는 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 스트레스 대처력은 좋다고 한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/74 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.9℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침세

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 76kg
- 활력징후: BP 119/66 mmHg, 맥박 75/분, 체온 38.1°C

■ 요약

76세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 몸살 기운을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 76kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 몸살 기운을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 7시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 사무실에서 에어컨에 장시간 노출된 후 오한이 발생했으며, 이후 발열, 기침, 콧물, 경미한 몸살 기운이 나타났다. 증상은 호전되는 추세이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 횡수는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/66 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 38.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥, 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 56kg
- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 68/분, 체온 38.9°C

■ 요약

77세 남성 환자로, 1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 56kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 2일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 등의 증상이 발생하였다. 발열은 38.9°C까지 상승했으며, 오한과 더불어 경미한 몸살 기운을 호소한다. 콧물은 계속 흘러 멈추지 않고, 기침을 자주 한다고 한다. 재채기도 빈번하게 발생한다. 요통은 강도 2/10으로 심하지 않다. 소화불량으로 복만, 복통을 호소한다. 증상은 현재

호전 중이다.

【과거력】

이상지질혈증과 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 본다고 한다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 주로 두부에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/66 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 38.9℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 53세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 74kg
- 활력징후: BP 109/68 mmHg, 맥박 91/분, 체온 38.4°C

■ 요약

53세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 기침, 콧물, 재채기 등의 감기 증상과 묽은 변, 전신 부종, 가려움, 이명, 난청 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 74kg, BMI는 27.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 기침, 콧물, 재채기 등의 감기 증상 및 묽은 변, 전신 부종, 가려움, 이명, 난청 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

6일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 상기 증상들이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전부터 38.4°C의 발열과 함께 오한, 경미한 몸살 기운을 호소하였다. 콧물은 경미하게 흐르며,

하루종일 지속적인 기침을 한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 강도 1/10 정도로 미미하다. 또한, 복만 및 복통을 1/5 정도로 호소한다. 증상은 점차 악화되는 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력이 나쁘다고 호소하나, 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/68 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 38.4°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 호소하지 않으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 31세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 63kg
- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 61/분, 체온 39.3°C

■ 요약

31세 남성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 63kg, BMI는 18.6이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 6시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 이후 콧물, 기침, 전신 근육통, 두통이 동반되었다고 한다. 발열은 38°C에서 39.9°C 사이로 오르내림을 보이며, 활동이 힘들 정도로 무기력감을 느껴 주로 누워 지낸다고 한다. 오한은 심하지 않으나 추위를 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮으려 하며, 가벼운 몸살 기운이 있다고 한다. 콧물은

지속적으로 흐르며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 한다. 간헐적인 기침 증상도 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨 및 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하루 0개피이며, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색변, 보통의 형태이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한이 있으며, 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 39.3℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 절로 멍이 드는 경우가 있다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小(소설)
- 설태: 백태, 厚苔(후태)

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 72kg
- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 87/분, 체온 37.6°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 1일 전 수영 후 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 72kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 수영 후 오한을 느끼며 콧물과 간헐적인 기침이 발생하였다. 요통은 3/10 강도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 3/5 강도로 발생한다. 휴식을 취하면 증상이 완화되나, 스트레스 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화는 보통이다. 복만/복통 3/5
- 대변: 1회/일, 흑색 변, 보통
- 소변: 맑은 색, 주간 9회, 야간 0회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀을 흘린 후 열감을 느낌, 발한 정도는 보통, 전신에서 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/61 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 37.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면부 부종이 관찰되며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며, 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 부긴실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 58kg
- 활력징후: BP 128/85 mmHg, 맥박 67/분, 체온 37.9°C

■ 요약

17세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 58kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 11도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 32분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 증상을 호소한다. 발열은 37.4°C에서 37.9°C 사이로 측정되며, 뚜렷한 열감을 동반한다. 오한으로 인해 추위를 심하게 느끼며, 몸살 기운을 호소한다. 콧물은 중등도로 지속적으로 흐른다. 기침은 빈번하게 발생한다. 상기 증상들은 따뜻하게 하거나 안정을 취할 때 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이며, 주로 장시간 앉아서 생활한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(True/5), 중도각성(True/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한이 있으며, 특히 두부에 땀을 많이 흘리고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나빠지며, 건망이 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 128/85 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 37.9°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태이며 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 32세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 73kg
- 활력징후: BP 146/95 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.6°C

■ 요약

32세 남성, 2-3일 전부터 발열, 오한, 묽은 변, 혈뇨, 전신 부종, 사지무력감, 피로 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 177cm, 체중은 73kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기/급성상기도감염 증상으로 내원하였다. 환자는 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침을 호소한다.

【발병 에피소드】

4일간의 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열, 오한을 호소하며, 콧물과 잦은 기침이 동반된다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 습한 환경에서 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 특히 소화기 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽음/연변 양상이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 3회 발생한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 호소한다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한은 보통 정도이며, 전신에서 나타나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/95 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:39:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 84kg
- 활력징후: BP 157/91 mmHg, 맥박 51/분, 체온 38.2°C

■ 요약

55세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 몸살 기운을 호소하며 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 84kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 몸살 기운을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 38.2°C의 발열과 오한을 호소하며, 콧물과 몸살 기운이 동반되었다. 증상은 오르내림이 있으며, 온찜질 시 일시적인 완화가 있다. 장시간 앉아있는 습관, 습한 환경, 수면 부족 등이 증상 악화에 영향을 미치는 것으로

보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 5개피, 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 특별한 소화 불량 증상은 없으나 복만감과 복통이 1/5 정도 느껴진다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/91 mmHg, 맥박 51회/분, 체온 38.2℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 46세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 67kg
- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.6°C

■ 요약

46세 남성 환자로, 1일 전 에어컨 강한 사무실 근무 후 오한, 발열, 콧물, 기침, 재채기, 녹색변, 혈뇨, 피로감, 사지무력감, 피부 가려움, 이명, 수족냉증 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 67kg, BMI는 21.1이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 4시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨 강한 환경에 노출된 후 오한이 발생하였고, 이후 발열 (37.6°C)과 함께 콧물, 기침 증상이 나타났다. 비염 증상으로 재채기가 지속적으로 나타나며, 간헐적인 요통과 복만, 복통을 동반한 소화불량 증상을

호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 반복한다. 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하고, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소에는 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리나, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉한 느낌이 있다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다. 복만, 복통이 있으며, 강도는 2/5이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/66 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.6℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 체질이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 80세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 77kg
- 활력징후: BP 104/63 mmHg, 맥박 73/분, 체온 38.6°C

■ 요약

80세 여성 환자로, 2-3일 전 수영 후 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 사지무력감, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 80세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 77kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 수영 후 콧물 증상 발생 후 발열, 오한, 기침 등의 감기 증상이 동반되었다. 발열은 오르내림이 있으며, 38.6°C까지 상승한다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다. 콧물은 계속 흘러 휴지를 자주 사용해야 하며, 기침도 빈번하게 발생한다. 또한, 전신 근육통과 두통을 호소하며, 활동이 힘들어 눕고 싶어 한다.

찬바람/냉기에 노출 시, 음주, 수면 부족 시 증상이 악화되며, 온찜질과 식이 조절 시 증상이 완화된다. 소화불량으로 인한 복만/복통(2/5)이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량으로 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 7시간 수면, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10)이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/63 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 38.6℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지무력감을 호소한다. 이명(4/5), 난청(3/5), 어지러움(3/5)이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 얇다.
- 설태: 황색, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 78세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 85kg
- 활력징후: BP 100/68 mmHg, 맥박 93/분, 체온 38.9°C

■ 요약

78세 남성, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 가끔 기침을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 85kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 가끔 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

6일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열(38.9°C)과 뚜렷한 오한을 호소하며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 몸살 기운이 동반될 수 있다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 간헐적으로 나타난다. 재채기는 어쩌다 한두 번 하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 1/10으로 미미하다. 소화불량 증상으로 복만/복통이 1/5 정도로

느껴진다. 악화 요인으로서는 스트레스, 기름진 음식, 찬바람/냉기가 있으며, 식이 조절 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 특이 소화불량 증상 호소
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳음/경변
- 소변: 맑음, 주간 12회, 야간 0회
- 수면: 7시간, 얕음, 입면장애 1/5, 중도각성 True/5, 기상 시 피곤함
- 한열: 보통, 온수 선호, 수족냉증은 없다
- 땀: 보통, 야간/도한, 땀을 흘린 후 열감을 느낌
- 통증: 요통 (1/10)
- 정신/정서: 기억력 좋음, 의욕 보통, 스트레스 대처력 좋음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/68 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 38.9°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종, 멍이 잘 들, 피부는 각질이 있고 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 56kg
- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 87/분, 체온 38.0°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 56kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량 (복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침을 호소하였다. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 측정되며, 오한으로 인해 추위를 심하게 느끼고 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 재채기는 간헐적으로 나타난다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다. 소화불량으로 복만/복통을 호소하며 불편감을 느낀다고 한다. 습한

환경과 찬바람/냉기에 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 식이 조절 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증과 당뇨를 진단받았으며, 현재 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었으며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 2회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 하루 12시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 38.0℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 85kg
- 활력징후: BP 159/95 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.4°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강한 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 85kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 7시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전, 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 오한을 느껴 내원하였다. 이후 발열, 콧물, 기침 증상이 동반되었으며, 따뜻하게 하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 특별한 소화기 문제는 호소하지 않았다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 무기력감을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 159/95 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.4°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 162cm / 59kg
- 활력징후: BP 126/83 mmHg, 맥박 54/분, 체온 38.1°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)과 비염 증상(지속적인 재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 59kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 지속적인 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 수영 후 발생한 감기 증상으로 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소한다. 발열 시 몸이 불덩이처럼 뜨겁고 어지러움과 혼미함이 동반될 수 있으며, 일상생활이 불가능하다고 한다. 오한이 심하며, 몸이 떨릴 정도로 춥게 느껴진다고 한다.

콧물은 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 양상을 보인다. 기침은 발작적인 형태로 나타난다. 비염 증상으로 지속적인 재채기를 호소한다. 코막힘이나 코 가려움은 없다고 한다. 요통은 통증 강도 1/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만/복통을 1/5 강도로 호소한다.

【과거력】

당뇨로 인해 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색을 띠고 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 4회, 야간 0회 정도이다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 건망이 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/83 mmHg, 맥박 54회/분, 체온 38.1℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 피부는 각질이 있으며 가려움이 있다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 71kg
- 활력징후: BP 101/74 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.4°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 1일 전 수영 후 발생한 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)과 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 71kg, BMI는 28.1이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고, 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 감기 증상이 발현되었으며, 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 나타났다. 발열은 뚜렷한 열감과 피로감을 동반하며 약 37.4°C ~ 37.9°C이다. 오한은 경미하게 춥다고 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮으려고 한다.

콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하게 되며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 간헐적으로 발생한다. 재채기는 지속적으로 나타난다. 요통은 통증 강도 1/10이다. 소화불량으로 인한 복만/복통은 1/5 정도이다. 증상은 점차 악화되는 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 고강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 소화는 보통이며, 오심/구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간, 얇은 잠을 자며 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 있다(True/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통으로 야간에 땀을 흘리며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/74 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:40:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 69kg
- 활력징후: BP 102/69 mmHg, 맥박 61/분, 체온 38.9°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 환경에 노출된 후 오한, 발열, 콧물, 기침, 몸살 기운, 소화불량, 요통 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 69kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운, 소화불량, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 8시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 금일(金湊) 에어컨이 강하게 작동하는 환경에 노출된 후 오한, 발열, 콧물, 기침 등의 증상이 발생하였다. 오한이 뚜렷하게 느껴져 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 하며, 몸살 기운이 동반된다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할

정도로 심하고, 계속 흘러내려 휴지를 달고 살아야 한다. 코를 풀어도 금방 다시 차며, 기침도 빈번하게 한다. 소화불량으로 복만감과 복통을 호소하며, 요통(통증강도 4/10)도 동반된다. 완화 요인으로는 식이 조절과 따뜻하게 하는 것이 있다.

【과거력】

특이사항 없음

【가족력】

고혈압

【사회력】

음주(주간), 흡연(5개피/일), 운동(중)

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수 2회/일, 불규칙, 복만/복통 4/5
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 얕음, 기상 시 피곤함, 입면장애 5/5, 중도각성 0/5
- 한열: 열감/더위탐, 수족냉증 있음, 음료 온도 선호는 온수
- 땀: 다한, 전신, 땀 흘린 후 상쾌
- 통증: 요통(4/10)
- 정신/정서: 기억력 감퇴, 의욕 보통, 스트레스 대처력 좋음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/69 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 38.9℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 피부 건조
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 정상
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 70세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 82kg
- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 69/분, 체온 38.2°C

■ 요약

70세 남성 환자로 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원. 기저질환으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 82kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다. 소변에서 혈뇨가 관찰된다고 한다.

【발병 에피소드】

6일간 계속된 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현되었다고 한다.

【현병력】

2-3일 전부터 발열(38.2°C)과 오한을 호소하며, 콧물과 기침이 동반되었다. 기침은 발작적인 양상을 보인다. 소변에서 혈뇨가 관찰된다고 한다. 스트레칭 시 증상 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 특별한 소화 불량 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회 소변을 보며, 혈뇨를 호소한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망 증세가 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 38.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 피부는 건조한 편이다. 사지 무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 삽맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 59kg
- 활력징후: BP 101/68 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.7°C

■ 요약

17세 남성 환자로 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원함. 요통과 소화불량 증상도 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 176cm, 체중은 59kg, BMI는 19.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 6시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열(37.7°C), 오한, 콧물, 기침 증상이 발현되었다고 한다. 발열로 인한 피로감과 불편감을 호소하며, 경미한 오한과 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 빈번하게 나타난다. 호전되는 경과를 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만/복통(4/5)을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감을 느낌. 입면장애(2/5), 중도각성(True/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통, 전신 발한.
- 통증: 요통 (4/10), 통증 양상은 특별히 호소하지 않음.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/68 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 이명(2/5), 난청(2/5), 어지러움(2/5)을 호소한다.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 66kg
- 활력징후: BP 120/73 mmHg, 맥박 62/분, 체온 38.2°C

■ 요약

40세 여성 환자로, 2-3일 전부터 감기 및 비염 증상, 요통, 소화불량을 호소한다. 영하 9도의 추운 날씨에 장시간 노출 후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 66kg, BMI는 24.5이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기/급성상기도감염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 9도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 43분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전, 영하의 날씨에 장시간 버스 정류장에서 대기한 이후 오한, 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상을 호소한다. 몸살 기운이 동반되며, 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이다. 기침은 발작적인 형태로 나타난다. 비염

증상으로 어쩌다 한두 번 재채기를 한다고 한다. 요통은 강도 1/10으로 경미하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 1/5 정도로 느낀다고 한다. 악화 요인으로는 수면 부족과 흡연이 있으며, 따뜻하게 하거나 안정을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일이나 불규칙하며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (강도 1/10)
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으며, 기억력과 의욕은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/73 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 38.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다고 한다. 부종은 없다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 61kg
- 활력징후: BP 100/75 mmHg, 맥박 98/분, 체온 39.0°C

■ 요약

16세 남성 환자로, 1일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 몸살 기운과 함께 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 61kg, BMI는 23.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 시작된 발열(39.0°C)과 오한을 호소한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이며, 기침을 자주 한다고 한다. 몸살 기운이 경미하게 동반되어 나타난다. 안정 시 증상이 완화되는 경향을 보이며, 과로 및 흡연 시 증상이 악화된다고 한다. 현재 호전 중이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0.0개피/일 정도이며, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 특별한 소화기 증상은 호소하지 않는다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 땀을 흘리는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/75 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 39.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경우가 있다. 피부는 건조하며 가려움증은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 황색의 후태(厚苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 72세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 74kg
- 활력징후: BP 151/90 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.8°C

■ 요약

72세 여성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 74kg, BMI는 26.5이다.

【주소증】

발현 시점 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 전 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 4시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 惡寒과 發熱이 발생하였으며, 이후 콧물과 기침이 동반되었다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보이며, 기침은 발작적으로 나타난다. 증상은 호전과 악화를 반복하는 경향을 보인다. 음주 후 증상이 악화되는 경향이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 12시간으로 길지만, 수면의 질은 얕으며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋으나 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 151/90 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신에 부종은 없으나, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 1/5로 경미하다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 46kg
- 활력징후: BP 127/88 mmHg, 맥박 94/분, 체온 38.3°C

■ 요약

14세 여성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 콧물, 기침, 몸살 기운을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 154cm, 체중은 46kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 6시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열이 시작되었으며, 뚜렷한 열감을 호소한다. 발열은 시간이 지남에 따라 악화되는 경향을 보이며, 오한과 경미한 몸살 기운을 동반한다. 콧물은 중등도이며 계속 흘러 불편감을 호소하고, 기침은 빈번하게 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 학생으로, 주로 앉아서 생활하며 과로하는 경향이 있다. 음주는 하지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 하루 3회 섭취한다. 특별한 소화불량 증상은 없으나 복만감과 복통이 2/5 정도로 느껴진다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 1/5 정도이며, 중도각성이 잦다(True/5).
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 전신에서 땀을 흘린다. 땀을 흘린 후 열감이 느껴진다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10 정도이다. 특별한 통증 양상은 없다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다고 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/88 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 38.3°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 설태의 두께는 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:41:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 143cm / 33kg
- 활력징후: BP 149/96 mmHg, 맥박 90/분, 체온 39.3°C

■ 요약

10세 남환, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 33kg, BMI는 16.1이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 7일 후 본인도 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환아는 1일 전부터 발열(39.3°C)을 주소로 내원하였다. 환자는 발열과 함께 전신 근육통 및 두통을 호소하며, 활동 시 피로감을 느껴 눕기를 원했다. 오한 증상으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 하루 종일 지속적으로 발생한다. 비염 증상으로 재채기를 간헐적으로 하며, 코막힘이나 코 가려움은 호소하지

않는다. 요통은 통증 강도 1/10로 경미하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 1/5 정도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취, 소화불량으로 복만/복통 호소 (1/5)
- 대변: 변비, 황갈색, 굳은 변
- 소변: 혈뇨, 주간 6회, 야간뇨 없음
- 수면: 7시간, 수면의 질 저하, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5, 기상 시 피로감 호소
- 한열: 열감/더위탐, 온수 선호, 수족냉증 있음
- 땀: 보통 정도 발한, 주로 두부에 땀이 나며, 발한 후 상쾌함을 느낌
- 통증: 요통 (강도 1/10)
- 정신/정서: 기억력 저하, 스트레스 대처 능력 저하, 의욕은 높은 편

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/96 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 39.3°C, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 전신 부종 관찰, 멍이 잘 드는 체질, 사지 무력감은 없음, 피부 건조하며 각질 관찰, 가려움은 호소하지 않음, 이명 강도 4/5, 난청 4/5, 어지러움 5/5
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 46kg
- 활력징후: BP 146/95 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.6°C

■ 요약

69세 남성 환자로 2-3일 전 수영 후 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 46kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

발열은 뚜렷한 열감이 느껴지며, 피로감이 동반된다. 오한이 뚜렷하며, 몸살 기운이 동반될 수 있다. 콧물은 경미하게 흐른다. 기침을 자주 한다. 비염 증상으로 재채기를 어쩌다 한두 번 한다. 요통 강도는 4/10이다. 소화불량 증상으로 복만/복통을 4/5로 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일, 운동강도는 저이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만, 복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간, 얕으며, 기상 시 무겁다고 호소한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통이며, 두부에 땀이 난다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력하며, 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/95 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.6°C, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥, 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 40세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 67kg
- 활력징후: BP 147/94 mmHg, 맥박 94/분, 체온 38.1°C

■ 요약

40세 남성 환자로, 1일 전 에어컨이 강한 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 근육통, 두통, 콧물, 잦은 기침을 호소하며 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 67kg, BMI는 21.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 전신 근육통, 두통, 경미한 콧물, 잦은 기침을 주소로 내원하였다. 비염 증상으로 재채기가 발작적으로 나타나며, 요통과 복만/복통을 동반한다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 7시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 에어컨이 강한 사무실에서 장시간 근무 후 오한이 발생하였으며, 이후 발열, 전신 근육통, 두통이

동반되었다. 기침은 잦은 빈도로 나타나며 콧물은 경미하다. 환자는 몸이 뜨겁다고 느끼며, 활동이 힘들어 눕고 싶어한다. 휴식과 식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 평소 만성적인 재채기 증상을 동반한 비염 증상이 있으며, 요통과 소화불량 증상도 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만과 복통을 호소한다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 굳기이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한 경향이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다. 야간 발한은 없다.
- 통증: 요통이 있으며 강도는 4/10이다. 복만/복통은 4/5 강도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/94 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 38.1°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 각질이 있고 건조하나 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 50kg
- 활력징후: BP 116/64 mmHg, 맥박 91/분, 체온 38.3°C

■ 요약

30세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 흑색변, 혈뇨 등의 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 50kg, BMI는 14.8이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 흑색변, 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 14도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 60분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전, 추운 날씨에 장시간 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발현되었다고 한다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보이며, 기침 또한 빈번하게 발생하고 있다. 또한 흑색변 및 혈뇨 증상을 호소한다.

【과거력】

당뇨 및 이상지질혈증으로 진단받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 및 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통 (3/5)을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리나, 야간에 도한이 있으며 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/64 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 38.3°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종 및 절로 멍이 드는 증상이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 147cm / 55kg
- 활력징후: BP 146/93 mmHg, 맥박 63/분, 체온 38.9°C

■ 요약

13세 남자 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 55kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다. 비염 증상(재채기), 요통 증상, 소화불량 증상도 호소하였다.

【발병 에피소드】

영하 10도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 30분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

1일 전, 영하 10도의 추운 날씨에 장시간 노출된 후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발현되었다. 환자는 몸이 뜨겁다고 느끼며, 전신 근육통과 두통을 동반하고 활동하기 힘들어 누워있고 싶어한다. 발열은 38.9°C까지 상승했으며,

뚜렷한 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오며, 기침을 자주 한다. 간헐적으로 재채기를 하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 경미하며, 복만 및 복통 증상도 간헐적으로 나타난다. 완화 요인으로는 스트레칭과 온찜질을 언급했다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 특별한 소화 불량은 호소하지 않는다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애 및 중도 각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 경미한 요통과 복통을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/93 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 38.9℃, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 피부는 각질이 있고 건조하나, 가려움은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 34세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 64kg
- 활력징후: BP 127/85 mmHg, 맥박 91/분, 체온 39.0°C

■ 요약

34세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 기침, 콧물, 몸살, 잦은 재채기, 혈뇨 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 34세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 64kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 재채기, 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 8시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 오한이 발생하였고, 이후 발열, 기침, 콧물, 재채기, 혈뇨 증상이 나타났다. 발열 시 몸이 불덩이처럼 뜨겁게 느껴지며 어지러움과 혼미함이 동반되어 일상생활이

어려운 상태이다. 오한은 경미하게 느껴지며 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려 한다. 가벼운 몸살 기운이 있으며, 콧물은 경미하게 흐르고 기침은 발작적인 양상이다. 재채기를 자주 하며 혈뇨 증상을 보인다. 증상은 현재 호전 중이다. 습한 환경에서 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 중 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙적이다. 소화 상태는 보통이며 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 7시간, 수면의 질은 양으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 음료는 온수를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/85 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 39.0℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 부종은 없으며 명은 정상이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 61kg
- 활력징후: BP 111/78 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.2°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원함. 변비, 혈뇨, 얇은 수면, 전신 부종, 사지 무력감, 이명, 난청, 요통, 소화불량 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 181cm, 체중은 61kg, BMI는 18.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 수영 후 발열(發熱), 콧물, 기침이 발생하였다. 발열은 몸이 불덩이처럼 뜨겁게 느껴지며, 어지러움과 혼미함이 동반되어 일상생활에 지장을 준다고 한다. 오한(惡寒)은 경미하게 느껴지며 옷을 꺼입거나 이불을

뒹으려고 한다. 몸살 기운이 약간 있으며, 콧물은 심하게 계속 흘러 멈추지 않아 휴지를 자주 사용해야 한다고 호소한다. 기침은 발작적으로 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만 및 복통(4/5)을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5회.
- 한열: 열감(熱感)을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/78 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고 사지 무력감을 호소한다. 피부는 각질이 있으며 건조하다. 이명 강도는 2/5, 난청 3/5. 어지러움 1/5.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 홍맥(洪脈)
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥(滑脈)

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 28세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 58kg
- 활력징후: BP 118/61 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.6°C

■ 요약

28세 남성, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 58kg, BMI는 17.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 12도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 53분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전, 추위에 장시간 노출된 이후 발열(38.6°C)과 오한을 주 증상으로 호소하였다. 발열 증상은 간헐적으로 나타나며, 오한은 뚜렷하게 추위를 느끼고 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도로 심하다. 몸살 기운이 동반되고, 콧물은 지속적으로 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 양상이다. 기침은 하루 종일 지속적으로

나타난다. 비염 증상으로 간헐적인 재채기가 있으며, 요통은 미미한 수준(통증강도 1/10)이고, 소화불량으로 인한 복만/복통이 경미하게(1/5) 나타난다. 습한 환경과 음주 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳음/경변의 양상이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 10시간으로 긴 편이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 오한/추위를 심하게 타며, 냉수를 선호하지 않는다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/61 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.6°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:42:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 48세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 55kg
- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 76/분, 체온 38.4°C

■ 요약

48세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 몸살 기운을 호소하며 내원하였다. 평소 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며 과로와 흡연, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 55kg, BMI는 17.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 몸살 기운과 함께 발열, 오한이 시작되었다고 한다. 발열은 38.4°C까지 오르며, 오한은 경미하게 느껴진다. 콧물과 기침은 간헐적으로 나타나며, 재채기를 자주 한다. 요통은 통증

강도 2/10 정도이며, 소화불량으로 복만감과 복통이 느껴진다. 안정 시 완화되고 과로, 흡연, 기름진 음식 섭취 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만감과 복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에서 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 38.4℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기가 크고 태가 있다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 66세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 69kg
- 활력징후: BP 157/95 mmHg, 맥박 63/분, 체온 38.2°C

■ 요약

66세 여성 환자로 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 어지러움, 잦은 기침을 호소한다. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 69kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 어지러움을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 4시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열이 뚜렷하며, 약 38.2°C까지 상승하였다. 오한을 호소하며, 가벼운 몸살 기운을 동반한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침과 재채기를 자주 한다. 스트레칭 시 증상이 완화되나, 과로 시 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 하지 않으며, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 특이 소화불량 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/95 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 38.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 두껍게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 68kg
- 활력징후: BP 108/66 mmHg, 맥박 98/분, 체온 39.0°C

■ 요약

69세 여성 환자로, 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 68kg, BMI는 27.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 몸살 기운이 시작되어 발열(39.0°C), 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 나타났다고 한다. 발열은 몸이 불덩이처럼 뜨겁게 느껴지며, 어지러움과 혼미함을 동반하여 일상생활이 불가능한

상태이다. 오한은 매우 심하여 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼며 이가 부딪히는 증상이 있다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 간헐적으로 발생한다. 비염 증상으로는 재채기가 어쩌다 한두 번 나타난다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5 정도로 호소한다. 환자는 찬바람/냉기에 증상이 악화되고, 수면 및 식이조절 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하고, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 수면시간은 5시간으로 깊게 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 심하게 느끼며, 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 정도의 강도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나빠지며, 건망 증세가 있고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/66 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 39.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 황태이고, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥, 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 100kg
- 활력징후: BP 108/62 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.6°C

■ 요약

57세 여성 환자로, 1일 전 수영 후 발생한 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 100kg, BMI는 37.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였으며, 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 머리를 말리지 않은 후 발생한 콧물, 기침, 발열, 오한을 호소한다. 발열은 37.6°C까지 상승했으며, 오한과 함께 몸살 기운이 느껴진다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흘러 불편감을 느끼며, 발작적인 기침이 동반된다. 증상은 휴식과 안정을 취하면 다소 완화되나, 기름진 음식을 섭취하면 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피, 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 12회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/62 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 사지 무력감은 없다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 보통이다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:29

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 25세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 54kg
- 활력징후: BP 115/77 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.9°C

■ 요약

25세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강한 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 심한 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 25세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 54kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 6시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강한 사무실에서 장시간 근무 후 오한이 발생하였고, 이후 발열, 심한 콧물, 기침이 동반되었다. 발열은 37.9°C까지 상승했으며, 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지로 감당하기 어려울 정도이다. 기침은 발작적으로 나타난다. 현재 증상은 호전 중이다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하고 있다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 식욕은 보통이다. 특별한 소화불량 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 부족하지 않으나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 잘 느끼고 더위를 타는 편이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리나, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 없는 상태이다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/77 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전반적으로 피로감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 느끼고 있다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 56kg
- 활력징후: BP 131/88 mmHg, 맥박 98/분, 체온 38.4°C

■ 요약

26세 남성 환자로 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 56kg, BMI는 19.8이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간의 과로와 수면 부족으로 인해 면역력이 저하된 후 상기 증상들이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열(38.4°C)과 오한을 호소하며, 콧물과 기침, 재채기 증상이 동반되었다. 요통은 통증 강도 3/10 정도로 나타나며, 복만감과 복통을 동반한 소화불량 증상 또한 호소한다. 환자는 과로, 찬바람, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다고 진술하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압과 당뇨병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 본다.
- 소변: 횟수는 주간 2회, 야간 0회이며, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망 증세를 보이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/88 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 38.4°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이며, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 정상 크기이다.
- 설태: 황색의 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 67kg
- 활력징후: BP 165/100 mmHg, 맥박 97/분, 체온 38.5°C

■ 요약

50세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열, 기침, 콧물, 요통 및 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 67kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열, 오한 등의 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열, 기침, 콧물, 요통 및 소화불량 증상이 나타났다. 오한이 뚜렷하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며 몸살 기운이 동반될 수 있다고 호소한다. 콧물은 경미하게 흐른다. 기침은 빈번하게 발생한다. 재채기는 발작 수준으로 만성적이다. 코막힘 및 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다.

소화불량 증상으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 35개피/일, 운동강도는 중강도로 시행한다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 배출한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 165/100 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 38.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:43:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 79세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 68kg
- 활력징후: BP 129/81 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.0°C

■ 요약

79세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 68kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간 야근이 계속된 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열(38.0°C)과 오한을 호소하며, 콧물과 기침이 동반되었다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상이며, 기침은 발작적으로 나타난다. 비염 증상으로 재채기를 지속적으로 한다고 한다. 요통은 강도 1/10으로 경미하며, 소화불량으로 복만감 및 복통을 1/5 정도로 느낀다고 한다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 안정을 취하거나 따뜻하게

하면 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 본다고 한다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 않으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 한다. 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/81 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다고 한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 69kg
- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.9°C

■ 요약

43세 여성 환자로, 2-3일 전 추운 날씨에 장시간 노출 후 발열, 오한, 콧물, 잦은 기침, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 69kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 9도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 55분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 추운 환경에 노출된 후 오한, 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 재채기 등의 비염 증상이 발생하였다고 한다. 또한, 경미한 요통과 복만감, 복통 등의 소화불량 증상도 호소한다. 환자는 발열로 인해 피로감과

불편감을 느끼며, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 기침은 빈번하게 나타나며, 콧물은 경미하게 흐른다고 한다. 요통은 강도 2/10으로 미미하며, 복만감과 복통은 2/5 정도로 나타난다. 장시간 앉아있거나 흡연, 습한 환경에 노출될 경우 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 스트레칭을 할 경우 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이다. 복만/복통 2/5, 증상은 상세 불명.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변.
- 소변: 맑음, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피곤함. 입면장애 0/5, 중도각성 True/5.
- 한열: 오한/추위탐, 냉수 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통, 야간/도한, 땀 흘린 후 피곤/냉함.
- 통증: 요통 강도 2/10, 통증 양상은 상세 불명.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처력이 나쁘다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.9℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 84kg
- 활력징후: BP 117/64 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.7°C

■ 요약

65세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 84kg, BMI는 33.2이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소한다. 발열은 37.4°C에서 37.9°C 사이로 측정되며, 뚜렷한 열감을 느낀다고 한다. 오한이 심하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 몸살 기운이 동반된다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이며, 기침은 하루 종일 지속적으로 발생한다. 비염 증상으로 재채기를 호소하나 코막힘이나 코 가려움은 없다.

요통은 경미하며 통증 강도는 2/10 정도이다. 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소하며 소화불량 증상 또한 동반된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중강도로 꾸준히 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 녹색이며 굳고 딱딱하다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 낮으며, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 좋지 않고 의욕이 없는 상태이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/64 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 부종은 없으며 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 150cm / 40kg
- 활력징후: BP 157/90 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.8°C

■ 요약

12세 남학생, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 몸살 기운을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남 환자로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 40kg, BMI는 17.8이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상 (재채기)을 주소로 내원하였다. 소화불량 및 요통 또한 호소하였다.

【발병 에피소드】

7일간 계속된 야근 후 피로 누적으로 감기 증상 발현.

【현병력】

발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기 증상이 1일 전부터 시작되어 점차 악화되는 양상이다. 환자는 발열로 인한 피로감과 불편함을 호소하며, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮는 등 보온을 유지하려 한다. 몸살 기운이 동반될 수 있다고

언급하였다. 재채기는 만성적으로 나타나며, 발작 수준으로 심하다. 찬바람에 노출되거나 수면이 부족할 경우 증상이 악화되며, 온찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

당뇨.

【사회력】

비음주, 비흡연, 고강도 운동을 규칙적으로 시행.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감 및 복통 (2/5)을 호소함. 특별한 오심이나 구토 증상은 없음.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 봄.
- 소변: 혈뇨가 관찰되며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 봄.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낌. 입면장애는 없으나, 중도각성이 5회 중 true로 나타남.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없음.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간에 도한이 나타남. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낌.
- 통증: 요통 강도는 2/10으로 경미함. 특별한 통증 양상은 없음.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나, 의욕은 보통 수준임.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/90 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.8℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 드는 경향이 있음. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소함.
- 면색: 황색.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔과 크기.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 니태를 보임.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 52kg
- 활력징후: BP 128/82 mmHg, 맥박 105/분, 체온 38.1°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원하였다. 평소 과로와 수면 부족이 잦고, 당뇨 및 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 52kg, BMI는 17.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간 지속된 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열을 호소하며, 38.1°C의 체온을 보였다.惡寒을 동반하며, 전신 근육통과 두통을 호소한다. 콧물은 중등도로 지속적으로 흐르며, 간헐적인 기침이 나타난다. 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상이다. 식이 조절과 온찜질

시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

당뇨 및 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 중강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 특별한 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 寒熱 경향은 보통이나, 현재 惡寒을 호소한다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 발한은 보통이며, 주로 두부에 땀이 나고, 발한 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 128/82 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 38.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 관찰되지 않는다. 피부는 건조하며 가려움이 있다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 絳紅舌, 정상 크기이다.
- 설태: 白苔, 厚苔이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 浮脈

- 맥폭(대세): 洪脈
- 맥력: 有力
- 맥상: 滑脈

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 71세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 85kg
- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 88/분, 체온 38.2°C

■ 요약

71세 남성 환자로, 2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 71세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 181cm, 체중은 85kg, BMI는 25.9이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 8시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 에어컨이 강한 환경에 노출된 후 오한을 느꼈으며, 이후 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 나타났다. 현재 증상은 호전 중이다. 재채기 증상도 간헐적으로 나타나고 있다. 요통은 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 간헐적으로 느껴진다고 한다. 악화 요인으로는 수면 부족과 장시간 앉기가 있으며, 온찜질 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로는 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량이 있다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회 정도이며, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/84 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 38.2°C, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 부종은 없고, 피부는 정상 건조도를 보이며 가려움이 있다. 어지러움을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 185cm / 85kg
- 활력징후: BP 138/88 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.9°C

■ 요약

21세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 185cm, 체중은 85kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 발열(약 37.9°C), 오한, 전신 근육통, 두통, 콧물, 기침 등의 증상이 발현되었다고 한다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 습한 환경에서 악화되고 안정 및 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주하며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 항색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감과 더위를 타는 경향이 있으며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 두부에 흘리며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/88 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.9°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으나 가려움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 83kg
- 활력징후: BP 100/68 mmHg, 맥박 59/분, 체온 38.0°C

■ 요약

41세 남성, 2-3일 전부터 발열, 오한, 몸살 기운, 경미한 콧물, 가끔 기침, 재채기 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 83kg, BMI는 34.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 몸살 기운, 경미한 콧물, 가끔 기침, 빈번한 재채기를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 6일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전부터 발열, 오한, 몸살 기운을 호소하였다. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 뚜렷한 열감이 느껴지며, 이로 인해 피로감과 불편감이 동반된다고 한다. 오한은 심하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 몸살 기운이 동반된다. 콧물은 경미하게 흐르며, 휴지가 거의 필요 없거나 가끔 한두 번 닦아내는 정도이다. 기침은

간헐적으로 발생한다. 비염 증상으로 재채기를 빈번하게 한다. 코막힘이나 코 가려움은 없다. 증상은 호전 중이다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면, 질은 얇으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 나쁘며, 기억력은 좋으나 의욕은 무기력하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/68 mmHg, 맥박 59회/분, 체온 38.0°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 절로 생긴다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 가렵다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대/태이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:44:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 79세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 51kg
- 활력징후: BP 126/89 mmHg, 맥박 80/분, 체온 39.1°C

■ 요약

79세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 51kg, BMI는 19.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고, 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 수영 후 발열(39.1°C)이 발생하였으며, 이로 인한 전신 근육통 및 두통을 호소한다. 오한을 경미하게 느끼며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침을 자주 한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림을 반복한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 특이한 통증 양상은 없다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/89 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 39.1°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하나 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 4/5로 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:45:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 134cm / 33kg
- 활력징후: BP 108/68 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.1°C

■ 요약

10세 남환, 1일 전부터 발열, 오한, 전신 근육통, 두통 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남 환자로 학생이다. 신장은 134cm, 체중은 33kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 전신 근육통, 두통, 오한, 경미한 콧물, 잦은 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중, 6일 후 본인도 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열(약 38.1°C)을 호소하며, 이로 인한 전신 근육통과 두통을 동반한다. 활동이 힘들어 눕고 싶어 하며, 뚜렷한 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다고 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 휴지를 거의 사용하지 않는다. 기침을 자주 하는 편이다. 증상은 호전 중이다. 악화 요인으로서는 기름진 음식 섭취, 장시간 앉아 있는 습관, 습한

환경 등이 있으며, 식이 조절과 따뜻하게 하는 것으로 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만 및 복통이 1/5 정도 발생한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나빠지며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/68 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.1°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 사지 무력감은 없으며, 피부 건조도가 높다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황색, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 中脈

- 맥폭(대세): 細脈
- 맥력: 無力
- 맥상: 緩脈
- 복합맥상: 細弱

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:45:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 194cm / 62kg
- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 82/분, 체온 39.4°C

■ 요약

42세 남성, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 콧물, 기침, 몸살 기운을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 194cm, 체중은 62kg, BMI는 16.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 금일 새벽부터 발열(39.4°C)이 시작되었으며, 오한을 경미하게 호소한다. 몸살 기운이 있으며 콧물이 계속 흐르고 기침을 자주 한다고 한다. 재채기를 매일 지속적으로 한다고 호소한다. 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만/복통을 4/5 정도로 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 불규칙하게 하며, 특히 소화기 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얹고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 땀이 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 4/10
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 39.4°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:45:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 27세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 81kg
- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 110/분, 체온 38.3°C

■ 요약

27세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 몸살, 콧물, 재채기, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 81kg, BMI는 32.9이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 몸살, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 5도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 60분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 영하의 날씨에 장시간 노출된 후 발열, 오한, 몸살, 경미한 콧물, 간헐적인 기침, 빈번한 재채기 증상을 호소하였다. 요통은 3/10 강도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 3/5 강도로 호소한다. 환자는 현재 호전 중이라고 진술하였다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도 강도로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회, 밤에는 보지 않으며, 황색뇨를 본다.
- 수면: 5시간 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 3/10 강도로 나타난다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘고 무기력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/66 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 38.3°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 멍이 절로 생긴다고 한다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 부종은 관찰되지 않는다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황태와 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:45:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 32세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 61kg
- 활력징후: BP 115/63 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.8°C

■ 요약

32세 남성 환자로, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 61kg, BMI는 20.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 8시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 이후 콧물과 기침이 발생하였다. 발열은 37.8°C까지 상승하였고, 뚜렷한 열감이 느껴진다고 호소한다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이며, 몸살 기운이 동반될 수 있다고 한다. 콧물은 중등도 수준으로 계속 흘러 불편감을 느끼고 있으며, 기침은 하루 종일

지속적으로 발생한다고 한다. 악화요인으로서는 과로, 기름진 음식 섭취, 음주가 있으며, 완화요인은 특별히 없는 것으로 보인다.

【과거력】

당뇨를 앓고 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 식욕은 보통이다. 소화 상태는 양호하며, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳음/경변의 양상이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 1회 빈뇨 증상을 보인다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 특별한 통증 양상은 없다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 건망 증세가 있으며 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/63 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.8°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 없으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움증은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황태와 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:45:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 33세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 66kg
- 활력징후: BP 114/78 mmHg, 맥박 95/분, 체온 38.4°C

■ 요약

33세 남성, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 전신 근육통, 두통 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 33세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 66kg, BMI는 22.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 전신 근육통, 두통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 2시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

1일 전, 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한이 발생하며 시작되었다. 이후 발열, 콧물, 전신 근육통, 두통이 동반되었다. 찬바람/냉기에 증상이 악화되고 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다. 발열은 38.4°C까지 상승했으며, 증상의 호전과 악화가 반복되는 양상이다. 콧물의 양이 매우 많아 일상생활에 불편함을 느끼고 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 거의 하지 않는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회 정도, 밤에는 보지 않으며, 황색뇨를 띤다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로, 전신에 땀을 흘리며 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/78 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 38.4°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 무력감을 호소하며, 부종은 관찰되지 않는다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 부건실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:45:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 140cm / 45kg
- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 65/분, 체온 37.7°C

■ 요약

12세 남환, 1일 전 수영 후 발열, 콧물, 기침, 재채기 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 140cm, 체중은 45kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 콧물, 기침, 재채기를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고, 다음 날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 머리를 말리지 않은 채 외출한 이후, 발열(약 37.7°C)과 오한을 호소하였다. 발열로 인한 피로감을 느끼며, 춥다고 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮는 등의 보온을 취하고 있다. 또한, 경미한 콧물과 빈번한 기침, 지속적인 재채기 증상을 보인다. 안정 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 약물력은 확인되지 않았다.

【가족력】

특이 가족력은 확인되지 않았다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 특이 소화불량 증세는 없으나, 복만/복통이 1/5 정도로 경미하게 나타난다.
- 대변: 1회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 주간 2회, 야간 1회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 부족하지 않으나, 잠이 얇고 기상 시 피곤함을 호소한다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 37.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 쉽게 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명은 없으며, 난청은 2/5 정도이다. 어지럼증은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:45:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 78kg
- 활력징후: BP 109/65 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.7°C

■ 요약

63세 남성 환자로 2-3일 전부터 발생한 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 증상 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 78kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 3일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 오한, 콧물, 기침 증상이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 오한이 뚜렷하며, 콧물은 경미하게 흐르고, 기침을 자주 한다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 진단받고 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 형태를 보인다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀을 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/65 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움을 4/5 정도 호소한다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황색의 니태를 띄고 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:45:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 195cm / 92kg
- 활력징후: BP 107/68 mmHg, 맥박 104/분, 체온 38.3°C

■ 요약

54세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 전신 근육통, 두통, 콧물, 재채기, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 195cm, 체중은 92kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 전신 근육통, 두통, 콧물, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

한절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 전신 근육통 및 두통을 동반하였다. 콧물과 재채기 증상 또한 나타났다. 따뜻하게 하면 증상이 완화되는 경향을 보였다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨와 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 복만감과 복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한을 보이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/68 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 38.3°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 39세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 72kg
- 활력징후: BP 156/99 mmHg, 맥박 117/분, 체온 37.9°C

■ 요약

39세 여성 환자로 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 39세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 72kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 4일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 감기 증상으로 발열(37.9°C), 뚜렷한 오한, 몸살 기운, 심한 콧물, 빈번한 기침을 호소하였다. 비염 증상으로는 지속적인 재채기를 호소하였으며, 코막힘이나 코 가려움은 없다고 한다. 또한, 요통(4/10)과 복만/복통(4/5)을 동반한 소화불량을 호소하였다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 1회/일로 규칙적이나 소화불량을 호소하며, 복만/복통이 있다.
- 대변: 변비, 녹색변, 보통 정도의 양상을 보인다.
- 소변: 맑은 색이며 주간 6회, 야간 3회 정도이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 오한을 느끼고 냉수를 선호하며 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이나, 야간에 도한이 있으며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처력은 좋으나 건망을 호소하며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 156/99 mmHg, 맥박 117회/분, 체온 37.9°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 잘 든다고 한다. 피부는 각질이 있고 건조하나 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 58kg
- 활력징후: BP 104/61 mmHg, 맥박 61/분, 체온 39.5°C

■ 요약

63세 여성 환자로, 2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상 (재채기)을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 58kg, BMI는 21.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 및 비염 증상, 그리고 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 11도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 41분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전, 嚴冬에 장시간 버스 정류장에서 대기한 이후 감기 증상이 발현되었다. 주소증은 發熱, 惡寒, 콧물, 기침, 재채기 등이다. 發熱로 인해 전신 근육통 및 두통을 동반하며, 활동 시 피로감을 쉽게 느껴 눕고 싶어 한다. 콧물은 중등도로 지속적으로 흐르며, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 재채기는 발작적으로 나타난다. 악화 요인으로는

濕環境, 過勞, 冷氣에 노출되는 것이 있으며, 완화 요인은 특별히 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 高이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 평소 寒熱 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 없고 무기력하다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/61 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 39.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌大/苔
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 65kg
- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 92/분, 체온 38.1°C

■ 요약

68세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 어지러움을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 65kg, BMI는 25.7이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 어지러움을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

6일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열이 시작되었으며, 증상은 오르내림을 반복한다. 발열은 몸이 불덩이처럼 뜨겁게 느껴지는 양상이며, 어지러움과 혼미함을 동반하여 일상생활이 불가능한 상태이다. 오한이 뚜렷하게 나타나 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 몸살 기운이 있으며, 중등도의 콧물과 간헐적인 기침이 동반된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 식욕은 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 38.1°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 中脈
- 맥폭(대세): 大脈

- 맥력: 無力

- 맥상: 緩脈

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 94kg
- 활력징후: BP 121/88 mmHg, 맥박 107/분, 체온 38.4°C

■ 요약

52세 여성, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 경미한 콧물 및 기침, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 94kg, BMI는 39.6이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 2-3일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 약 4시간 동안 야외에 있었던 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 발열(38.4°C)과 오한을 호소하였다. 발열로 인한 피로감과 불편감이 동반되었으며, 경미한 콧물과 간헐적인 기침이 나타났다. 요통은 강도 1/10로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 1/5 정도로 나타났다. 온찜질과 따뜻하게 하는 것으로 증상이 완화되며, 장시간 앉아있는 경우 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다. 여성력 상, 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재는 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 경미하게 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이나, 주로 두부에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/88 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 38.4°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조한 편이다. 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 설 크기는 작다.
- 설태: 백태, 후태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:40

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 41세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 54kg
- 활력징후: BP 113/62 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.8°C

■ 요약

41세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 54kg, BMI는 20.1이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 7시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 발열(약 37.4°C ~ 37.9°C)과 함께 뚜렷한 오한을 호소하며, 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오며, 발작적인 기침이 있다. 비염 증상으로는 재채기가 빈번하게 나타난다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 열감/더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에서 나타나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 강도이다.
- 정신/정서: 기억력은 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/62 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청 3/5, 어지러움 2/5.
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대/태
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 완맥, 침실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 77kg
- 활력징후: BP 129/80 mmHg, 맥박 112/분, 체온 37.8°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침, 잦은 재채기, 2/10 강도의 요통, 2/5 복만/복통을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 77kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 복만/복통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 2일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 경미한 콧물, 간헐적인 기침, 잦은 재채기 증상을 호소하였다. 발열은 37.8°C까지 상승하였으며, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 요통은 강도 2/10으로 나타났으며,

복만/복통은 2/5 정도로 불편함을 호소한다. 안정 및 식이조절 시 증상 완화가 있는 것으로 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 중풍 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 (2/5) 있음.
- 대변: 하루 2-3회 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀을 흘리며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 129/80 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 37.8℃, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 부종은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:46:56

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 69kg
- 활력징후: BP 109/76 mmHg, 맥박 69/분, 체온 38.8°C

■ 요약

55세 여성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 콧물, 기침 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 69kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 몸살, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 5시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 장시간 근무 후 오한이 시작되었으며, 이후 발열, 전신 근육통, 두통, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 등의 증상이 나타났다. 환자는 발열로 인해 몸이 뜨겁다고 느끼며, 이로 인한 전신 근육통과 두통을 호소한다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 콧물은 중등도이며 계속

흘러내린다. 기침은 빈번하게 발생한다. 재채기는 간헐적으로 나타난다. 요통은 경미하다. 소화불량으로 인해 복만감과 복통을 호소한다. 증상은 휴식과 따뜻하게 함으로 완화되고, 찬바람/냉기, 습한 환경, 스트레스에 의해 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 5개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일, 불규칙하며, 소화 상태는 보통이다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 12시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 열감/더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀을 흘린다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮으며, 기억력이 나쁘고 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/76 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 38.8℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 82세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 74kg
- 활력징후: BP 120/84 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.5°C

■ 요약

82세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다. 추운 날씨에 장시간 노출 후 감기 증상과 함께 기존 이상지질혈증, 당뇨가 있는 환자이다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 74kg, BMI는 29.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 9도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 46분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전, 추운 날씨에 장시간 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침 증상이 발현되었다고 한다. 발열은 37.5°C까지 상승하며 뚜렷한 열감을 호소하고, 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도라고 한다. 콧물은 계속

흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 빈번한 기침을 동반한다. 비염 증상으로 재채기를 지속적으로 하지만 코막힘이나 코가려움은 없다. 요통은 경미하며(2/10), 소화불량으로 인한 복만/복통(2/5)을 호소한다. 과로, 흡연, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 당뇨 및 심장병력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(True/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/84 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 54kg
- 활력징후: BP 142/95 mmHg, 맥박 108/분, 체온 38.7°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 54kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

감기에 걸린 가족을 간호하던 중 본인도 3일 후 비슷한 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 증상을 보였다. 발열은 정상 체온을 유지하고 있으며, 오한은 심하여 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고 있으며, 기침은 빈번하게 발생한다. 증상은 휴식 시 완화되고 과로 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화 불량 증상으로 복만/복통(1/5)이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/95 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 38.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크다.
- 설태: 백태, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 74kg
- 활력징후: BP 154/92 mmHg, 맥박 75/분, 체온 38.2°C

■ 요약

60세 여성 환자로, 2-3일 전 추운 날씨에 장시간 노출 후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 함께 요통 및 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 74kg, BMI는 30.0이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 14도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 36분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 추운 환경에 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발생하였다고 한다. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이를 오르내리며, 오한과 함께 경미한 몸살 기운을 동반한다. 콧물은 중등도이며 계속 흘러 불편감을

호소한다. 기침은 빈번하게 나타난다. 비염 증상으로 재채기가 간헐적으로 나타나며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 강도 1/10로 미약하게 나타난다. 소화불량 증상으로 복만 및 복통이 1/5 정도로 나타난다. 수면 부족 시 증상이 악화되며, 수면 및 스트레칭 후 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/92 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 38.2℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 48세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 82kg
- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 97/분, 체온 38.1°C

■ 요약

48세 남성 환자로, 2-3일 전 수영 후 오한, 발열, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 82kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였고 다음날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 수영 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 이후 콧물과 기침이 발생하였다. 증상은 호전과 악화를 반복하는 양상이다. 찬바람에 노출되거나 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/99 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 38.1°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 사지무력감이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 부종은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 中脈
- 맥폭(대세): 細脈

- 맥력: 無力
- 맥상: 緩脈
- 복합맥상: 細弱

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 64세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 45kg
- 활력징후: BP 104/74 mmHg, 맥박 110/분, 체온 37.7°C

■ 요약

64세 남성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 잦은 기침, 재채기, 변비, 혈뇨 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 45kg, BMI는 18.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 몸살 기운, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 변비, 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 4시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한이 시작되었으며, 이후 발열, 몸살 기운, 경미한 콧물, 잦은 기침, 재채기 등의 증상이 나타났다. 환자는 발열이 심하고 몸이 불덩이처럼 뜨겁게 느껴지며, 어지러움과

혼미함을 동반하여 일상생활이 불가능하다고 호소하였다. 오한이 뚜렷하게 느껴져 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 하며, 몸살 기운이 동반되었다. 콧물은 경미하게 흐르며, 콧물을 닦아내는 횟수는 적다. 기침과 재채기는 빈번하게 나타난다. 수면 부족이 증상을 악화시키고, 온찜질이 증상을 완화시킨다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 15개피/일 정도이며, 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 식욕 및 소화 상태는 보통이다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다. 복만/복통은 1/5 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 건망이 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/74 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 147cm / 49kg
- 활력징후: BP 101/79 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.6°C

■ 요약

14세 남학생, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 49kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 증상을 호소하였다. 발열은 37.6°C이며, 오르내림을 반복한다. 오한이 있으며, 몸살 기운이 동반될 수 있다고 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침을 자주 한다. 비염 증상으로 재채기를 발작 수준으로 하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 강도 3/10이며, 소화불량으로 복만/복통

3/5를 호소한다. 악화 요인으로 수면 부족과 흡연이 있으며, 완화 요인으로 따뜻하게 함과 스트레칭이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 복만/복통 3/5를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 3회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 보통이며, 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀은 보통으로, 전신에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁘며, 스트레스 대처력은 나쁘다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/79 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 각질이 있다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:47:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 79kg
- 활력징후: BP 113/60 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.6°C

■ 요약

54세 여성 환자로, 1일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 몸살 기운과 함께 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 79kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 경미한 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열(37.6°C), 오한, 콧물, 기침 증상을 호소한다. 발열은 뚜렷한 열감을 동반하며 피로감을 느끼고, 오한으로 인해 추위를 심하게 느껴 옷을 껴입거나 이불을 덮어야 한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르며, 기침은 하루 종일

지속적으로 나타난다. 요통은 강도 1/10으로 경미하며, 소화불량으로 인해 복만 및 복통이 1/5 정도로 느껴진다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 경미하게 나타난다.
- 대변: 1회/일, 황색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회. 혈뇨 증상을 보인다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 잦다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/60 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 浮脈
- 맥꼭(대세): 細脈
- 맥력: 有力
- 맥상: 滯脈
- 복합맥상: 浮

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 48kg
- 활력징후: BP 111/76 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.6°C

■ 요약

75세 남성 환자로, 2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침) 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 177cm, 체중은 48kg, BMI는 15.3이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 7일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전부터 감기 증상을 호소하였다. 발열은 정상 체온을 유지하고 있으며, 오한을 심하게 느껴 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다고 한다. 몸살 기운이 동반될 수 있으며, 콧물은 심하여 휴지를 자주 사용하게 되고 코를 푸는 횟수가 늘어났다고 한다. 콧물이 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 달고 살아야 하며, 코를 풀어도 금방 다시

찬다고 호소한다. 기침은 발작적인 양상이다. 비염 증상으로 재채기를 간헐적으로 하며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 2/10이며, 소화불량으로 복만/복통이 2/5 정도로 나타난다고 한다. 증상은 다양하게 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 및 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 전신에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/76 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지 무력감이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 멍이 절로 생긴다고 한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 황태, 후태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 60세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 74kg
- 활력징후: BP 103/61 mmHg, 맥박 77/분, 체온 38.9°C

■ 요약

60세 남성 환자로 1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침)과 혈뇨를 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 74kg, BMI는 27.9이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 감기 증상(정상 체온, 오한, 콧물, 기침)과 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

3일간 야근 후 피로 누적으로 감기 증상이 발현하였다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전부터 감기 증상을 호소하며, 정상 체온임에도 오한을 느끼고 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려 한다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보이며, 휴지를 자주 사용한다. 발작적인 기침을 동반한다. 또한, 적색 혈뇨를 호소한다. 증상은 호전 중이다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하고, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 특별한 소화 불량 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회, 적색 혈뇨를 호소한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/61 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 38.9°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 57kg
- 활력징후: BP 112/76 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.9°C

■ 요약

26세 남성 환자로, 2-3일 전 에어컨이 강한 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 콧물, 기침, 몸살 기운을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 57kg, BMI는 20.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 6시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 에어컨이 강한 환경에 노출된 후 오한이 발생하였으며, 이후 발열(37.9°C), 콧물, 기침 증상이 나타났다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 하며, 기침은 간헐적으로 발생한다. 환자는 전반적인 몸살 기운과 피로감을 호소한다. 안정 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일, 소화는 보통이다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간, 수면의 질은 양호하며, 기상 시 무거운 느낌이다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 1회 있다.
- 한열: 평소에는 보통이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 수족냉증이 있으며, 음료는 온수를 선호한다.
- 땀: 보통으로, 야간/도한이 있으며, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 무기력함을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/76 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 29세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 100kg
- 활력징후: BP 143/98 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.6°C

■ 요약

29세 여성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원. 평소 이상지질혈증을 앓고 있으며, 환절기 앓은 옷차림으로 외출 후 증상 발현.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 100kg, BMI는 38.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다. 동반 증상으로 재채기, 요통, 소화불량을 호소한다.

【발병 에피소드】

환절기에 앓은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 발열이 뚜렷하며, 약 37.4°C ~ 37.9°C 사이를 오르내린다. 오한이 심하여 옷을 꺼입거나 이불을

뒹어아 할 정도이다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 간헐적으로 발생한다. 만성적인 재채기 발작이 있으며, 요통은 강도 1/10로 미미하다. 복만감 및 복통은 1/5 정도로 경미하다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10로 미미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/98 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 없다. 피부 건조도는 정상이지만 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 5/5로 심한 편이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:32

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 50kg
- 활력징후: BP 108/75 mmHg, 맥박 97/분, 체온 38.4°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 2-3일 전부터 오한, 발열, 전신 근육통, 두통, 녹색변, 혈뇨, 잦은 기침, 소화불량 등을 호소함. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 186cm, 체중은 50kg, BMI는 14.5이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 전신 근육통, 두통, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 5시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다고 한다.

【현병력】

2-3일 전 사무실 근무 후 오한이 시작되었으며, 이후 발열, 전신 근육통, 두통이 발생하였다. 기침과 콧물 증상도 동반되었으며, 요통과 소화불량 증세도 함께 나타났다. 증상은 점차 악화되는 양상이다. 악화 요인으로는 스트레스,

무거운 짐을 드는 행위, 장시간 앉아 있는 자세 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 현재 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주를 주간에 한다. 흡연은 하지 않으며, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/75 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 38.4℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움증은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 56세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 93kg
- 활력징후: BP 103/72 mmHg, 맥박 80/분, 체온 38.0°C

■ 요약

56세 남성 환자로, 2-3일 전부터 발열, 오한, 기침, 콧물, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 93kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 5도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 21분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 차가운 환경에 노출된 이후 발열, 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발생하였다. 발열은 37.4°C ~ 37.9°C 사이로 측정되며, 오한으로 인해 추위를 심하게 느껴 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 비염 증상으로 재채기가 빈번하게 발생한다. 요통은 강도 2/10으로

나타나며, 소화불량으로 인해 복만 및 복통이 2/5 정도로 느껴진다. 수면부족, 찬바람, 흡연 시 증상이 악화되며, 수면을 취하면 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주를 주간에 한다. 흡연은 하루에 0개피를 피우며, 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화불량으로 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색 변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/72 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 38.0℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없으며, 멍이 절로 생긴다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 85kg
- 활력징후: BP 112/63 mmHg, 맥박 65/분, 체온 39.1°C

■ 요약

52세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 85kg, BMI는 34.5이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

과로와 수면 부족이 6일간 지속된 후 면역력이 저하되어 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 증상을 호소한다. 발열로 인해 전신 근육통 및 두통이 동반되어 활동이 힘든 상태이며, 39.1°C의 고열을 보인다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도이다. 콧물은 지속적으로 흐르며, 기침은 하루 종일 계속되는 양상이다. 온찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 진단받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5번 중 1번 정도 발생하며, 중도각성은 매일 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/63 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 39.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 피부는 건조하고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 크다.
- 설태: 황태, 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:48:57

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 78세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 59kg
- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 108/분, 체온 39.1°C

■ 요약

78세 남성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 콧물, 기침, 요통, 소화불량 증상을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 59kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기), 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 2시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 사무실에서 에어컨에 노출된 후 오한을 느껴 발열이 시작되었다. 이후 콧물, 기침, 재채기, 요통 및 소화불량 증상이 나타났다. 환자는 가벼운 몸살 기운과 함께 콧물이 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를

풀어도 금방 다시 차는 느낌을 호소한다. 기침을 자주 하며, 재채기를 매일 지속적으로 한다. 요통은 강도 2/10이며, 소화불량으로 복만/복통을 2/5 정도 느낀다. 안정 시 증상이 완화되는 경향을 보이며, 기름진 음식 섭취 및 흡연 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 주간에 음주를 한다. 흡연은 0.0개피/일, 운동강도는 고강도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 12시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 수족냉증이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/69 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 39.1℃, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조증과 가려움증이 있다. 부종은 없다. 멍은 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다/비대하다.
- 설태: 백태이며, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 74kg
- 활력징후: BP 149/96 mmHg, 맥박 61/분, 체온 38.8°C

■ 요약

17세 남성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침 등을 호소하며 내원함. 변비, 혈뇨, 수족냉증, 전신 무력감, 피부 가려움 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 175cm, 체중은 74kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 1일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 5시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 현재 체온은 38.8°C이다. 오한이 심하여 몸이 떨릴 정도이며, 콧물과 기침을 동반하고 있다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방

다시 찬다고 호소한다. 기침은 발작적인 양상이다. 장시간 앉아있는 자세, 습한 환경, 스트레스 등이 증상을 악화시키며, 스트레칭 시 일시적인 완화를 느낀다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만감 및 복통 (2/5)을 느낀다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에서 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮으며, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/96 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 38.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 절로 멍이 잘 생긴다고 한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다. 어지럼증은 거의 느끼지 않는다 (0/5).
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백색 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥, 침실맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 48kg
- 활력징후: BP 116/63 mmHg, 맥박 86/분, 체온 38.8°C

■ 요약

19세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 감기 증상 (발열, 콧물, 기침)과 함께 비염 증상 (재채기) 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 48kg, BMI는 15.7이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 수영 후 감기 증상(발열, 콧물, 기침)과 비염 증상(재채기)이 발현되었다고 한다. 발열로 인해 전신 근육통 및 두통이 동반되었으며, 활동이 힘들어 눕고 싶어하는 경향을 보인다. 오한이 경미하게 느껴져 옷을 꺼입거나

이불을 덮으려고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이며, 기침은 간헐적으로 나타난다. 비염 증상으로 재채기를 자주 한다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다. 소화불량으로 복만 및 복통이 4/5 강도로 발생한다. 증상은 기름진 음식 섭취, 습한 환경, 찬바람/냉기에 노출 시 악화되고, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 묽거나 연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/63 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 38.8℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 황태, 박태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 68kg
- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 66/분, 체온 38.8°C

■ 요약

63세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 68kg, BMI는 21.5이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다. 또한 적색뇨를 호소한다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 얇은 옷차림으로 외출 후 저녁부터 오한, 발열이 시작되었다고 한다. 이후 콧물, 기침이 동반되었으며 증상이 악화되는 양상이다. 휴식과 안정을 취하면 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 25개피/일 정도 한다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 38.8°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다. 부종은 없고, 멍은 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 23세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 72kg
- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 112/분, 체온 37.9°C

■ 요약

23세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원함. 3일간의 야근 후 감기 증상 발현. 과거력 상 가족력으로 고혈압이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 23세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 184cm, 체중은 72kg, BMI는 21.3이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

3일간 계속된 야근 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다.

【현병력】

발열은 37.4°C에서 37.9°C 사이로 측정되며, 뚜렷한 열감을 호소한다. 오한을 느끼며 몸살 기운이 동반되었다. 콧물은 지속적으로 흐르며, 잦은 기침을 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 복만감과 복통이 3/5 정도로 느껴진다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 배변 횟수는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀을 보통으로 흘리며, 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/96 mmHg, 맥박 112회/분, 체온 37.9°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 무력하다.

- 맥상: 완맥, 허대맥이다.

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 64세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 94kg
- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 98/분, 체온 39.5°C

■ 요약

64세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 94kg, BMI는 33.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 3시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한이 시작되었으며, 이후 발열, 콧물, 기침 등의 감기 증상과 요통, 소화불량이 발생하여 증상이 악화되는 추세이다. 발열로 인해 전신 근육통 및 두통이 동반되었으며, 활동에 어려움을 느껴 눕고 싶어 한다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려 한다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를

자주 사용하게 되며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 기침은 간헐적으로 발생한다. 요통은 3/10 강도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만감 및 복통은 3/5 강도로 나타난다. 악화 요인으로는 무거운 짐을 들거나 과로하는 경우가 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만감 및 복통이 있다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽은 변/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 1회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한을 보이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 39.5°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하지 않고 가려움이 있다. 부종은 없으며, 멍은 정상이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크다.
- 설태: 황색, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 84세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 77kg
- 활력징후: BP 100/77 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.4°C

■ 요약

84세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 84세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 77kg, BMI는 28.3이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 8시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강한 환경에 노출된 후 오한, 발열을 느낌. 발열로 인한 전신 근육통과 두통을 동반하며 활동이 힘들어 누워있고 싶어함. 오한은 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 할 정도로 심함. 콧물은 중등도이며 계속 흘러나오고, 간헐적인 기침을 한다. 재채기는 지속적으로 나타나며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 강도 1/10으로 미미하며,

소화불량으로 복만/복통이 1/5 정도로 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피, 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도로 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/77 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.4°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:49:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 80kg
- 활력징후: BP 124/88 mmHg, 맥박 67/분, 체온 38.3°C

■ 요약

52세 여성, 2-3일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 잦은 재채기, 몸살기운, 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 80kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 잦은 재채기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

내원 2-3일 전, 비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 2시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 비를 맞은 후 오한과 함께 발열이 시작되었으며, 점차 증상이 악화되는 양상을 보였다. 발열과 함께 몸살 기운을 호소하며, 콧물은 경미하게 나타난다. 재채기를 자주 하며, 요통과 소화불량 증상도 동반된다. 온찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증 및 고혈압으로 진단받아 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 중등도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 하며, 복만감과 복통을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 2회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소하고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/88 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 38.3°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 멍이 잘 든다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5이며, 어지럼증은 1/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:50:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 58kg
- 활력징후: BP 146/96 mmHg, 맥박 120/분, 체온 37.9°C

■ 요약

16세 여성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 161cm, 체중은 58kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

2일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 발열, 오한, 콧물, 기침 증상을 호소한다. 발열은 37.9°C까지 오르며 뚜렷한 열감을 동반하고, 오한으로 인해 추위를 심하게 느낀다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오며, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 몸살 기운을 동반할 수 있다. 비염 증상으로 재채기가 간헐적으로 나타나며, 코막힘이나 코 가려움은 없다. 요통은 통증 강도 3/10으로

나타난다. 복만/복통은 3/5 강도로 나타난다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 5개피, 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 규칙적으로 하며, 특별한 소화 불량은 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 수면, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에서 나타나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 통증강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력감을 느낀다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 146/96 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 37.9°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 크고/넓다.
- 설태: 백태, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:50:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 64kg
- 활력징후: BP 111/64 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.7°C

■ 요약

22세 여성, 1일 전부터 발열, 오한, 전신 근육통, 두통, 콧물, 기침, 재채기, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 64kg, BMI는 23.5이다.

【주소증】

발현 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 전신 근육통, 두통, 콧물, 기침, 재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

3일간 야근 후 피로 누적으로 감기 증상 발현.

【현병력】

1일 전부터 발열(37.7°C), 오한, 전신 근육통, 두통, 콧물, 간헐적인 기침, 재채기 증상 호소. 비염 증상으로 재채기 잦음. 요통 강도는 4/10. 복만/복통 4/5. 증상 악화 중.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증 진단 하에 혈압약, 이상지질혈증약 복용 중.

【가족력】

특이 가족력 없음.

【사회력】

비음주, 흡연 0개피/일, 운동 강도 중.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수 4회/일, 불규칙적, 복만/복통 4/5, 소화불량 호소
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통
- 소변: 맑음, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 7시간, 얕음, 기상 시 무거움, 입면장애 3/5, 중도각성 2/5
- 한열: 보통, 온수 선호, 수족냉증 有
- 땀: 보통, 야간/도한, 땀 흘린 후 열감
- 통증: 요통 4/10
- 정신/정서: 건망, 스트레스 대처력 낮음, 의욕 보통

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/64 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.7°C, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 사지 무력감 有, 피부 건조도 정상, 가려움 有
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대/태
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:50:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 56kg
- 활력징후: BP 103/75 mmHg, 맥박 88/분, 체온 37.7°C

■ 요약

30세 남성, 1일 전 수영 후 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 혈뇨 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 56kg, BMI는 18.7이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 혈뇨를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출한 다음 날부터 콧물 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 감기 증상을 호소하였다. 발열은 37.7°C로 뚜렷한 열감이 느껴지며, 이로 인해 피로감과 불편감을 동반한다. 오한은 경미하게 느껴지며, 몸살 기운이 동반될 수 있다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오고, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 또한, 혈뇨 증상을 호소한다. 증상은 점차 악화되는 추세이다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 두부에서 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처력은 좋으나, 건망 증세가 있으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/75 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 사지 무력감을 호소한다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 박태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:50:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 82세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 94kg
- 활력징후: BP 107/67 mmHg, 맥박 89/분, 체온 38.9°C

■ 요약

82세 여성 환자로, 2-3일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 기침, 콧물 등의 감기 증상과 비염 증상, 요통 및 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 82세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 94kg, BMI는 33.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 4시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 2-3일 전 사무실에서 에어컨에 노출된 후 오한이 발생하였고, 이후 발열, 경미한 콧물, 간헐적인 기침 증상이 나타났다. 비염 증상으로 지속적인 재채기를 호소하며, 요통은 통증 강도 2/10이다. 소화불량으로 복만 및 복통 (2/5)을

호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 온찜질 시 증상이 완화된다고 한다. 흡연이 증상을 악화시킨다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

직업은 사무직이며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5이며, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한이 있다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/67 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 38.9°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피로감을 느낀다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:50:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 78세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 46kg
- 활력징후: BP 168/104 mmHg, 맥박 81/분, 체온 38.6°C

■ 요약

78세 남성 환자로, 1일 전 수영 후 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침)과 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량 (복만/복통)을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 78세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 46kg, BMI는 15.5이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량 (복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

수영장에서 수영 후 머리를 말리지 않고 외출하였으며, 다음 날부터 콧물 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 수영 후 감기 증상을 보이기 시작했다. 발열이 뚜렷하며 피로감을 동반한다. 오한은 경미하며, 콧물이 심하게 흐르고 기침이 지속적으로 나타난다. 만성적인 재채기 발작이 있으며, 요통은 강도 4/10으로 나타난다.

소화불량으로 인한 복만 및 복통이 4/5 정도로 느껴진다. 증상은 점차 악화되는 추세이다.

【과거력】

특이 약물력 및 기존 질환은 확인되지 않았다.

【가족력】

특이 가족력은 확인되지 않았다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 0개피/일이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에 걸쳐 나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 168/104 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 38.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:50:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 28세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 59kg
- 활력징후: BP 139/89 mmHg, 맥박 97/분, 체온 39.0°C

■ 요약

28세 남성 환자로 1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 59kg, BMI는 17.4이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

2일간 과로와 수면 부족이 지속된 후 면역력 저하로 증상이 발생하였다고 한다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 감기 증상인 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소한다. 발열은 정상 체온이며, 오한은 경미하게 추위를 느끼는 정도이다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나오며, 기침은 빈번하게 발생한다. 또한 요통 (통증 강도 3/10)과 복만/복통 (3/5)을 동반한 소화불량을 호소한다. 증상은 악화되는 중이며, 기름진 음식 섭취 및 무거운 짐을 들 때

악화되고, 스트레칭 시 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 불규칙하며 하루 4회이다. 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소에는 보통의 한열 경향을 보이나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 땀을 흘린다.
- 통증: 요통 (3/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/89 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 39.0°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 멍이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질과 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:50:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 85세 / 남
- 신장/체중: 166cm / 69kg
- 활력징후: BP 112/69 mmHg, 맥박 82/분, 체온 38.8°C

■ 요약

85세 남성 환자로, 1일 전 에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 근무 후 오한, 발열, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 85세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 69kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1일 전부터 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상 (재채기), 요통, 소화불량 (복만/복통)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

에어컨이 강하게 작동하는 사무실에서 5시간 근무 후 퇴근길에 오한이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 에어컨이 강한 환경에 노출된 후 오한, 발열, 콧물, 기침, 재채기, 요통, 소화불량 증상이 발생하였다. 발열은 뚜렷하며 피로감을 동반한다. 오한은 경미하며 몸살 기운이 동반될 수 있다. 콧물은 경미하게 흐르며, 가끔

기침을 한다. 재채기를 자주 하며, 요통은 통증 강도 4/10이다. 소화불량으로 인한 복만/복통을 호소한다. 온찜질 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 5시간, 깊게 자지만 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한, 야간/도한이 있으며 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/69 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 38.8℃, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 절로 멍이 든다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 얇다.
- 설태: 황색, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:50:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 43세 / 남
- 신장/체중: 194cm / 45kg
- 활력징후: BP 122/86 mmHg, 맥박 96/분, 체온 38.2°C

■ 요약

43세 남성, 1일 전부터 발열, 오한, 기침, 녹색변, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 194cm, 체중은 45kg, BMI는 12.0이다.

【주소증】

1일 전부터 감기, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 14도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 33분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 차가운 환경에 노출된 이후 발열, 오한, 기침 등의 감기 증상과 요통, 소화불량 증상을 호소한다. 발열은 뚜렷한 열감을 동반하며, 이로 인해 피로감과 불편감을 느낀다고 한다. 오한은 경미하게 느껴지며, 옷을 꺼입거나 이불을 덮으려고 한다. 기침은 하루종일 지속적으로 발생한다. 비염 증상으로 재채기가 간헐적으로 나타난다. 요통은

통증 강도 4/10으로 나타난다. 소화불량으로 복만 및 복통을 호소하며, 통증 강도는 4/5이다. 찬바람에 노출 시 증상이 악화되고, 따뜻하게 하면 증상이 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 자지 못하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 잘 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/86 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 38.2°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 2/5로 나타난다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 얇다.
- 설태: 백색, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 65kg
- 활력징후: BP 112/77 mmHg, 맥박 84/분, 체온 38.3°C

■ 요약

40세 여성 환자로, 1일 전 비를 맞은 후 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살기운을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 65kg, BMI는 27.8이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

비를 맞고 젖은 옷을 갈아입지 못한 채 8시간가량 지낸 후 발열이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1일 전 비를 맞은 후 오한, 발열이 발생했으며, 콧물과 기침이 동반되었다. 콧물은 계속 흘러내리는 양상이며, 기침은 빈번하게 발생한다. 휴식을 취하면 증상이 다소 완화되나, 습한 환경에서 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 뭉거나 연변을 본다.
- 소변: 낮에 2회, 밤에 1회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 잠이 얕고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증은 없다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 주로 두부에 땀을 흘리고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다. 통증 양상은 특별히 언급하지 않았다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/77 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 38.3°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 삽맥

- 복합맥상: 부색

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 77kg
- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 72/분, 체온 38.6°C

■ 요약

61세 남성, 2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 77kg, BMI는 25.1이다.

【주소증】

2-3일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침, 몸살 기운을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간 계속된 야근 후 피로가 누적되어 감기 증상이 나타났다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3일 전부터 감기 증상이 시작되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내리는 양상을 보인다. 뚜렷한 발열(38.6°C)과 함께 오한을 호소하며, 몸살 기운이 동반된다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 간헐적으로 나타난다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력상 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중등도로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 12회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 38.6°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 전반적으로 피로감을 호소하며, 몸에 멍이 잘 들고 피부가 건조하며 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍열형 (風熱型) → 은교산, 상국음, 연교패독산
- 나이/성별: 74세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 72kg
- 활력징후: BP 100/73 mmHg, 맥박 79/분, 체온 39.5°C

■ 요약

74세 남성 환자로, 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 72kg, BMI는 29.6이다.

【주소증】

1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

6일간의 과로와 수면 부족으로 면역력이 저하된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 1일 전부터 발열, 오한, 콧물, 기침 증상을 호소하였다. 발열은 39.5°C까지 상승했으며, 오한은 경미하게 느껴지는 정도이다. 콧물은 경미하며, 기침은 간헐적으로 발생한다. 증상은 악화되는 추세이며, 기름진 음식 섭취 및 찬바람 노출 시 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 고강도로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 형태이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다. 통증 양상은 특별히 나타나지 않는다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/73 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 39.5°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 피로감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 보통이다.
- 설태: 황색의 얇은 설태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥