

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:28:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 74kg
- 활력징후: BP 111/78 mmHg, 맥박 63/분, 체온 38.5°C

■ 요약

50세 남성, 2-3일 전부터 감기 증상(오한, 콧물, 기침), 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 74kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기 증상(심한 오한, 멈추지 않는 콧물, 빈번한 기침), 경미한 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

영하 15도의 추운 날씨에 버스 정류장에서 49분간 대기한 후 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 차가운 환경에 노출된 이후 오한, 콧물, 기침 등의 감기 증상이 발현되었다고 한다. 오한이 심하여 따뜻한 환경에서도 극심한 추위를 느끼며, 이가 부딪히는 증상도 동반된다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용해야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 한다. 기침은 빈번하게 발생한다. 요통은 강도 2/10으로

경미하며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통은 2/5 정도로 느껴진다고 한다. 수면 부족 시 증상이 악화되며, 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨 증상이 있으며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/78 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 38.5℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 니태(膩苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)이다.
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)이다.
- 맥력: 유력(有力)하다.
- 맥상: 완맥(緩脈)이다.