

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:36:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 감기/급성상기도감염
- 변증/처방: 풍한형 (風寒型) → 행소산, 삼소음, 소청룡탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 51kg
- 활력징후: BP 114/67 mmHg, 맥박 78/분, 체온 38.0°C

■ 요약

50세 남성, 2-3일 전부터 발열, 오한, 전신 무력감 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 51kg, BMI는 16.7이다.

【주소증】

2-3일 전부터 감기, 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기에 얇은 옷차림으로 외출하였다가 저녁부터 몸살 기운이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3일 전 환절기에 얇은 옷차림으로 외출 후 오한, 발열, 몸살 기운이 시작되었다고 한다. 발열은 뚜렷한 열감이 느껴지며, 이로 인해 피로감이나 불편감이 동반된다. 오한으로 인해 옷을 꺼입거나 이불을 덮어야 한다. 콧물은 경미하게 흐르며, 기침을 자주 한다. 비염 증상으로는 재채기를 자주 한다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타난다.

소화불량 증상으로 복만, 복통을 3/5 정도로 호소한다. 증상은 수면 부족과 찬바람/냉기에 노출 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화는 보통이다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑고, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다. 야간 발한은 없다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/67 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 38.0℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥